

BIBLIOTECA NAZ.


Vittorio Emanuele III


XXX

A

25

NAPOLI

















N. ABRAHAMI
FRAMBESARII,
VEROMANDVI, MEDICI
REGII, PRIMARI IN
Academia Remensi
Professoris,

SCHOLÆ MEDICAE,

MVLTO QVAM ANTEHAC AMPLIORES
ac locupletiores.

IN QVIBVS DE MEDICINÆ THEORIA
& Praxi acriter disputatur.

AD CANDIDATORVM EXAMEN PRO
laurea impetranda subeundum.


Edizio sexta, præcedentibus emendatior, dimidióque
auctior, partim nouâ quæstionum variarum passim in-
sertarum accessione, partim examine quadruplici: Pri-
mo super Anatomica administratione, ad Physiologie
calcem addito: Secundo super actionibus, excrementis
& habitâ corporis, ad morbi diagnosin & prognosin
accuratè perpendendis, in quibus Semeiotice vltima
Pathologie pars versatur: Terrio super medicamento-
rum præparandorum methodo duplici, analytica &
synthetica, sub Therapeuticæ finem: Quarto super
Symptomaton Febres comitantium curatione, ad
Pyretologia coronidem.



PARISIIS,
Apud IOANNEM IOST, viâ Iacobâ, sub
signo Spiritus sancti.

M. DC. XXXVI.
CVM PRIVILEGIO REGIS.







LVDOVICO IVSTO,
GALLIARVM ET NA-
uarræ Regi Christianissimo,
N. AB. FRAMBESARIVS
S. P. D.

A Pollinares Schola (Rex
Christianissime) ingen-
tes tibi gratias agunt,
quòd incolumes autoritate tua
fulta iam quinquies à duodecim
annis per celeberrimas Christiani
orbis Academias peragrarint. Ge-
stiunt iter iterum ingredi in exo-
ticas regiones, inuictissima Maie-
statis tuæ clypeo tecta. Intrepidè
progrediuntur sub augustissimi no-
minis tui patrocinio, obtrectato-
rum licet procella sauiant. Vbique
commendatiores fore sperant, quod

A ij

nunc ampliores & splendidiores
 quam antea prodant. Tuis subsi-
 dijs adiutus (aquisssime Monarcha)
 studiosè Apollinari arti excolenda
 operam nauavi. Ergo tuus studio-
 rum meorum fructus. Gloriam tua
 virtute partam in alium transfe-
 re nefas. Quocirca Clientem tibi
 addictissimum, ac saluberrimum
 eius Gymnasium in tuam cliente-
 lam commissum, tibi denuò conse-
 cratum, ab omni periculo sartum
 tectum, pro tua singulari benigni-
 tate conserva. Tanti beneficii me-
 mor in perpetuum erit,

Christianissimæ Maiestatis tuæ
 religiosissimus cultor,

FRAMBESARIUS.

Calend. Octobr. 1635.

N. AB. FRAMBESARII,
IN SVAS SCHOLAS MEDICAS,
P R Æ F A T I O.

AD I. HERO ARDVM,
*Valgriniosæ Dominum, Regis in sacro
Consistorio Consiliarium, & Ar-
chiatorum Comitem.*

DE Scholarum Medica-
rum Regi dicatarum
institutione (Vir Illu-
strissime) ad te Medicorum Re-
giorum Principem pauca præ-
fari mihi visum est. Antequam
Franciscus Frambesarius filius
meus consilio tuo celeberrimā
adiret Academiam Monspeliē-
sem, in qua Doctoris lauream
adeptus est, quantum paternis
institutionibus, atque clarissimis
Academiæ Parisiensis Professo-
ribus, per quadriēnium auditis,
Medicinæ studio profecerit, sci-
re volui. Idcirco ad illū exami-

nādum priuatas habui Scholas, quas nunc, in Candidatorū omnium ad Apollinarem lauream aspirantium gratiam, publicas facio; vt labores in vno erudiendo à me exantlati, ad cōmunem vtilitatem referantur. Bonum quippè quò communius, eò melius esse semper existimaui. Nō minùs luculenta quàm compendiarīa methodo vsus sum, in singularum Medicinæ partiū quæstionibus proponendis ac discutiendis. Generalia medēdi præcepta generatim imprimis exigitātur, de specialibus deinceps speciatim agitur. Examinandi verò formula celebrioribus Academiis consueta, hīc est accuratè obseruata. Cur autem has quæstiones Medicas, Scholas inscripserim, duæ causæ extant; vna quòd ex Academiarum ritè institutarum ritu, quatuor intus

Doctores induxerim cum Candidato examen subeunte, de tota Medicina in totidem partes distributa disputantes; quorum senior priorem disceptandā aggredditur, reliqui suo ordine suā sigillatim persequuntur: altera quod Scholas non rarò Cicero pro disputationibus ipsis quę in Scholis agitari solēt, vsurparit, vt libro primo Tusculanarum. Hāc perfectā Philosophiā semper iudicaui, quæ de maximis quęstionibus copiosè posset, ornatèque dicere; in quam exercitationem ita nos studiosè operam dedimus, vt iam, etiā Scholas Græcorum more habere auderemus, vt nuper, tuū post discessum in Tusculano, cum essent complures mecum familiares, tentavi quid in illo genere possem. Vt enim antea declamitabam causas, quod nemo me diu-

rius fecit: sic & nunc mihi seni lis est declamatio. Ponere iubebā, de quo quis audire vellet; ac id aut sedēs, aut ambulans disputa- bā. Itaque dierū quinque scholas (vt Græci appellāt) in totidē li- bros cōtuli. Et libro tertio. Tra- ctatum est à nobis id genus egrit- tudinis, quod vnum est omniū maximū, vt eo sublato reliquo- rū remedia ne magnoperè quæ- renda arbitraremur. Sunt enim certa quæ de paupertate, certa quæ de vita inhonorata & in- gloria dici soleant. Separatim autem certæ scholæ sunt de exi- lio, de interitu patrię, de seruitu- te, de debilitate, de cæcitate & de omni casu, in quo nomen po- ni solet calamitatis. Hæc Græci in singulas scholas, & in singulos libros dispertiunt. Opus enim quærunť, quamquam planè dis- putationes sunt, delectationis.

Haftenus Cicero. Non diutiùs
in vestibulo morabor, Amplissi-
me *Heros artis* nostræ. Id vnum
à te supplex peto, vt lucubratio-
nes hæc meas serena fronte ex-
cipias. Quod si feceris, magnus
ad tua pristina erga me studia
cumul⁹ accedet. Regi nostro, ti-
bi ac nobis viue diu felix. Vale.
Lutetiæ Parisiorum Cal. Mart.
Anno 1622.

N. AB. FRAMBESARII
IN SCHOLARVM MEDI-
CARVM AMPLIFICATIONEM.

PROLOGVS.

AD D. C. BVVARDVM, REGIS
Consiliarium, primariũque
Medicum.

CVM Scholas Medicas sub Christia-
nissimi Regis auspicio, ante annos
octo à me constructas, Philiatris admodum
frequentes, per vniuersas Galliarum Aca-
demias animaduertirem (Vir Clarissime)
in horum gratiam illas amplificauit, atque

A. V.

locupletavi, Theoretico Examini Practicū
 subnectens, in quo tot de singulis Febris
 curandis disputationes instituuntur, quot
 in priori de universalibus Medicina præ-
 ceptis habentur: ut Candidati deinceps, de
 Medendi arte generatim & speciatiim,
 equâ rationi strutinâ, nō aurificis staterâ,
 examinentur, ac demum Examinatores,
 quique agrum unum & alterum curādum
 Baccalaureis Licentia gradum persequen-
 tibus proponant. Admitte serena fronte hoc
 munusculum, dum maius monumentum
 Nomini tuo inscribam, ad mei perpetui in
 te obsequij testimonium posteritati relin-
 quendum. Vale. Remis, Calend. Ianuar.
 anno 1630.

IN SCHOLAS MEDICAS D.
 Frambesarij, Medici Regij, Εξαστησιν.

SAT, FRAMBESARI, patriis celebratus
 in oris,

Et laribus nostris sat reor esse datum:

Quin pateris latū volitet tua fama per orbē,

Tutâque sit scriptis vita salûsque tuis?

Quid dubitas iuuisse Homines? sic itur ad
 altra,

Sic merito æternus iure paratur honos.

GVIDO PATINVS, Bellouacus,
 Doctor Medicus Parisiensis.

DOMINO

N. A B. FRAMBESARIO,
CHRISTIANISSIMI REGIS
CONSILIARIO ET MEDICO,
Militiæque Gallicæ Archiatro,
charissimo Patri suo, Francisci
Frambesarij Eucharisticon.



*Edaleis Cecrops erupit The-
seus antris,*

*Dum regit & relegit certo
vestigia filo:*

*A maris irati furys excussus in undas
Delphini tergum subiens emerfit Arion.*

*Me labyrinthæis implexū flexibus æquis
Diriget? Indomitas trananti examinis
undas*

*Quo duce securum dabitur contingere por-
tum?*

*En mihi quæ semper, quæ primis artibus
olim*

*Preluxit fax, ecce micat, facilique docēdi
Discendique modo, solerti que ordine nobis
Pandit iter: chari vestigia certa. Parentis
Agnosco, agnosco, Pater ô charissime, felix
Ingenium, geniūque tuum, mei bōdūm,
que sagacem,*

A vj

*Qua ductrice fretum navis mea freta per
omne*

*Curret, & Iatrica cunctos penetrabo recess-
sus*

Artis, ut intuto considam littore tandem.

*Vos etiam, quibus assiduo quaesita labore
Pramia virtutis debentur, nocte diéque
Qui Coi monumenta senis, qui scripta
Galen*

*versastis, studij maturos carpere fructus,
Et Medica optantes ornari insignibus artis,
Macti animis, subeunda licet discrimina
pugna;*

*En clypeos vobis, en FRAMBES ARJVS
arma*

*Porrigit, his vigili quamvis servata dra-
cone*

*Aurea doctrina referetis vellera, vósque
Laurea certa manet, Spolium virtutis opi-
mum.*

*Quas Patri referam grates? Quo tota in-
uentus*

*Paonia, hac animo mecum benefacta re-
pendet?*

*Musa híc siste, decent servata silentia Na-
tum,*

Nil meritis credas aquari posse Parentis.



N. ABRAHAM L

FRAMBESARII

SCHOLÆ MEDICÆ,

AD CANDIDATORVM

EXAMEN, PRO LAVREA

impetranda, subeundum.

EXAMEN THEORETICVM:

DISPVATIO I.

De Medicina definitione & partitione,

déquerebus naturalibus, in quarum

contemplatione pars prior

occupatur.

DECANVS.



RÆCLARE Philoso-
phus, nedum Ora-
tor, Tullius primo
Officiorũ libro scri-
ptum reliquit: Om-
nis, quæ à ratione sus-
cipitur, de aliqua re institutio, debet à
definitione proficisci; vt intelligatur.

Quid
Medisti-
nas

quid sit id, de quo disputatur. Cum igitur inter nos de re Medica disputatio futura sit, imprimis ex te quero quid sit Medicina?

CANDIDATUS.

Defini-
tio Ga-
leni.

1

Observande Decane, ἰατρικὴ, Medicina ex fine definitur à Galeno, lib. de Constitutione artis. τέχνη ὑγείας μὲν ἔσται φυλακτική, διαφθερόμενης δὲ ἐπινοητική, ars præsentis sanitatis conservatrix, & labefactatæ instauratrix: & lib. introductorio, ἐπιστήμη ὑγείας μὲν τηρητική, νόσων δὲ ἀπαλλακτική, scientia sanitatis protectrix, & morborum expul-
trix.

Defini-
tio Hip-
pocratis.

2

Ab Hippocrate verò libro de flatibus, ex effectis, ἀφαιρέσεις μὲν τῶν ἐλλειπόντων, ἀφαίρεσεις δὲ τῶν ὑπερβαλλόντων, adiectio quidem deficientium, detractio verò redundantium.

Defini-
tio He-
rophili.

Ab Herophilo autem, ex subiectis, ἐπιστήμη ὑγιεινῶν, καὶ νοσοδῶν, καὶ ἐδετερωῶν, scientia salubrium, insalubrium & neutrorum.

Prima
Galen
definitio
oppu-
gnatur.

D. Nulla harum Medicina definitio-
num mihi probatur. Galenica mihi non
arrident, quòd Medicina nec ars, nec scientia sit. Artem non esse sic demonstra-

Ars est systema praeceptorum homogeneorum methodicè dispositorum ad eius finem consequendum: sed praecepta Medicinae non sunt homogenea sed heterogenea:

Defenditur.

Ergo Medicina non est ars.

C. Nego minorem, eruditissime Praeceptor.

D. Probo:

Medicina tractat de salubribus & de insalubribus: sed salubria & insalubria, sunt heterogenea.

Ergo Medicina praecepta sunt heterogenea.

C. Respondeo, quamvis propter subiectæ materiæ varietatem, Medicinæ praecepta videantur heterogenea; ratione tamen vnius formæ redduntur homogenea. Adde quod omnia proposita Medica, quantumvis discrepantia & ἀντισπινδύα, cū ad eundem finem consequendum conspirēt, homogenea esse constet.

D. Medicinam inficior esse scientiam.

Scientia solum est de necessarijs & perpetuis, ut patet ex Aristotele lib. 6. Ethic.

At Medica facultas est de rebus contingentibus, & quæ possunt aliter se habere:

Ergo Medicina non est scientia.

Altera
Galenī
defini-
tio con-
uelligitur.

Discuti-
tur.

C. Nego minorem. Et si enim Medicina finem habet contingentem, theorematis tamen constat necessariis & perpetuis.

D. *Plurima sunt in Medica facultate controuersa, & diuersis opinionibus implicata, qua scientia opponuntur:*

Ergo theoremata Medica non perpetuò certa & necessaria sunt.

C. Nego consequentiam. Licet enim probabilia quedã problemata in facultate Medica disceptentur, vniuersalia nihilominus theoremata demonstratione stabilita, certa & necessaria sunt, ac proinde scientifica.

D. *At Medicina tractat innumera singularia sensibus subiecta, quorum haberi scientia non potest, cum sit habitus intellectus per demonstrationem acquisitus.*

Ergo Medicina non est scientia.

C. Nego antecedens. Nec enim Medicina de Petro aut Paulo, sed de corpore sano vel aegro in genere, scientifico modo differit, quanquam Medicus in particulari considerat ea omnia, quæ sensibus subiiciuntur.

D. *Quid ad hoc argumentum respon-*

des, Candidate?

Finis scientiæ sola est contemplatio.

At Medicinæ finis est actio, sanitatis nempe adeptio :

Ergo Medicinæ non est scientia.

C. Distinguo maiorem. Finis scientiæ speculatiuæ est sola contemplatio: At scientiæ practicæ finis est actio. Adde quod Medicinæ duplex, docens & vtens.

Docentis Medicinæ finis est certa & vera præceptorum Medicinalium cognitio: vtentis verò Medicinæ finis est actio, nempe sanitatis conseruatio vel restitutio.

D. Hippocraticam Medicinæ definitio- nem sic oppugno:

Omnis legitima definitio ex genere constat & differentia;

Sed nec ἐπίδειξις, nec ἀφαιρέσις, genus est Medicinæ:

Ergo malè definitur Medicinæ per προσθησιν & ἀφαιρεσιν.

C. Nego minorem. Neutra enim actio separatim, sed vtræque coniunctim Medicinæ genus est.

D. Probo minorem.

Medicinæ genus est facultas:

Hippocratica
Medicinæ definitio
eraglitur.

Soluitur.

Ergo neutra actio, Medicina genus dici potest.

C. Nego consequens.

D. Probo.

Genus continet causas essentielles quæ ad suas species aqualiter attinent. Sic animal, genus hominis & bestia, continet substantiam corpoream, quæ materia est; & facultatem vitæ & sensus, quæ forma est communis hominis & bestia.

Sed adiectio & detractio sunt effecta Medicina, quia Medicina adijcit deficientia, & detrahit superuacanea, ad sanitatem restituendam: Ergo neutra genus Medicina dici potest.

C. Respondeo Hippocraticam Medicinæ definitionem, non essentialem esse: sed ex effectis. Vbi actiones peritiosas usurpantur pro facultate vnde prodeunt.

D. Herophileam Medicina definitionem sic refuto: Non datur corpus neutrum. Ergo Medicina malè definitur ab Herophilo, scientia salubrium, insalubrium, & neutrorum.

Hero-
philea
Medici-
næ defi-
nitio di-
scepta-
tur.

Propu-
gnatur.

C. Nego antecedens.

D. Probo.

Salubre corpus est quod fruitur sanita-

te: insalubre quod affligitur morbo:

Sed corpus perpetuò vel sanitate fru-
tur, vel morbo affligitur.

Ergo nullum corpus neutrum.

C. Nego minorem. Est enim neu-
tra constitutio, quâ corpus indiffe-
renter se habet, nec planè sanum, nec-
dum ægrum.

D. Probo minorem.

Sanum & ægrum sunt contraria imme-
diata, ex Aristotele.

Cum igitur sanitas & morbus è diame-
tro opponantur, nulla est dispositio media
inter sanitatem & morbum.

C. Respondeo sanum & ægrum
esse contraria immediata apud Ari-
stotelem, non apud Medicos.

D. Contrà, ex doctrina Galeni, sanitas
est symmetria, morbus ametria.

At medium non datur inter *σώμματα*
& *ἀνθρώπων*, moderatum & immoderatum.

Item sanitas est affectus, qui actionem
bonam edit, & non sensibiliter læsam: mor-
bus qui actionem edit sensibiliter læsam.

At inter id, quod est sensibiliter, & non
sensibiliter læsum, non datur medium.

Obie-
ctio.

Declaro insuper authoritate Galeni:

Galenus 1. de loc. affectis, cum corpus

egreditur sanitatem, ingreditur morbum, inquit. Et i. de cris. ca. i. Trāsitus à sanitate in morbum, fit in puncto imperceptibili, & initio lib. de diff. morborū, qui operationes solitas exercere potest, sanus est; cum autem eas non amplius exercere potest, morbo laborat. Et à perfectissima actione usque ad sensibilem lesionem extenditur sanitatis latitudo: à sensibilibiter autem laesa incipit: morbus. In his & infinitis alijs locis nullam neutrius mentionē facit Galenus, licet neutrum inter sanum & agrum aliquando ponat.

**Respon-
sio.**

G. Respondeo Galenum sumere sanitatem aliquando latiùs, aliquādo vero strictiùs suos limites contrahere: ac quandam esse in habitu sanitatem, quæ firma est & stabilis, aliam in dispositione & affectione positam, quæ stabilis non est, sed ita debilis ut promptè violetur ab iniuriis. Cum Galenus sanos statuit qui nondum coguntur intermittere solita officia, licet debiliter illa exerceant, tunc & neutros decidentia, in morbum ruere paratos; & neutros conualescentia, à morbo resurgentes, sub sanis constititur, & neutrū statum intra sanita-

tis limites assumit : Cum verò ambos status excludit , eo quod firmi non sint, & actiones edāt ad humana officia non sufficientes, tunc datur neuter status, qui sanus non est, eo quod illi non conueniat conseruatio: sed neutris in morbum delabentibus Prophylactice, & nouissimè à morbo resurgentibus Analeptice dicata sit.

D. Quot sunt Medicinae partes?

C. Quatuor, φυσιολογικὴ, ὑγιαίνουσα, παθολογικὴ, καὶ θεραπευτικὴ. Ab aliis quinque enumerantur, φυσιολογικὴ, ὑγιαίνουσα, παθολογικὴ, σημειωτικὴ, καὶ θεραπευτικὴ. Sed αἰτιολογικὴ & σημειωτικὴ sub pathologia à me comprehenduntur.

Quot
sint Me-
dicinae
partes.

D. Hæc Medicinae partitio non placet. Physica siquidem est scientia speculatiua : Medicina verò ars factiua. Quo fit ut Physiologia utriusque pars esse nequeat.

Propo-
sita Medi-
cinæ
partitio
oppu-
gnatur.

*At Physiologia est Physica pars,
Ergo non est pars Medicina.*

C. Sic argumentaris, sapientissime Præceptor :

Defen-
ditur.

*Physiologia est pars Physicæ,
Ergo non est pars Medicinæ.*

Nego Physiologiam Physicæ par-

22. N. Ab. Frambesarij
tem esse.

D. Sic probo:

Physica ut aliorum animalium, sic & hominis corpus perfectè describit:

Ergo Physiologia Physica pars est.

C. Physica quidem corpus humanum, quatenus est naturale generaliter contemplatur: sed Physiologia, quæ prior Medicinæ pars habetur, id peculiariter qua ratione est sanum, vel ægrum, aut neutrum considerat; adeo ut particularis hominis physica nonnullis dicatur.

Quæ ad
colum-
matam
Medici-
næ co-
gnitione
requi-
rantur.
D. Ad perfectam Medicinæ notitiam consequendam, quot res cognitu necessaria perhibentur?

C. Tres, res naturales, in quarum contemplatione φυσιολογία versatur; res non naturales, in quarum rectione ὑγιεινὴ consistit; & res præter naturam, in quarum cognitione παθολογική, & depulsiōe διαγνωστική occupatur.

Quæ &
quot sint
res natu-
rales.
D. Quid vocas res naturales?

C. Quæ naturam hominis constituunt.

D. Quot sunt res naturales?

C. Septem sunt numero: elementa, temperamenta, partes, humores, spi-

ritus, facultates, & functiones.

*D. Septem vulgò recensentur, Candida-
te. Verùm si principia vitæ, caelesti naturæ
analogæ, subiectis elementis superaddan-
tur, erunt octo numerandæ, quæ profectò
distinctius enarrabuntur, & clariùs in-
telligentur, analytica methodo per dichoto-
mias ita digestæ: Physiologia est prima
Medicinæ pars, quæ naturalem hominis
constitutionem contemplatur. Natura hu-
mana duabus constituitur partibus, corpore
& anima. Essentiales corporis causæ &
partes accuratè sunt considerandæ. Essen-
tiales causæ sunt elementa & principia vi-
tæ, unde temperamenta nascuntur dupli-
cia, unum mixti, alterum viventis corpo-
ris. Partes corporis sunt continentes, vel
contentæ. Continentes, quæ per se sustentan-
tur, sunt similes, vel organice. Similes
sunt spermaticæ, vel sanguineæ. Organice
sunt animales, vel vegetales. Hæ vitales,
vel naturales. Singularum una princeps,
aliæ subministrantes. Contentæ quæ alia-
rum adminiculo sustentantur, sunt humo-
res, aut spiritus. Humores sunt alimentarij,
vel excrementitij. Alimentarij sunt pri-
marij, vel secundarij. Primarij sunt cali-
di vel frigidi. Calidi sunt sanguis & bilis.*

Physio-
logiæ
definitio
& dichotomia.

Frigidi sunt pituita & melancholia. Secundarij sunt tenuiores, vel crassiores. Tenuiores sunt appositus & roridus: Crassiores, gluten, & cambium. Spiritus est fixus, vel influens. Influens est animalis, vel vegetalis. Vegetalis est vitalis vel naturalis. Ab anima proficiscuntur facultates & functiones. Amba sunt animales, vel vegetales. Vegetales sunt vitales, vel naturales. Naturalium alia individui conseruationem, alia speciei propagationem spectant.

DE ELEMENTIS.

Quid e-
lemen-
tum.

D. Quid est elementum?

C. τὸ στοιχεῖον ἐλάχιστον ὅστις μίξιον, ὃ ἄρ' αὖ ἢ στοιχεῖον, Elementum est minima pars eius, cuius est elemētum, auctore Gal. l. de Elem. Minimam autem partem vocat simplicissimam, quæ in alias specie diuersas diuidi nequit. Itaque elementum est simplicissima pars mixti.

Ab aliis elementum definitur corpus simplex, ex quo quidque primum constituitur, & in quod reuera potest resoluitur.

Oble-
tio.

D. Ergo os, cartilago, caro, & reliquæ partes similes, erunt corporis humani elementa,

elementa, quia sunt simplicia corpora, ex quibus organica membra primum constituuntur, & in qua singula diuiduntur.

C. Nequaquam. Et si enim ad sensum simplices apparent, reuera tamen compositę sunt ex quatuor elementis, & in ea ultimò resoluuntur, quia vltima resolutio mixtorum in elementis consistit.

D. Quid? Nonne elementa ipsa in materiam & formam, communia corporum naturalium principia, resoluuntur?

C. Cogitatione quidem resoluuntur, non re ipsa.

Elementa siquidem ratione sola, non actu sunt diuidua.

D. Quo discrimine à principijs elementa seiungis?

C. Duplici. i. quòd elementa ex aliis se prioribus, atque ex se inuicem oriantur: principia verò neque ex aliis, neque ex se vicissim fiant; sed ex se omnia, quę naturaliter fiunt, producant. Secundò, quòd elementa eiusdem sint generis, cum iis quorum sunt elementa: principia verò non possint cum rebus, quarum sunt principia, eiusdem esse generis. Itaque

*Quo discrimine
seiant elementa
à principijs:*

cùm elementa sint corpora, constat ea, quorum sunt elementa, esse corpora: at principia corporum sunt incorporea.

**Quot
sint ele-
menta.**

D. Quot sunt elementa?

C. Quatuor, ignis, aër, aqua, terra: quæ ab Hippocrate passim dicuntur, calidum, humidum, frigidum, sic- cum.

D. Quibus argumentis quaternarius elementorum numerus demonstratur?

C. Tribus potissimum, primo quòd quatuor sint primæ qualitates tactiles, ac totidem legitimæ primarum qualitatum tactilium combinationes: altero quòd quatuor elementa admixti constitutionem concurrant: postremo quòd mixtum in quatuor elementa resoluatur.

D. Quomodo corpus humanum ex his quatuor elementis ortum fuerit, demonstrare velim.

**Quomo-
do ex 4.
elemen-
tis corp⁹
humanū
sit con-
stitutū.**

C. Vna manet omnium firma consensio, corpus nostrum è membris organicis primum constitui, organica deinde membra è partium similium struè integrari, similes verò partes ex semine & materno sanguine

ortus sui primordia duxisse, vtrumque autem ex mixta humorum congerie processisse, hancque ab esculentis potulentisque ingestis nasci, quæ profecto siue animantium carnes erant, siue pisces, siue terræ fruges & stirpium fructus, à promiscua elementorum concursione sunt procreata. Cum igitur ex elementis fiant alimenta, ex alimentis humores, ex humoribus partes similes, ex partibus similaribus membra organica, ex membris organicis corpus humanum, id ordine compositionis ex quatuor elementis conflatum esse constat.

Quin & corpus humanum à primis illis naturis ortum, demonstrare licet ex vltima eius resolutione; quia omnia per interitum eò, vnde prodierunt, reuertuntur. Cum homo solutis corporis vinculis è vita excedit, quantum innati caloris dissipatur, id omne in ignis naturam reuolat. Spiritus substantia partim in ignem, partim in aëris regionem nobis offusam refunditur. Profluens humor aqua rursus fit, qui tum aquæ, tum aëri confinis est.

Solidiores partes, quibus crassior in-
est firmitudo, vbi sensim aqueus hu-
mor fuerit exhaustus, tandem dissolu-
tæ in cinerem & terram abeunt. Hoc
mirus Hippocrates omnium primus
attigit, promulgans nimirum homine
animam agente singula in propriam
naturam discedere, atque in eas natu-
ras reflueret, ex quibus vnumquodque
consisteret. Cuius verba hæc sunt:
 καὶ πάλιν γ' ἀνακτὴ ἀπεχωρεῖν ἕκαστον εἰς τὴν
 ἑαυτοῦ φύσιν τελειώματος τῆς ἀθρώπου, τίτε
 ὕγρον πρὸς τὸ ὕγρον, καὶ τὸ ξηρὸν πρὸς τὸ ξη-
 ρόν, καὶ τὸ θερμὸν πρὸς τὸ θερμὸν, καὶ τὸ ψυ-
 γρὸν πρὸς τὸ ψυχρὸν. Et singula cum vi-
ta homo defungitur, ad suam rursus
naturam recedere oportet, humidum
ad humidum, siccum ad siccum, cali-
dum ad calidum, & frigidum ad frigi-
dum. *lib. de Nat. hum.*

Quod
corpus
nostrum
non ex
prima ele-
mentorum
materia,
sed etiam
ex qua-
litatibus
eorum
constet.

D. Declara apertius quomodo corpus
humanum ex primis illis mundi elementis
generetur?

C. Non ex solis elementorum cor-
poribus, sed etiam qualitatibus eo-
rum coniunctis generatur; nec his
quidem puris, verum inuicem mixtis
& temperatis, quarum ratione inui-

cem agunt patiunturque.

D. Recense singulorum elementorum qualitates?

C. Ignis est summè calidus & remissè siccus: aër summè humidus, remissè calidus: aqua summè frigida, remissè humida: terra summè sicca, remissè frigida. Sunt igitur quatuor primæ qualitates, calor, frigus, humiditas, siccitas, quarum elementa sunt prima subiecta, ex horum mixtione, & illarum temperie corpus nostrum constituitur: quamdiu utrâque, nempe *μῆς* & *κρύος*, seruetur incolumis, valet: simul ac alterutra labefactatur, egrotat; utpote *ἀποσεία* vel *ἀκρύεία*, ut docet Hippocrates.

*Quæ sint
elementorum
qualitates.*

D. Quid est mixtio?

C. Mixtio ab Aristotele definitur mixtilium alteratorum unio.

*Quid
mixtio.*

D. Dic mihi quomodo fiat mixtio, an secundum qualitates, an secundum formas, an ὑφ' ἑλόν?

C. Alterantur qualitates, uniuntur formæ, elementa tota totis miscentur.

*Quo-
modo
fiat.*

D. Ostende mihi clariùs mixtionis rationem.

C. Mixtionem alteratio præcedit, seu contrariarum qualitatum conflictus, actionem illam & perpeffionem mutuam contactus antecedit, agentia enim Physica agunt tangendo, proinde elementa quæ ad constitutionem mixti concurrunt, imprimis se tangunt, deinde sua repugnantia & contrarietate inuicem agunt, agendo & repatiendo viciffim, sese ad minima diuidunt, vndique sese permeant, & veluti perfundunt, quod est $\kappa\alpha\theta' \omicron\lambda\omicron\nu$ permisceri.

D. Substantia igitur substantijs permiscetur.

C. Quidni?

D. Quia non fit mixtio sine repugnantia, substantia autem substantia non pugnat.

C. Substantia substantiæ non aduersatur per se, qua ratione substantia est: sed ratione qualitatum. Sic ignis suâ formâ & substantiâ totâ non aduersatur aquæ, sed qualitate solâ, quod sit calidus, aqua frigida. Alteratio non est formarum, sed qualitatum mutatio. Elementa mutuâ pugnantia qualitatibus suis alterantur, ijsque re-

tulis & refractis contemperantur, sublatâ repugnantia facile vniuntur: exformarum verò cuiusque elementi vnione, vna mixti forma exurgit.

DE PRINCIPIS VITÆ.

D. Quot sunt vitæ principia?

C. Vitæ principia duo sunt, calidum innatum, & humidum primigenium, à duobus generationis nostræ principijs, semine parentum, & sanguine materno, propagata.

Vitæ principia
quæ &
quot
sint.

D. Quid calidum innatum appellatur?

C. Calidum innatum (quod τὸ θερμὸν Græci vocant) est præcipuum animæ instrumentum, quo vitæ actiones obit, omnesque naturæ functiones exequitur, & cuius ministerio hæc morbos, morborumque causas & symptomata depellit, vnde morborum medicatrix ab Hippocrate dicitur. Duo quippè per calidum innatum comprehendo, subiectum, cui calor inest, & qualitatem, à cuius prædominio subiectum denominatur.

Quid
calidum
innatum.

D. Quid humidi primigenij nomine hic intelligitur?

C. Substantiam oleaginosam soli-

Quid
humidū
primi-
genium,

dioribus corporis partibus ab originis suæ primordio insitam, spiritus & calidi innati basim ac sedem. Vnde humidum radicale dicitur.

DE TEMPERAMENTIS.

D. Quid est temperamentum?

Quid sit
tempera-
mentum?

C. Temperamentum (quod à Græcis *κράσις* dicitur) à Galeno definitur principium facultatum & functionum naturalium.

D. Quotuplicia sunt temperamenta?

Quotup-
plicia
tempe-
ramenta.

C. Duplicia sunt temperamento-
rum genera, vnum mixtionis, alterum
vitæ. Illud corpori competit, quate-
nus mixtum est, hoc quatenus viuens.

D. Quid est temperamentum mixti?

Quid
tempe-
ramentum
mixti?

C. Temperamentum mixti, est pro-
portio quatuor principum qualita-
tum elementarium, functionibus na-
turalibus obeundis idonea. Auicen-
nas id definit qualitatem ex elemen-
tis proportionem mixtis exurgentem.

*D. Putasne primarum qualitatum cra-
sin, sine elementorum mixtione fieri posse?*

Quod
sine ele-
mentorum
mixtione
fieri
nequeat.

C. Nequaquam. Et si enim tempe-
ramentum à mixtione hoc discrimine
seiungitur, quod hæc maximè ele-
mentorum propria sit, illud verò qua-

litatum : sic tamen iuncta sunt, vt neque mistio citra efficientium qualitarum opem, neque sine elementorum omnium substantia temperamentum induci possit. Adeo vt temperamentum sit concertus quidam quatuor qualitatum principum, ex omnium elementorum permixtione.

D. Quot sunt in vniuersum temperamentorum mixti differentiae?

C. Nouem. Vnum quidem temperatum, octo verò intemperata, ex quibus quatuor sunt simplicia, calidum, frigidum, humidum, siccum: ac totidem composita, calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum.

*Quot
qualés
que sint
tempera-
mento-
rum dif-
ferentiae.*

D. Quòdnam est temperatum illud?

*C. Quod Græcis *εἰρημον* dicitur, omnium temperamentorum veluti norma & regula.*

*Quid
tempe-
ratum
sit.*

Quotuplex est?

C. Duplex, vnum absolute & ad pondus temperatum: alterum ad iustitiam in singulis generibus.

*Quotu-
plex sit.*

D. Quid vocas temperamentum absolute & ad pondus?

*Quid té-
peratum
ad pon-
dus.*

C. Id in quo par & æqualis est cō-

mixtorum elementorum portio, nec plus calidi quàm frigidi, nec humidi quàm sicci.

Hoc Galenus cogitatione potiùs, quàm re ipsa subsistere putat; ac, si alicui vnquam contingit, ne momento quidem durare.

D. Quid vocas temperatum ad iustitiam in singulis generibus?

Quid
tempera-
tum ad
iustitiã.

C. Quod paritatem quidem exactam contrariorum in se non habet, sed eam mediocritatem decoram, quæ suæ naturæ debetur, & generi aut speciei maximè conuenit: A deo vt mixtionis æqualitas non Arithmetica, sed Geometrica proportionem æstimeretur. Iustitiæ siquidem est Geometricè suum cuique tribuere, pro dignitate.

D. Quid vocas temperamenta simplicia intemperata?

Quid
tempe-
ramenta
intempe-
rata sim-
plicia.

C. Simplicia intemperata dicuntur, in quibus vna tantum ex quatuor qualitatibus superat, vt calor, frigus, humiditas, aut siccitas.

D. Quid composita?

Compo-
sita.

C. Composita intemperata vocantur, in quibus duarum qualitatum

excessus est, ut temperamentum calidum humidum, in quo calor frigori, & humor siccitati præpollet: frigidum siccum, quod habet plus frigidi, quàm calidi, & plus sicci quàm humidi elementi.

D. Frustra distinxisti temperamenta in simplicia & composita, cum nullum prorsus simplex, sed omnia sint composita.

Oble:
Alo:

C. Nego.

D. Probo. Temperamentum simplex illud est, in quo unicum dominatur elementum, ut calidum in cuius mixture vicit ignis, frigidum in quo vicit aqua, &c. Sed unum quodque elementum duas habet qualitates. Nam ignis est calidus & siccus: aqua frigida & humida.

Ergo nullum datur temperamentum simplex.

C. Temperamentum simplex appellatur, in quo unica qualitas dominatur, non in quo unicum elementum.

D. Contrariam responsionem sic argu-
mentor:

Qualitas cum sit accidens, per se & sine subiecto consistere nequit. Itaque si dominetur aliqua qualitas elementi, sum-

36 *N. Ab. Frambesary*
elementum prædominetur necesse est.

Solutio. C. Vnumquodque elementum licet duas habeat qualitates, vnica tamen dominatur, à qua temperamentum nomen sortitur. Sed ideo temperamentum calidum aut frigidum dicitur, quod calor in contrarium frigus, aut frigus in aduersum calorem dominetur, cum humiditatis ac siccitatis æqualitate: humidum verò aut siccum, quod humiditas siccitate, aut siccitas humiditate sit potentior, cum pari portione caloris ac frigoris.

D. Quotuplex est temperamentum vita.

Quotuplex est temperamentum viuentis. C. Duplex, vnum insitum, quod ex calido innato, humidoque primigenio constat, partibus viuentibus à primo ortu inhærens: alterum verò influens, quod è partibus principibus, corde præsertim scaturiens, per vniuersum corpus spargitur.

Vt temperamentum viuentis, à mixto temperamento discrepare? *D. Censes igitur temperamentum viuentis, à mixto temperamento discrepare?* C. Maximè, cum seorsim & per se subsistant. Nam calor vitalis nequaquam elementaris est, sed cælesti calori analogus, & cum per mortem ex-

tinguitur, cadauer nihilominus aliquandiu suum ab elementorum mixtione temperamentum retinet. Quin & viuificus calor, si elementaris esset, omnia viuientia temperamento calida esse oporteret: At multa sunt viuientia frigido temperamēto, in quorum mixtione calidum elementare superatur à frigido. Discrimen vtriūsque temperamenti, ab ipsamet similarium partium origine clariùs elucescit. Hæ siquidem à duobus generationis nostræ principiis, semine & menstruo sanguine oriuntur, quorum corpulentia ex elementorū mixtione proficiscitur; vtpote ex mixta humorum congerie, quæ ab assumptis alimentis, ex promiscua elementorum concursione procreatis, duxit exordium: sed genitales spiritus quibus vndique perfunditur, ex prima rerum creatione singulis speciebus viuientium, quasi per traduces Creatoris vi propagantur & conseruantur.

Licet autem vitæ temperamētum, à mistarum qualitatum elemētarium temperamento sit reipsa distinctum,

Cum eo-
tamen
conspi-
ret, ad
animæ
functio-
nes ob-
cundas.

hoc tamen in corporibus animatis cum illo copulatum, naturalibus animæ actionibus edendis aptissimum est.

DE PARTIBVS.

D. sed de elementis & temperamentis quidem satis, ad partes veniamus. Quid est pars.

Quid pars.

C. Partis nomen latè sumptum significat quicquid ad humani corporis constitutionem facit. Οἱ, πὶ γὰρ αὐτῷ τῷ παντὶ συμπληρωτικὸν, μέρος ὀνομάζεται;

Latè sumpta.

Quicquid enim totum complet atque integrat, pars nominatur, authore Galeno cap. 5. l. 1. meth. Med. Hac fusa & ampla partis significatione vsus est Hippocrates; dum ἰσχυρὰ καὶ ὁρμῶντα, humores & spiritus partes appellat. Sed pars propriè à Fernelio definitur, corpus toti coherens, communique vitæ coniunctum, & ad illius functionem vsuque comparatum. Qua definitione humores ac spiritus idcirco ex partium numero excluduntur, quòd nusquam hæreant, sed per venas & arterias motu ferantur.

Propriè dicta.

Partium prima diuisio.

D. Quotuplex est partium diuisio?

C. Multiplex partium diuisio, sed

omnium prima est in continentes & contentas.

D. Quanam sunt partes continentes?

C. Partes solidæ, quæ per se sustentantur. Ab Hippocrate τὰ ἰσχυρὰ dicuntur.

Quæ continent
partes
sint.

D. Quomodo diuiduntur?

C. In similes & dissimiles.

D. Quanam sunt partes similes?

C. Partes similes à Græcis ὁμοειδῆς, id est eiusdem naturæ dicuntur, quæ vna pariliq̃ue substantia constât, & vndique sibi simili, in quibus tanquam sensu minimis, corporis dissolutio consistit. Quam ob causam simplices ac primæ non rarò appellantur; quandoque & elementa sensibilia, quia ad sensum simplicissimæ apparent.

Earum
diuisio.

Quæ similes
partes
sint.

D. Quomodo partes similes diuiduntur?

Earum
diuisio.

C. In spermaticas & sanguineas.

D. Quanam sunt partes spermaticæ?

C. Quæ ex semine constant.

D. Quot sunt partes similes spermaticæ?

Quæ &
quot
sint partes
spermaticæ.

C. Nouem, os, cartilago, ligamentum, fibræ, membrana, ner-

uus, vena, arteria, cutis.

**Obie-
ctio.**

D. At, inquam, nervus, vena, arteria, & cutis, sunt partes dissimilares. Galenus quippe lib. de placitis Hippoc. & Plat. & de usu partium, docet nervos intus medullosos, extrinsecus membranosos esse, ut venarum & arteriarum corpus membranis & fibris variis est contextum, cutisque nervis, venis & arteriis constituta.

Solutio.

Ergo inter partes similes recenseri non debent?

C. Respondeo partium similarium duo esse genera, quædam enim reuera similes sunt, ut os, cartilago, ligamentum, fibra, membrana: aliæ sensus iudicio tantum. Hac ratione nervi, venæ, arteriæ, & cutis, similes erunt: quia primo obtutu intuitibus nobis apparet earum substantiam uniusmodi.

D. Quænam sunt partes sanguineæ?

**Quæ
varies
sangui-
nem.**

C. Quæ à sanguine originem habent, ut caro & adeps.

Quænam sunt partes dissimilares?

**Quæ
sunt par-
tes dissi-
miles.**

C. Partes ab omni sanguine, id est dissimilares dicuntur, quæ non ex partibus eiusdem naturæ componuntur, sed ex pluribus specie differentibus.

Aliàs ὀργανισμοί, id est instrumentariae appellantur, quod facultatum ac functionum animae sint instrumenta.

D. Quomodo diuiduntur partes organicae?

C. In animales, vitales & naturales: ac singulae in principem, & subministrantes.

D. Quid vocas partes animales, vitales & naturales?

C. Organa functionum animalium, vitalium & naturalium.

D. Quid vocas partem principem?

C. Quae aliarum gubernationi praest.

D. Quid subministrantes?

C. Quae principi subseruiunt, & ab ipsa ut plurimum originem ducunt.

D. Quodnam est princeps organum functionum animalium.

C. Cerebrum. Est enim animalium facultatum cum sentientium, tum motuarum omnium origo, animalis spiritus sedes, & neruorum principium.

D. Quotuplicia sunt organa cerebro subministrantia, ad functiones animales obeundas?

Cur organice dictae.

Organicarum partium distinctio.

Quae partes animales, vitales & naturales dicantur.

Quae princeps.

Quae subministrantes.

Princeps organum functionum animalium.

Quotuplicia sint organa cerebro subministrantia.

Quæ sint
organa
facultatē
animale
deferentia,

C. Duplicia. Alia quippe facultatem animalem deferunt ad sensum & motum: alia operantur, cuius generis sunt propria sensus cuiusque exterioris, ac motus voluntarij organa.

D. *Quanam sunt organa facultatem sentiendi & mouendi deferentia?*

C. Nervi sensitiui & motiui.

Quæ sint
propria
singulo-
rum sen-
suū or-
gana.

Quæ
motus
volunta-
rii orga-
na.

Prin-
ceps or-
ganum
functio-
nem vi-
talem.

Quot-
uplicia
sunt or-
gana fa-
cultati
vitali

submi-
nist. acta.
Quæ sint
respira-
tionis
organa.

D. *Quanam sunt propria cuiusque sensus organa?*

C. Oculi visus, aures auditus, nares odoratus, lingua gustus, & cutis tactus, propria organa sunt.

D. *Quanam sunt propria motus voluntarij organa?*

C. Musculi.

D. *Quodnam est princeps organum functionum vitalium?*

C. Cor. Est enim facultatis & spiritus vitalis fons, natiui caloris præcipua sedes, arteriarumque principium.

D. *Quotuplicia sunt organa cordi subservientia?*

C. Duplicia, respirationis nimirum & pulsus organa.

D. *Quanam sunt respirationis organa?*

C. Ea trium sunt generum. Alia sunt deducētia, alia excipientia, alia mouētia. Deducētia aërem sunt larynx & aspera arteria. Excipientia sunt pulmones, haustum enim aërem excipiunt, præparantque cordi. Mouētia sunt muscoli thoracem distendentes & contrahentes. Non enim sine motu thoracis ducitur aër, vaporque fumidus excluditur.

D. Quanam sunt pulsationis organa?

C. Arteriae.

D. Quòdnā est princeps organum functionum naturalium?

C. Hepar. Est enim facultatis naturalis, venarumque omnium principium, & primum generandi sanguinis instrumentum.

D. Quotuplicia sunt organa facultati naturali subseruientia?

C. Duplicia. Alia enim nutritioni, alia generationi dicata.

D. Quanam sunt subministrantia nutritionis organa?

C. Ea trium sunt generum. Alia quippe præparando, alia expurgando, alia distribuendo alimento inferuiunt.

Deducētia.
Excipientia.

Mouētia.

Quæ prius organa.
Princeps organum functionum naturalium.

Quotuplicia sunt organa facultati naturali subseruientia.

Quanam nutritioni famulantur.

D. Quanam præparando alimento inferniunt?

Organa
inferniē-
tia ali-
mento
præpa-
rando.

C. Os & ventriculus cibum præparant, illud manducatione, hic coctione.

D. Quanam expurgando alimento inferniunt?

Expur-
gando.

C. Ea duorum sunt generum. Alia quippe chylo, alia sanguini expurgando suam dicarunt operam. Intestina chylo expurgando dicata sunt. Chyli siquidem excrementa per aluum expellunt. Kystis fellis, lien, renes & vesica, ad sanguinis expurgationem destinata sunt organa. Excipiunt enim & secernunt à sanguine excrementitios humores è substantia chylosa in hæmatosi procreatos.

D. Quanam distribuendo alimento inferniunt?

D. tri-
buendo.

C. Venæ.

D. Quotuplex venarum genus?

Venarū
genera.

Vetustū.

C. Duplex, vnum jampridem Anatomicis omnibus notum, quo sanguis ab hepate per vniuersum corpus dispergitur, duas complectēs species, venam portam vulgò nuncupatam, quæ crassiorem intestinis alendis, &

venam caviā quæ tenuiorem sanguinem cæteris corporis partibus nutriendis dispergit: alterum nouissimè à Gaspare Asellio Cremonensi, Anatomico Ticinensi in viuis animalibus dissecandis inuentum, mox à nobis in academia Remensi obseruatum, quo chylus, in ventriculo confectus, ad hepar defertur.

D. Quando & quomodo Asellius ad horum vasorum Chylochoen antiquioribus Medicis ignotorum inuentiōem peruenit?

C. Cùm fortè fortunâ, anno 1622. die 23. Iulij, canem benè habitum, benèque pastum, secundum viuum sumpsisset, aperto abdomine, præter triplicia vasa Mesaraïca, vulgares venas, arterias & nervos, repentiè plurimos candentiū vasorū ramulos, eosque tenuissimos ceu funiculos per omne mesenterium & per intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicatus est; & quidem à reliquis vasis mesaraïcis distinctos, cavitatē à nervis, tenuitatē tunicarum ab arterijs, candore à venis, ab omnibus simul succo, quem includūt,

Nouum.

A quo inuentū.

Quando & quomodo.

Ve d reliquis vasis mesaraïcis distinctū.

succo, obliterantur vena ista?

C. In ijs animalibus, quæ fato suo, aut vi morbi pereunt, non magnopere mirandum, quod functiones naturales omnes, inter quas non minima illa chyli est confectio ac distributio, exoletæ iacent, & cum ipsis veluti emoriuntur. At cur idem iis quoque vsuvenit, quæ sectione viua, citra morbum violenter occumbunt, rationi consentaneum videtur, quod ex ingenti dolore à sectione orto spiritus dissipentur, ad quorum instaurationem cor novam ex hepate materiam rapit, hepar subinde ex hisce venulis lacteum succum valido tractu totum exhaurit, quo ille priuatus, nec nouo alio in exhausti locum reposito, præ sui tenuitate necessario concidit, collabuntur, ac se sensui subducunt.

D. Lactearum venarum sedem in mesenteria quidem constituisi, sed originem & insertionem nondum aperuisti?

Lactearum
venarum
origo.
Curie
cori tri-
buatur.

C. De hac re obscura, nihil absolute decernit Asellius, liberum cuique iudicium relinquit. Principium iecori, an pancreati debeant istæ venæ, in dubium reuocat. Cum in iecoris gra-
tiam

tiam prorsus extitisse videantur, ab eo
 oriri verisimile esse censet. Annuit ni-
 hilominus quorundam opinioni, qui
 à pancreate earum originem repetūt: Cur pē-
creati.
 quia pancreas maxima glandula est,
 colore istis venis haud absimili, in
 qua omnes coeunt, & miris anfracti-
 bus ac gyris toto eius corpore intextæ
 & implicatæ conspiciantur, inde que-
 tum deorsum ad intestina, tum sur-
 sum ad hepar porrigi appareant.

D. Lactium origo. Candidare, nec he- Cur ab
intesti-
nis po-
tius du-
catur.
pati, nec pancreati accepta mihi viditur.
Rationi quippe consentaneum ipsas venas
ab ijs locis primordium capere, a quibus
perfectus chylus in hepar primum deriva-
tur: Sed simul ac confectus in ventriculo
chylus est, in intestina deponitur, à quibus
per lactes ad hepar defertur. Ergo lactea
venæ ab intestinis ducunt originem. Id-
circo hirudinum instar ad interiorem
intestinorum capacitatem suis oscillis hiāt,
ac spongiosis capitulis intus penetranti-
bus instruuntur, quæ tanquam radices chy-
lum ex illis sugunt, ac pluribus valvulis
intus foras spectantibus, quæ impediunt ne
chylus remeat in partem unde haustus est.
Desinuntque in crustam, quæ operimentum

36 *N. Ab. Frambesary*
elementum prædominetur necesse est.

Solutio. C. Vnumquodque elementum licet duas habeat qualitates, vnica tamen dominatur, à qua temperamentum nomen sortitur. Sed ideo temperamentum calidum aut frigidum dicitur, quod calor in contrarium frigus, aut frigus in aduersum calorem dominetur, cum humiditatis ac siccitatis æqualitate: humidum verò aut siccum, quod humiditas siccitate, aut siccitas humiditate sit potentior, cum pari portione caloris ac frigoris.

D. Quotuplex est temperamentum vite.

**Quota-
plex è
peramē-
tum vi-
uentis.** C. Duplex, vnum insitum, quod ex calido innato, humidòque primigenio constat, partibus viuentibus à primo ortu inhærens: alterum verò influens, quod è partibus principibus, corde præsertim scaturiens, per vniuersum corpus spargitur.

**Vt tem-
peramē-
tum vi-
uentis, à
mixti cō-
peramē-
to dis-
crepet.** *D. Censes igitur temperamentum viuentis, à mixti temperamento discrepare?*
C. Maximè, cum seorsim & per se subsistant. Nam calor vitalis nequaquam elementaris est, sed cælesti calori analogus, & cum per mortem ex-

tinguitur, cadauer nihilominus aliquandiu suum ab elementorum mixtione temperamentum retinet. Quin & viuificus calor, si elementaris esset, omnia viuentia temperamento calida esse oporteret: At multa sunt viuentia frigido temperamēto, in quorum mixtione calidum elementare superatur à frigido. Discrimen vtriūque temperamenti, ab ipsamet similiarium partium origine clariùs elucescit. Hæ siquidem à duobus generationis nostræ principiis, semine & menstruo sanguine oriuntur, quorum corpulentia ex elementorū mixtione proficiscitur; vtpote ex mixta humorum congerie, quæ ab assumptis alimentis, ex promiscua elementorum concursione procreatis, duxit exordium: sed genitales spiritus quibus vndique perfunditur, ex prima rerum creatione singulis speciebus viuentium, quasi per traduces Creatoris vi propagantur & conseruantur.

Licet autem vitæ temperamētum, à mistarum qualitarum elemētarium temperamento sit reipsa distinctum,

Cum eo-
tamen
conspi-
ret, ad
animæ
functio-
nes ob-
eundas.

hoc tamen in corporibus animatis cum illo copulatum, naturalibus animæ actionibus edendis aptissimum est.

DE PARTIBVS.

D. sed de elementis & temperamentis quidem satis; ad partes veniamus. Quid est pars.

Quid pars.

C. Partis nomen latè sumptum significat quicquid ad humani corporis constitutionem facit. Οἱ, πὶ γὰρ αὐτῷ ἡ

Latè sumpta.

τῆ πατρὸς συμπληρωτικόν, μέρος ὀνομάζεται;

Quicquid enim totum complet atque integrat, pars nominatur, authore Galeno *cap. 5. l. 1. meth. Med.* Hac fusa & ampla partis significatione vsus est Hippocrates; dum ἰσχυρὰ καὶ ὀρμῶντα, humores & spiritus partes appellat. Sed pars propriè à Fernelio definitur,

Propriè dicta.

corpus toti coherens, communique vitæ coniunctum, & ad illius functionem vsûmve comparatum. Qua definitione humores ac spiritus idcirco ex partium numero excluduntur, quòd nusquam hæreant, sed per venas & arterias motu ferantur.

Partium prima diuisio.

D. Quotuplex est partium diuisio?

C. Multiplex partium diuisio, sed

rium prima est in continentes & tentas.

D. Quanam sunt partes continentes?

C. Partes solidæ, quæ per se sustentantur. Ab Hippocrate τὰ ἰσχυρὰ

quæ continententes partes sunt.

D. Quomodo diuiduntur?

C. In similes & dissimiles.

D. Quanam sunt partes similes?

C. Partes similes à Græcis ὁμοειπεῖς, id est eiusdem naturæ dicuntur, quæ una parilique substantia constât, & undique sibi simili, in quibus tanquam sensu minimis, corporis dissolutio consistit. Quam ob causam simplices ac primæ non raro appellantur, quandoque & elementa sensibilia, quia ad sensum simplicissimæ apparent.

Earum diuisio.

Quæ similes partes sunt.

D. Quomodo partes similes diuiduntur?

Earum diuisio.

C. In spermaticas & sanguineas.

D. Quanam sunt partes spermaticæ?

C. Quæ ex semine constant.

D. Quot sunt partes similes spermaticæ?

Quæ & quot sint partes spermaticæ.

C. Nouem, os, cartilago, ligamentum, fibræ, membrana, ner-

uus, vena, arteria, cutis.

Obic-
tio.

D. At, inquam, nervus, vena, arteria, & cutis, sunt partes dissimilares. Galenus quippe lib. de placitis Hippoc. & Plat. & de usu partium, docet nervos intus medullosos, extrinsecus membranosos esse, ut venarum & artieriarum corpus membranis & fibris variis est contextum, cuiusque nervis, venis & arteriis constituta.

Ergo inter partes similes recenseri non debent?

Solutio.

C. Respondeo partium similarium duo esse genera, quædam enim reuera similes sunt, ut os, cartilago, ligamentum, fibræ, membrana: aliæ sensus iudicio tantum. Hac ratione nervi, venæ, arteriæ, & cutis, similes erant: quia primo obtutu intuentibus nobis apparet earum substantiam huiusmodi.

D. Quanam sunt partes sanguineæ?

Quæ
varies
sangui-
nem.

C. Quæ à sanguine originem habent, ut caro & adeps.

Quanam sunt partes dissimilares?

Quæ
sunt par-
tes dissi-
miles.

C. Partes ad compositionem, id est dissimilares dicuntur, quæ non ex partibus eiusdem naturæ componuntur, sed ex pluribus specie differentibus.

Aliàs ὀργαναί, id est instrumentariae appellantur, quod facultatum ac functionum animae sint instrumenta.

D. Quomodo diuiduntur partes organicae?

C. In animales, vitales & naturales: ac singulae in principem, & subministrantes.

D. Quid vocas partes animales, vitales & naturales?

C. Organa functionum animalium, vitalium & naturalium.

D. Quid vocas partem principem?

C. Quae aliarum gubernationi praest.

D. Quid subministrantes?

C. Quae principi subseruiunt, & ab ipsa ut plurimum originem ducunt.

D. Quodnam est princeps organum functionum animalium.

C. Cerebrum. Est enim animalium facultatum cum sentientium, tum motuarum omnium origo, animalis spiritus sedes, & neruorum principium.

D. Quotuplicia sunt organa cerebro subministrantia, ad functiones animales obeundas?

Cur or-
ganicae
dicantur.

Organica-
rum
partium
diu. fio.

Quae
partes
anima-
les, vita-
les & na-
turales
dicantur.

Quae
prin-
ceps.

Quae
submi-
nistran-
tes.

Prin-
ceps or-
ganum
functio-
nis ani-
malium.

Quotu-
plicia
sint or-
gana ce-
rebro
submini-
strantia.

Quæ sint
organa
facultatē
animale
deferentia,

C. Duplicia. Alia quippe facultatem animalem deferunt ad sensum & motum: alia operantur, cuius generis sunt propria sensus cuiusque exterioris, ac motus voluntarij organa.

D. *Quenam sunt organa facultatem sentiendi & mouendi deferentia?*

C. Nervi sensitiui & motiui.

Quæ sint
propria
singulorum
sensuum
organum.

D. *Quenam sunt propria cuiusque sensus organa?*
C. Oculi visus, aures auditus, nares odoratus, lingua gustus, & cutis tactus, propria organa sunt.

Quæ
motus
voluntarij
organum.

D. *Quenam sunt propria motus voluntarij organa?*
C. Musculi.

Princeps
organum
functionum
vitalium.

D. *Quòdnam est princeps organum functionum vitalium?*

Quotuplicia
sunt organa
facultati
vitali
subministrantia.

C. Cor. Est enim facultatis & spiritus vitalis fons, natiui caloris præcipua sedes, arteriarumque principium.

Quotuplicia
sunt organa
facultati
vitali
subministrantia.

D. *Quotuplicia sunt organa cordi subservientia?*

Quæ sint
respirationis
organum.

C. Duplicia, respirationis nimirum & pulsus organa.

Quæ sint
respirationis
organum.

D. *Quenam sunt respirationis organa?*

C. Ea trium sunt generum. Alia sunt deducētia, alia excipientia, alia mouētia. Deducētia aërem sunt larynx & aspera arteria. Excipientia sunt pulmones, haustum enim aërem excipiunt, præparantque cordi. Mouētia sunt muscoli thoracem distendentes & contrahentes. Non enim sine motu thoracis ducitur aër, vaporque fumidus excluditur.

D. Quanam sunt pulsationis organa?

C. Arteriae.

D. Quodnam est princeps organum functionum naturalium?

C. Hepar. Est enim facultatis naturalis, venarumque omnium principium, & primum generandi sanguinis instrumentum.

D. Quotuplicia sunt organa facultati naturali subseruientia?

C. Duplicia. Alia enim nutritioni, alia generationi dicata.

D. Quanam sunt subministrantia nutritionis organa?

C. Ea trium sunt generum. Alia quippe præparando, alia expurgando, alia distribuendo alimento inferunt.

Deducētia.
Excipientia.

Mouētia.

Quæ
pulvis
organa.
Princeps
organum
functio-
num na-
turalium.

Quotu-
plicia sunt
organa
facultati
naturali
subser-
uientia.

Quana-
tritioni
famula-
tur.

D. Quanam præparando alimento inserviunt?

Organa
inserviē-
tia ali-
mento
præpa-
rando.

C. Os & ventriculus cibum præparant, illud manducatione, hic coctione.

D. Quanam expurgando alimento inserviunt?

Expur-
gando.

C. Ea duorum sunt generum. Alia quippe chylo, alia sanguini expurgando suam dicarunt operam. Intestina chylo expurgando dicata sunt. Chyli siquidem excrementa per aluum expellunt. Kystis fellis, lien, renes & vesica, ad sanguinis expurgationem destinata sunt organa. Excipiunt enim & secernunt à sanguine excrementitios humores è substantia chylosa in hæmatosi procreatos.

D. Quanam distribuendo alimento inserviunt?

D. Ari-
buendo.

C. Venæ.

D. Quotuplex venarum genus?

C. Duplex, vnum jampridem Anatomicis omnibus notum, quo sanguis ab hepate per uniuersum corpus dispergitur, duas complectēs species, venam portam vulgò nuncupatam, quæ crassiorem intestinis alendis, &

Venarū
genera.

Vetustū.

venam caviā quæ tenuiorem sanguinem cæteris corporis partibus nutriendis dispergit: alterum nouissimè à Gaspare Asellio Cremonensi, Nouum.
Anatomico Ticinensi in viuis animalibus disseccandis inuentum, A quo inuentū. mox à nobis in academia Remensi obseruatum, quo chylus, in ventriculo confectus, ad hepar deferitur.

D. Quando & quomodo Asellius ad horum vasorum Chylodochon antiquioribus Medicis ignotorum inuentionem peruenit?

C. Cùm fortè fortunâ, anno 1622. Quando & quomodo.
die 23. Iulij, canem benè habitum, benèque pastum, secundum viuum sumpsisset, aperto abdomine, præter triplicia vasa Mesaraïca, vulgares venas, arterias & neruos, repentiè plurimos candentiū vasorū ramulos, eòsque tenuissimos ceu funiculos per omne mesenterium & per intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicatus est; & quidem Vt à reliquis vasis Mesaraïcis distinctū.
à reliquis vasis mesaraïcis distinctos, cavitatē à neruis, tenuitatē tunicarum ab arterijs, candore à venis, ab omnibus simul succo, quem includūt,

qui neruis nullus, in venis & arterijs colore & totâ substantiâ dispar. Vbi quippe adacto scalpello vnum ex illis peritudit, confestim liquorem album cremoris instar proflire vidit. Hoc facto periculo, totum se dedit ad perquirendam in aliis etiam animalibus veritatem. In quam curam ita incubuit, vt nullus mensis abierit sine viuâ vna, aut altera sectione, non canum tantum, sed & felium, agnorum, porcorum, vaccarum, equorum. Hominem viuum non incidisse fatetur, sed pro certo statuit, quæ in tot brutis visa illi sunt candida vasa, in vno homine non deficere. Nec credibile esse in re tam necessaria plus de bestiis, quam hominibus naturam, communem omnium parentem, laborasse; & illis matrem, nobis nouercam fuisse.

D. Quomodo vocantur hæc vasa?

Cur lactearum
venarum
nomen
adeptus
sit.

C. Inuentor lacteas venas, & absolute lactes appellauit, quod lactis candorem referant, & humorem lacti similem in se contineant.

D. Quam putas causam cur hæc lactea vena ad nostrum vsque seculum, tot perspicaces Anatomicos latuerint?

C. Quia non in viuis, sed demortuis animalibus, anatomes suas instituerunt, in quibus has venas experientia docet, ita confestim vanescere, ut omnem aspectum etiam attentissimum fallant, atque effugiant.

Cur tantum
diu lacteæ
venæ lateant.

D. At Galenus sexcentas viuas sectiones se administrasse gloriatur. Erasistratus & Herophilus plures etiam homines viuos olim secuerunt, quæ fieri potest, ut lacteas hasce venas non deprehenderint?

Obiectio.

C. Viua quidem secuerunt animalia, sed non suo tempore, aut scilicet absoluta iam perfectaque, aut nedum tentata, inchoataque chyli distributione, atque ad hepar delatione. Senertus huius rei rationem reddit: Causa ob quam animalia viua secuerunt Antiqui, est ut motum cordis, vel cerebri, vel diaphragmatis, vel vocis instrumenta viderent, & inuestigarent, vel quomodo cibus in ventriculo mutaretur, agnoscerent. Quæ dum fiunt, ipsa interim moriuntur, mox lacteæ venæ delitescent & exolescent.

Solutio.

Cur moriente animali lacteæ venæ evanescant.

D. Cur in mortuis, aut etiam morientibus, ita repente exhausto, qui in eis est

succo, obliterantur vene istæ?

C. In ijs animalibus, quæ fato suo, aut vi morbi pereunt, non magnopere mirandum, quod functiones naturales omnes, inter quas non minima illa chyli est confectio ac distributio, exoletæ iacent, & cum ipsis veluti emoriuntur. At cur idem iis quoque vsuvenit, quæ sectione viua, citra morbum violenter occumbunt, rationi consentaneum videtur, quod ex ingenti dolore à sectione orto spiritus dissipentur, ad quorum instaurationem cor novam ex hepate materiam rapit, hepar subinde ex hisce venulis lacteum succum valido tractu totum exhaurit, quo ille privata, nec nouo alio in exhausti locum reposito, præ sui tenuitate necessario concidit, collabuntur, ac se sensui subducunt.

D. Lactearum venarum sedem in mesenterio quidem constituisti, sed originem & insertionem nondum aperuisti?

Lactearum venarum origo. Curie cori tribuatur.

C. De hac re obscura, nihil absolute decernit Asellius, liberum cuique iudicium relinquit. Principium iecori, an pancreati debeant istæ venæ, in dubium reuocat. Cum in iecoris gratiam

tiam prorsus extitisse videantur, ab eo
 oriri verisimile esse censet. Annuit ni-
 hilominus quorundam opinioni, qui
 à pancreate earum originem repetūt: Cur pē-
creati.
 quia pancreas maxima glandula est,
 colore istis venis haud absumili, in
 qua omnes coeunt, & miris anfracti-
 bus ac gyris toto eius corpore intextæ
 & implicatæ conspiciantur, inde que-
 tum deorsum ad intestina, tum sur-
 sum ad hepar porrigi appareant.

D. Lactium origo. Candidare, nec he- Cur ab
intesti-
nis po-
tius de-
catur.
pati, nec pancreati accepta mihi videtur.
 Rationi quippe consentaneum ipsas venas
 ab ijs locis primordium capere, a quibus
 perfectus chylus in hepar primum deriva-
 tur: Sed simul ac confectus in ventriculo
 chylus est, in intestina deponitur, à quibus
 per lactes ad hepar defertur. Ergo lactea
 vena ab intestinis ducunt originem. Id-
 circo hirudinum instar ad interiorem
 intestinorum capacitatem suis oscillis hinc,
 ac spongiosis capitulis intus penetranti-
 bus instruuntur, quæ tanquam radices chy-
 lum ex illis sugunt, ac pluribus valvulis
 intus foras spectantibus, quæ impediunt ne
 chylus remeat in partem unde haustus est.
 Desinuntque in crustam, quæ operimenti

vicem supplet, ne obliteratis earum oscillis, occacatisve à sordibus, chyli pereat distributio, abolescatque. Ab intestinis igitur per mesenterium obliquo ductu, duae inter eius tunicas, partim seorsum à vasis reliquis, partim cum illis una, modo recto ductu, modo eadem transcendentes & veluti decussantes, per plures glandulas, ad diremptis ramorum praesertim collocatas, in pancreas usque perferuntur. Ut autem longiori morà chylus magis magisque elaboraretur, puriorque euaderet, in pancreate variè cancellorum in modum, vel specieretium lactes implexæ sibi inuicem, & corpore confuse, in plurimos gyros, anfractusque hac illac, ut in labyrinthis intorquentur. Ab eo rursus maioribus iam ramis per porta latera, quam quibusdam locis corolla instar, sine annuli incingunt, ambiuntque, in iecoris caua subeunt. Inde in minutissimos surculos discissæ, veluti quadam capillamenta in hepatis carnem quaquaueversum, tandiu disperguntur, disseminanturque, dum prorsus obliterentur. Dic mihi, Candidate, cur lactea vena adeo tenues & pusilla sunt in hepate?

Cur lactea
ades ad-
eò te-
nues &
pusillæ
sint in
hepate?

C. Ut quàm fieri potest in minutissimas partes diuisus, distractusque

chylus, illinc trahatur commodius, minima quaque sui parte à vi hepatis contactus.

D. Possuntne lactea vena admodum exiles & angusta sufficientem alimentarij succi quantitatem iecori suggerere, ad conficiendam sanguinis copiam toti corpori nutriendo necessariam?

C. Maximè. Siquidem oculorū fides eas propemodū infinitas esse docet, adeò ut non magnitudine quidē, sed numero Mesaraicas rubras plurimum excedant. Quippè non solū eas comitantur ubicunque sunt, sed pluribus locis, vbi illarū nulla cernitur, spatiis intermediis ipsæ nihilominus & copiosis surculis veluti fruticant. Sed plurimæ ad gracilia, pauciores ad crassa pertinent intestina: quod illa succi alibilis, hæc fæcum & purgamentorum inutilium receptacula sint; ac illa proinde distributioni, hæc excretioni magis inferuiant. Nullæ prorsus ex eis ad ventriculum delatæ conspiciuntur, ne imperfectum inde chylum trahant.

Cur tãtū chyli suppetit iecori, quātum sanguinis toti corpori nutriendo requiritur.

D. Cur numerosa sunt lactea vena per omnia intestina fusa, eaque parua, non

autem pauca, & ampla?

Cur nu-
merosa;
sint se-
parata;
nō pau-
ca &
ampla.

C. Ne crassæ & inutiles chyli par-
tes simul cum vtilibus temerè in eas
subeant: & ne confertim & tumultua-
riè fiat distributio.

D. Quomodo per lacteas venas tam exi-
guas chylus sanguine etiam crassior perla-
bitur?

Qui per
tam exi-
guas la-
cteas chy-
lus san-
guine
crassior
perma-
nat.

C. Quidam chylum sanguine res-
nuiores faciunt, quia minus est, quàm
ille excoctus. Crassescit autem omne,
quod coquitur. Sed quicquid sit de
hac crassitie, nihil ea chyli distribu-
tionem impedire potest. Ita enim ab
aquofo cibi vehiculo diluitur, ut
vel arctiores venas subire posse vi-
deatur.

D. Quà fieri potest ut excrementitia bi-
lis ab hepate per proprium ductum ad ieju-
num depulsa, chylum quem lactea vena
hauriunt, nec colore nec viru suo contami-
net?

Cur chy-
lus què
lactes su-
gunt nō
inquinè-
tur à bi-
le quæ
ad inte-
stina de-
traditur.

C. Quia nunquam nisi perfecta
prorsus chyli distributione, cum scilicet
depellendæ detergendæque cibi
reliquiæ sunt, in intestina bilis exci-
dit, dum integra sanitate corpus est,
nec à statu suo motum.

D. Sed iam satis de Chylodochis venis nuperrimè reperiis differuimus. Venâ traducendo sanguini dicata clariùs in administratione Anatomica demonstrabuntur. Recensuisti omnia nutritionis organa, enumera nunc generationis instrumenta?

C. Generationis organa quædam Genera-
tionis
organâ.
mari & feminæ communia sunt, alia alterutri sexui propria.

D. Quanam utrique sexui communia sunt?

C. Testes, & vasa spermatica, cùm Com-
munia.
præparantia, tùm deferentia.

D. Quanam propria?

C. Penis mari, vterus fœminæ pro- Propria.
prius.

DE HUMORIBVS.

D. Enumeratis partibus continentibus, ad contentas transeundum est. Quanam sunt partes contentæ?

C. Partes fluidæ, quæ aliarum ad- Quæ sint
contetæ
partes.
miniculo sustentantur, quales sunt humores & spiritus: illos generali nomine τὰ ἰσχυρὰ, hos verò τὰ ἐρρευσνυτά, id est impellentia vocat, Hippocrates.

D. Quotuplices in corpore continentur humores?

Quot
plures
humores

C. Præter primigenium, aduentitium duplices in corpore continentur humores, alimentarii nimirum, & excrementitii.

D. Quid vocas humores alimentarios?

Quid
humores
alimen-
tarij.

C. Succos partium solidarum nutritioni dicatos, qui ex quatuor elementorum commixtione originem ducunt.

D. Quid excrementitios?

Quid
excre-
mentitii.

C. Superfluos corporis liquores, naturæ vtilis.

D. Quomodo distinguuntur alimentarii humores?

C. In primarios & secundarios.

D. Quinam primarij habentur?

Quid &
quot sint
primarii
humores

C. Qui à chylo in iecore, vi caloris natui geniti, singulis corporis partibus ad nutritionem per venas distribuuntur.

D. Quot sunt primarij humores?

C. Quatuor, sanguis, bilis, melancholia, & pituita, qui simul omnes in venis misti sunt. Hæc quatuor humorum mistura, massa sanguinaria vocatur, ratione sanguinis in ea exuperantis.

D. Quid sanguinis nomine intelligitur?

C. Sanguinis nomen aliquando latè sumitur pro tota massa sanguinaria; sed propriè significat puriorem & benigniorem eius portionem.

Quid sanguis generaliter & propriè dictus.

D. *Quanam est sanguinis temperatura?*

C. Sanguis generaliter acceptus pro tota massa sanguinaria, est *εὐκρατος* benè temperatus; quòd *εὐκρασία* ex equali quatuor humorum contrariorum mixtione, iustàque proportionè & decenti harmonia exurgat: sed per se consideratus, vt purus & syncerus, temperamento calidus est & humidus, aëreæ naturæ emulus. Nec huiusce temperamenti ratione duntaxat, verùm etiam consistentiâ, colore, sapore, & usu, à cæteris humoribus scernitur.

sanguinis temperatura,

D. *Quanam est sanguinis consistentia, quique color, sapor & usus?*

C. Sanguis est consistentia adeo mediocris, vt, dum intra naturæ limites coërcetur, neque crassior, neque tenuior videatur, éstque colore rubeus, gustùque dulcis. Nutrit potissimum musculosas partes, quotièsque præualet, homines carnosos, floridos,

consistia.

Color, sapor, usus.

venustos, blandos & hilares facit.

D. Quibus dominatur sanguis?

*Quibus
domina-
tur.*

C. Pueris, puberibus & adolescentibus, authore Gal. in 3. epid. τὰ παῖδια, καὶ τὰ μετέμια, καὶ οἱ ἐν τῷ μεταξὺ ἀμφοτέρων ἥβηται, πλεῖστον ἔχουσιν τὸ αἷματος χυμὸν. Pueri & adolecentes & in aetatis medio constituti puberes humoris sanguinei plurimum habent, quod à suis vitæ principiiis non ita procul absint.

D. Quando exuperat in corpore?

Et quando.

C. Τὴ ἥβῃ αἷμα πλεῖστον. Vere sanguis vberimus, quod tum frigora remittant, & aquæ superueniant, ait Hippocrates lib. de Nat. human.

D. Quid est bilis?

*Quid
bilis ali-
mentaria.
Eius na-
tura, tem-
peramē-
tum, co-
lor, sa-
por,
usus.*

C. Bilis alimentaria est tenuior pars massæ sanguinariæ, igneæ naturæ particeps, temperamento calida & sicca, colore flava aut pallida, gustu amara: homines quibus redundat macilentos, duros, agiles, præcipientes & iracundos efficiens, affines naturæ suæ partes nutriendas: qua potissimum ratione ab excrementitia differt.

D. Quenam est bilis excrementitia?

C. Quæ ad fellis kystim amandatur, ut ad excrementorum deiectionem incitet atque excitulet, létamque intestinis adhærentem pituitam detergat.

Quid
bilis ex-
cremen-
titia.

D. Quibus dominatur bilis?

C. Η ξανθὴ χολὴ κτ' πρὸ ἀκμαστικῆς ἡλικίας πλεονάζει, Flava bilis ætatem floridam degentibus exuperat, authore Gal. in Aph. 29. l. 3.

Quibus
bilis do-
mina-
tur.

D. Quando exuperat bilis?

C. Τὴν ὀρεοῦς ἢ χολὴν πλεονάζει. Æstate bilis vberissima, ex Hippocrate lib. de Nat. human.

Irregulan-
do.

Necnon & sicca cæli constitutione, quia ἡ ξηρότης τῆς χυμῶς ἐργάζεται χλωδέρους τῇ ποιότητι, siccitas humores efficit qualitate biliosiores, authore Galeno in Aph. 7. lib. 3.

D. Quid est melancholia?

C. Melancholia alimētaria est crassior massæ sanguinariæ pars, nature terrestris, temperamento frigida & sicca, calore nigra, gustu acidâ; Homines quibus exuperat, tristes, cogitabundos, morosos, seueros, & constantes reddens: solidiores siccioresque corporis partes, veluti ossa nu-

Quid
melan-
cholia
alimen-
taria.
Hic na-
turæ

38 *N. Ab. Frambesary*
triens, vnde ab excrementitia plurimum distat.

D. Quanam est melancholia excrementitia?

Quid
melan-
cholia
excre-
mentitia

C. Quæ ad lienem fertur, vbi à benigniori succo alimentum ipsi suppetante secernitur, indeque in ventriculum effunditur, vt ciborum appetentiam excitet, & eos exquisitè retineri, donec concocti sint, cogat.

D. Quæ ætate dominatur melancholia?

Quæ
ætate
domina-
tur.

C. Μέλαινα χολή κτ' πλὴν πνευμασι-
κὴν ἡλικίαν πλεονάζει, Atrabilis ætate
declinante exuperat, authore Gal. in
3. Prog.

D. Quando luxuriat in corpore?

Et quæ-
do.

C. Μέλαινα χολή τὴν φθινοπώρην πλεονάζει,
Atrabilis autumnno plurima, ex Hip. l.
de Nat. human.

D. Quid est pituita?

Quid
pituita
alimen-
taria.
Eius, na-
tura, te-
peramen-
ti color,
sapor,
visus

C. Pituita alimentaria est liquidior
massæ sanguinariæ pars, naturæ aqueæ,
temperamento frigida & humida, co-
lore alba, sapore dulcis, aut potius sa-
poris expers: homines, in quibus lu-
xuriat, segnes, somnolentos, crassos,
pingues, candidos & molles reddens,
cerebro, aliisque frigidis & humidis

partibus alimentum ministrans. Unde ab excrementitia plurimum discrepat.

D. Quanam est pituita excrementitia?

C. Serosa superfluitas, quam renes à sanguine secernunt, & ad vesicam per ureteras transmittunt, ubi urina dicitur.

Quid
pituita
excre-
menti-
tia.

D. Qua ætate pituita dominatur?

C. Καὶ αὐτὴν γεροντικὴν ἡλικίαν πάντοτε ὅτιν ὁ χυμὸς φλεγματοδὴς. In senili ætate plurimus est humor pituitosus, ob caloris nativi penuriam, auth. Gal. in Aph. 13. l. 3.

Qua æ-
tate pi-
tuita
domina-
tur.

D. Quando luxuriat in corpore?

C. Οἱ χειμῶν πληρὸν τὸ σῶμα φλεγματος. Hyems corpus pituita replet, ob pluviarum copiam, noctiumque longitudinem, auth. Hippocrate, lib. de Nat. human.

Et quā-
do.

Necnon & humida cæli constitutio, quoniam ἡ ὑγρότης τοῦ αἰθέρος τὸν φλεγματοδὲς ἀθροίζει χυμὸν καὶ τὸ ὕδατος αἰθριωμάτων ἐν ὁλίγῳ. Aëris ambientis humiditas pituitosos acervat humores, & non paucas generat aquosas superfluitates, auth. Gal. in Aph. 7. l. 3.

D. Quinam secundarij habentur humores?

Qui &
quorū sint
secundarij hu-
mores.

C. Qui è prioribus in quaque corporis parte originem ducunt, vbi exactius postrema elaborantur coctione, è qua duo manifesta prodeunt excrementa, sudor & sordes, præter id quod per insensilem transpirationem exit.

D. Quot sunt secundarij humores?

C. Quatuor enumerantur, pro varietate alterationum quas subeunt, dum ad nutritionem cuiusque partis præparantur. Primus est Appositus in exilibus venis, hinc mox in vacua spatia influxurus: Alter, in partis substantiam diffusus, per eam roris modo spargitur, vnde ros nuncupatur. Tertius, circa villos concreescens, illis agglutinatur, vnde gluten appellatur. Quartus, ceu concretus liquor, solidis floribus ita adhærescit, vt iam sit in similis partis substantiam conuersus, quem cambium ideò vocant. Sic humores varia commutatione tandem in corporis naturam commigrant.

Quod
modò
præter
naturam
equant.

D. Putasne humores corporis naturam constituentes, perpetuò naturales esse?

C. Nequaquam. Vt enim humores,

vbi suam κράσιν & μίξιν seruant, natura-
les sunt: sic vbi à sua κατὰ φύσιν descen-
dunt, præter naturam euadunt. Vnde
corpus modò sanum, modò ægrum, vñ
præclare Hippocrates lib. de Nat. hum.
scriptum reliquit, his verbis: τὸ σῶμα
τὸ ἀνθρώπου ἔχει ἐν ἑαυτῷ αἷμα, & φλέγμα,
& χολὰ δριπνὴν, ξανθίαν & μέλαιναν &
ταῦτά ἐστιν αὐτῷ ἡ φύσις τοῦ σώματος, &
διὰ ταῦτα αἰλεῖν, & ὑγαίνει. Corpus ho-
minis sanguinem in se continet, & pi-
tuitam, & bilem vtrâque, flauam &
atram: quibus natura corporis illius
constituitur, & per quæ ægrotat, & va-
let. Valet enim horum beneficio,
quando scilicet & quoad κράσιν, sibi
inuicem respondent, debita tum quan-
titate, πλῆθος; tum qualitate, δυνάμεις;
& quoad μίξιν, inter se mixti sunt, non
secreti. Ægrotat verò horum malefi-
cio, quando scilicet vel quoad κράσιν,
respectu quantitatis, abundat vnus,
alter deficit; aut qualitatis, facultas
vnus intensior est, alterius remissior:
vel quoad μίξιν, humor vnus à massa
reliquorum humorum segregatur &
recedit. Quando enim segregatur hu-
mor à reliqua massa, necesse est humor

Quomodo
autem
mores
naturæ
les sint
causæ
sanitatis
Quomodo
de hu-
mores
præter
naturam
sint cau-
sæ mor-
bificæ.

omnes
- vii
sic

bum oriri tum in ea parte, à qua præter naturam recessit; tum in ea parte, in quam præter naturam incubuit. Quod si recedens humor à reliquis, extra corpus pellatur, ipsa euacuatio simplicem morbum pariet: sin autem intra corpus maneat, geminus morbus excitabitur: in parte quidem unde excessit, ab euacuatione: in parte verò, in quam incubuit, à repletionem.

D. Quomodo sanguis à natura modo desciscit?

Quo-
modo
sanguis
à natura
modo
desciscit.

C. Cum putrescit, eius tenuior portio in flauam, erassior in atram vertitur bilem. Vnde *χλωδίστερος καὶ μίλας, χολικότερος* euadit. Quin & ab aliis humoribus, qui vel ex fellis vesicula, liene, aliisve partibus in venas influxerunt, vitiosus redditur.

D. Quomodo bilis præter naturam euadit?

Quo-
modo
bilis
præter
naturam
euadat.

C. Cum intra, vel extra venas, à natura sua permutatur.

D. Quotuplex bilis præter naturam gignitur intra venas?

C. Triplex, pallida, vitellina, & atra.

D. Quomodo bilis pallida fit?

C. Ex adinixione serosi humoris.

D. *Quomodo vitellina?*

*Quomodo
de nat
bilis pale-
lida.
Vitellina.
na.*

C. Ex flaua aut pallida fit, dum caloris non naturalis acrimonia vehementius coquitur ac quasi torretur, sic vt inde ex tenui substantia crassiorrem consequatur, & color eius intendatur, crudi lutei ouorum speciem & crassitudine & colore referens.

D. *Quomodo atra?*

C. Ex bile vitellina, per summam exustionem fit bilis atra.

Atra.

D. *Quotuplex bilis prater naturam gignitur extra venas?*

C. Triplex *ægeronidis*, porracea, porricolorem referens: *isidis*, æruginosa, ab æruginis similitudine dicta: & *isidis*, colore cæruleo glastum referens.

*Bilis
porracea.
cæ.*

D. *Vbi & ex qua gignuntur materia?*

C. In ventriculo potissimum proueniunt, & sæpenumero ab esculentis vitijs & mali succi. Conuertitur & in has quandoque vitellina in ventriculum effusa, ex loci frigiditate alium colorem contrahens.

*Æruginosa.
Cerulea.
Vbi &
quæ
runt.*

D. *Quomodo melancholia prater naturam enadit?*

Quomo-
do me-
lancholia
præter
naturam
enadat.

C. Cùm melancholicus humor caloris ardore quasi in cinerem vertitur; adeo ut acris & mordax euadat, hoc discrimine à melancholico succo dissidens, quo fæx vsta à non vsta. Hæc melancholiæ species, & atrabilis, & atrabilarius humor appellatur.

D. Quomodo pituita præter naturam enadit?

Quomo-
do pi-
tuita
præter
naturam
enadat.

C. Cùm in venis, vel extra venas deprauatur.

D. Quotuplex pituita præter naturam gignitur in venis?

C. Duplex, acida & salsa.

D. Quenam est acida?

Pituita
acida.

C. Quæ summè quidem est cruda, & præter primam in ventriculo alterationem, eamque imperfectam, vix ullam aut minimam præterea conceptionem accepit.

D. Quomodo fit salsa?

Quomo-
do fiat
salsa.

C. Salsa redditur ex dulci pituita putrescente, vel ex serosi, tenuisque humoris admixtione.

D. Quotuplex pituita præter naturam gignitur extra venas?

Quæ pi-
tuita a-
quosa.

C. Quadruplex, aquosa, mucosa, vitrea, & gypsea.

D. Quanam est aquosa?

*C. Quæ adeo tenuis est, vt aqua
m. p. plerumque è naribus stillet, aut
à cerebro in subditas partes effunda-
tur.*

D. Quæ mucosa?

C. Quæ mucosæ similis, calore corporis *Mucosa*
cogente, ex tenui crassior reddita est.

D. Quæ vitrea?

C. Quæ vitro fuso substantia ac *Vitrea*
calore similis, mucosa crassior.

D. Quæ gypsea?

C. Quæ gypsi instar crassa est, qua- *Gypsea*
*lis quandoque in articulis cernitur, in
quibus post præcedentes destillatio-
nes tenuioribus materiæ partibus re-
solutis, tandem in extremam tophi
duritiem euadit.*

DE SPIRITIBVS.

*D. Missi humoribus, ad spiritus per-
gamus. Cur eos quæta, i. impellentia di-
cuntur ab Hippocrate?*

C. Quòd eorum ministerio corpo- *Cur spi-*
rea moles animantium moueatur, *ritus im-*
necnon & sentiat, viuat & subsistat: *pellent-*
imò eorum interuentu crassa animan- *tiam no-*
tium corpora, animæ imperio subii- *mine de-*
ciantur, ac sub ditionem potestatem *signa-*
tur.

que suam redigantur: quin & substantia corporea, cum incorporea iis intermediis cohæreat: Quo fit vt corporis & animæ tanquam vinculum habeantur.

D. Quid est spiritus?

Quid & quatuorplex sit spiritus.

C. Spiritus, aëria, tenuis & pellucida est substantia, caloris natui sedes, facultatum vehiculum, primumque obeundarum functionum instrumentum.

D. Quotuplex est spiritus?

C. Duplex, vnus insitus, alter influens.

D. Quinam est insitus?

Quinam insitus.

C. Qui singulis partibus similari-bus à principiis generationis insertus est. Vnde Græcis *ἐμφυτός* dicitur. Cuius fundamentum est humidum radicale.

D. Quinam influens?

Qui influens.

C. Qui aliunde manat, insitumque fouet ac conseruat, facultatem & calorem vbique deferens, ad functiones obeundas.

D. Quotuplex est influens?

Quotuplex sit spiritus influens.

C. Triplex, animalis, vitalis & naturalis.

D. Quinam est spiritus animalis?

C. Qui ex spiritu vitali, atque ex aëre inspirato, in cerebri ventriculis gignitur, vnde per nervos motiuos ac sensitiuos distributus, omnes corporis partes motus ac sensus compotes reddit.

*Quinam
malis.*

D. Quinam est vitalis?

C. Qui in sinistro cordis sinu, ex spiritu naturali, & ex aëre in pulmonibus præparato gignitur; vnde per arterias singulis partibus distribuitur, ad insitum spiritum recreandum, nativum calorem roborandum, viresque instaurandas.

*Qui vi-
talis.*

D. Quinam naturalis?

C. Qui à iecore proficiscens, per venas cum sanguine, in extremas corporis partes diffunditur, generationis, nutritionis ac incrementi auctor.

*Qui na-
turalis.*

D. Spiritus influētis trichotomia, quam luculenter enarrasti, licet à tota fere Medicorum schola Galenum secuta celebretur, ut quæ sit facultatum & functionum, necnon & organicarum partium trichotomie analogæ: vitiosa nihilominus videtur, quòd legitima divisiō in partes inter se dis-

*Obie-
ctio.*

sentaneas fieri debeat: vocabula verò quibus distinguuntur spiritus influentes, & facultates & functiones, atque organicae partes, inter se non dissentiant, sed consentiant: quia omne animale, verè dici potest vitale & omne vitale, naturale.

Respon-
do.

C. Galenus passim nos monet, ne simus de nominibus solliciti, modò res intelligatur. Sed cùm specierum generi subiectarum nomina sunt homonyma, singularum definitiones adèd rem explicat, ut nulla relinquatur amphibolia. Clarioris doctrinae gratia, trichotomia spiritus in duas dichotomias tibi vsitatas diducatur, ac cuiusque speciei definitio subiiciatur, hoc modo: Spiritus influens est animalis, vel vegetalis. Animalis est qui in cerebro genitus, per nervos diffusus, sentiendi & mouendi facultatem singulis partibus tribuit. Vegetalis qui nec sensui, nec motui edendo, dicatus est: Sed vitalis vel naturalis est. Vitalis est halitus tenuis in corde genitus, qui per arterias transmittitur ad vitam singulis membris imperiendam. Naturalis est vapor tenuis in iecore genitus ex sanguine, & cum

eo per venas in totum corpus delatus, ad promouendas actiones naturales. Sic specierum differentia magis apparebit, Si pariter facultatum, functionum, & partium organicarum trichotomia, in duas dichotomias dirimatur, opposita singularum repugnantia, clariùs eluceſcet.

DE FACULTATIBVS.

D. Hactenus de humani corporis partibus solidis & fluidis differuimus: de animæ facultatibus ac functionibus disputatio superest. Cedo animæ definitionem?

C. Anima est forma corporis viuentis. Ab Aristotele definitur entelechia corporis naturalis, organici, potestate vitam habentis. Quid
ablatum.

D. Quid appellas ἐντελέχειαν?

C. Quidam τὸ ἐντελὲς λέγουσιν, perfectionis adeptionem; alij ἐνέργειαν, id est actum interpretantur. At posterior interpretatio mihi non arridet: quia anima non est actus, sed ipsius actus efficiens causa, quemadmodum vita ipsa est actus animæ, non anima.

D. Quoniam in hominis contemplatione versamur, quid si anima humana aperias velim.

Quid
anima
humana.

C. Est quæ vegetalem, sensualem & intellectualem vitam largitur. Ab Aristotele definitur principium viuendi, sentiendi & intelligendi. Ab aliis causa prima omnium functionũ nostri corporis, ad quas obeundas multiplici facultate prædita est.

D. Quid est facultas?

Quid
facultas.

C. Est insita animæ vis, qua ad proferendas actiones ipsa vtitur. A Galeno definitur effectrix actionũ causa. Ideoquæ facultas est appellata, quòd quæ facit, facere possit. Sic facultatis nomine id intelligitur, quod agendi potestatem habet.

Cur sic
appella-
ta.

D. Cur Galenus actionum causam, ad temperamentum refert?

Cur a-
ctionum
causa ad
tempe-
riem re-
feratur.

C. Quia temperies, causa est sine qua non profert anima suas actiones. Idcirco Galenus libro de præfagitione ex pulsibus, facultatis essentia, inquit, in singularum partium commodo temperamento posita est. Nam tum demum suum quæque munus obit strenuè, vbi est temperatissima: contra malè fungitur, si immoderata.

D. Ergo facultas non solum ab anima, sed etiam à temperamēto manat, nisi putes

animam ipsam temperiem esse.

C. Ego animam, temperiem esse non puto, quia anima est substantia, temperies verò accidens: sed facultatem ab utraque dimanare censeo: ab anima quidem, tanquam à forma essentiali, quæ est prima & præcipua causa omnium actionum quas quotidie obimus: à temperie verò, tanquam à forma accidentali, quæ causa est adiuuans, sine cuius ministerio animæ actiones proferri nequeunt.

Cur anima non sit temperies. Vnde facultas dimanet.

D. Quotuplex est facultas?

C. Etsi animæ essentia simplex, quia vnius corporis vnica est forma; facultas tamen triplex, à Medicis statuitur, animalis, vitalis, & naturalis.

Quotuplex sit facultas.

D. Natura corporis architectrix, in ipso statim structura nostræ initio, ad totius conseruationem, singulis partibus facultates quasdam indidit. Ergo tot sunt animæ facultates, quot corporis partes.

Obiectio.

C. Corporis partes suis quæque sunt facultatibus insignitæ, quò totum integrum seruent iis actionibus quibus carere nequit; adeo ut par sit facultatum, & partium organicarum numerus: sed ut partes, sic & faculta-

Solutio.

tes singule, tribus suminis animalium, vitalium & naturalium generibus, continentur.

D. Quanam est facultas animalis?

Quæ & quatuorplex sit facultas animalis.

C. Est quæ solis animalibus obtigit. Unde & illi nomen inditum.

D. Quotuplex est facultas animalis?

C. Triplex, princeps, sentiens & mouens: prima *ὑμενων*, altera *αἰσθητικη*, postrema *κινητικη*, Græcis dicitur.

D. Quanam est princeps facultas?

C. Quæ in solo cerebro, non in aliis organis sedem habet.

D. Quotuplex est?

Quæ & quatuorplex sit princeps facultas.

C. Triplex à Galeno statuitur, imaginatrix, ratiocinatrix & memoratrix. Sed prima & postrema ad anteriorem sensum referuntur ab iis, quibus solus intellectus homini proprius, Principis nomine dignus videtur.

D. Quanam est imaginatrix?

Quæ sit imaginatrix.

C. Est quæ obiectas rerum imagines, à sensibus acceptas concipit & apprehendit: ex quibus permittis & confusis plerumque multa fingendo inducit atque profert, quæ sub sensum non venerat. *φανταστικη*, Græcis dicitur.

D. Quanam

D. Quanam est ratiocinatrix?

C. Mens est, qua præditus homo vnus cæteris antecellit animantibus, cuius opera res incorporeas, formâsque ab omni materia abstractas cognoscit, hinc vniuersales rerum notiones ex aliis alias eliciens. Græcis modò λογιστικὴ, modo διανοητικὴ, interdum νῦν, nonnunquam γνῶμὴ, id est intellectus appellatur.

Quæ ratiocinatrix.

D. Quanam est mēmoratrix?

C. Est quæ forma & imagines rerum, à phantasia representatas, & sub rationis iudiciū reuocatas excipit, recondit, & in se velut consignat. Græcis μνημονευτικὴ, id est recordatrix, dicitur.

Quæ mēmoratrix.

D. Vbi principes animæ facultates locantur?

C. Arabes imaginatricem in anterioribus cerebri ventriculis, ratiocinatricem in medio, recordatricem in posteriore collocant: Sed Græci locis disclusas esse negant, verum per omnes sinus, & per totam cerebri substantiam diffusas putant.

Principiū facultatum sedes.

D. Quid de hac controuersia sentis?

D

Arabum
opinio
impro-
batur.

C. Arabum opinio nequaquam mihi arridet, licet probabilibus videatur rationibus stabilita. Auicenna & Auerroës, principes facultates sedibus distinctas esse, ex eo demonstrare conantur, quod earum altera numquam lædatur, reliquis illæsis: nec sit credibile in eadem subiecti parte dissimiles facultates & functiones existere.

Ego quidem fateor vnā interdum offendi facultatem, cōstantibus aliis. Extat enim apud Galenum elegans historia Theophili, qui tibicines arbitrabatur esse in angulo cubiculi, & assiduè clamitans iubebat eos inde expelli, cū alioqui prudenter differebat, in quo sola imaginatio lædebatur. Extat & historia phrenetici, qui obseratis int⁹ ianuis, singula vasa, quę propriis nominibus designabat, ad fenestras deferabat, prætereuntes ad vnum interrogās iuberētne ea proiicere; in quo sola ratiocinatio lædebatur. Extat & apud Thucydidem historia multorum, qui sæuiente per Græciam peste, ita omnium rerum fuerant oblitī, vt nec familiares, nec

parentes agnoscerent; in quibus sola memoria lædebatur. Sed id ex varia corporis cōstitutione provenit. Anima quippe vna & simplex, pro varietate temperamenti & conformationis instrumentorum, non vbique similiter operatur, nec pares in omnibus vires habet. Alios naturâ animaduertimus imaginatione & ingenio valere, quibus infirma est memoria atque ratiocinatio: alios memoria præstare, quibus nihil aut minimum sit rationis ac iudicii: alios solido ac bene naturali esse iudicio, quorum non æquè prompta sit imaginatio, aut firma memoria: adeo vt nihil mirum si quibusdam delirio lædatur imaginatio, incolumi remanente memoria, necnon & ratiocinatione: vel contra, quia robustior facultas iniuriis externis potentiùs resistit, imbecillior faciliùs succumbit. Quemadmodum igitur in vna & eadem particula diuersæ sunt facultates naturales, attractrix, retentrix, concoctrix & expultrix, quarum vna sæpè læditur, aliis illæsis, nec propterea sedibus disclusas esse dixerit vsquam Medicus, sic

de principibus facultatibus cum Galeno statuendum esse sentio.

Arabum
ratio al-
tera.

Respon-
sio.

Oble-
tio.

Solutio.

Urgent nihilominus Arabes, imaginationem in anterioribus ventriculis, memoriam in posteriore, rationationem in medio sitam ex eo inferentes, quod anterior cerebri pars mollior, & ad recipiendas imagines aptior, postrema durior & ad notiones diutius retinendas convenientior, media verò mediocris sit. At consequentiam nego: sed in anteriore cerebri parte promptius, in posteriore perfectius principes functiones omnes obiri concedo, quod illa mollior, hæc durior sit: quemadmodum si vniuersa cerebri substantia paulò siccior existat, aptius memorari animum, si humidior melius imaginari, si temperatior rectius ratiocinari iudico.

Obijciunt insuper Arabum sectatores, vel ipso Galeni testimonio sinus aliis alios esse nobiliores, quia nobiliorum facultatum sunt sedes. Sed posteriorem ventriculum cæteris præfert Galenus, non quòd in eo meminerit tantum, in medio ratiocinetur, in prioribus imagnetur animus, sed

quod in anterioribus imperfectiùs
 imagnetur, ratiocinetur, meminerit,
 perfectiùs in medio, perfectissimè in
 ultimo, quia perficitur illic spiritus
 animalis.

Addunt Galenum læsa imagina-
 tionetopica remedia syncipiti admo-
 uere, quod in eo phantasiæ sit sedes.

Obie-
 ctio al-
 tera.

Sed non vident Galenum idem præ-
 stare in omnibus penè cerebri affecti-
 bus, vt caro, apoplexia, phrenitide,
 melancholia: non quod diuersæ sint
 facultatum sedes, sed vt vis medica-
 menti ad interiores cerebri partes ce-
 leriùs permeet, ob cranij tenuitatem
 & futuræ coronalis raritatem.

Respon-
 sio.

*D. Perdoctè profectò falsam Arabum
 opinionem de principum facultatum sede
 refutasti, pergamus ad facultates mini-
 strantes.*

Quanam est facultas sentiens?

C. Est quæ ex cerebro per nervos
 sensum in vniuersum corpus trans-
 mittit.

Quæ sit
 facultas
 sentiens.

D. Quid est sensus?

C. Hic *παρὰ τὴν φύσιν* pro sensatione vsur-
 patur. Sed sensus propriè sumptus,
 est facultas ab animali spiritu diffusa

78 *N. Ab. Frambesarij*
organo sensorio intercedente, quo
sensibilia percipiuntur.

D. Quotuplex est sensus?

C. Duplex, interior & exterior.

D. Quinam est sensus interior?

*C. Est qui singulorum sensuum exte-
riorum obiecta discernit.*

*Quid
sensus
interior.*

Sensus communis appellari solet,
quod ei sensus externi omnes circum-
iecti proximè assideant, in quorum
organa nervorum propagines disper-
sæ sunt, quibus anima vires suas ef-
fundit. Primarius ille sensus tanquam
rex atque iudex sedem stabilem habet
in cerebri corpore, è quo velut è sug-
gesto rerum omnium imagines à mi-
nistris & nuntiis sensibus extrinsecus
allatas, & ante se positas contempla-
tur, omnesque sensuum actiones ob-
servat. Galenus sensum communem
sub imaginatrice comprehendit.

D. Quot sunt sensus exteriores?

*Quot
sint sen-
sus exte-
riores.*

*C. Quinque, visus, auditus, odora-
tus, gustus, & tactus.*

D. Quid est visus?

*Quid
visus.*

*C. Est sensus in oculis situs, qui
colores per medium re ipsa conspi-
cium excipit.*

D. Quid auditus?

C. Est sensus in auribus situs, sonos percipiens. Quid auditus.

D. Quid odoratus?

C. Est sensus, qui per narium ductus odores percipit. Quid odoratus.

D. Quid gustus?

C. Est sensus linguæ insidens, qui rerum sapes intefoscit. Quid gustus.

D. Quid tactus?

C. Est sensus, qui nullo proprio organo conclusus, sed toto corpore æquabiliter, neruorum ope diffusus, omnes qualitates tractabiles, earumque differentias animaduertit, vt sunt calor, frigiditas, humiditas, siccitas, durities, mollities, asperitas, læuitas. Quid tactus.

D. Quanam est facultas mouens?

C. Est quæ voluntatis imperio, motum toti corpori, musculorum adminiculo, præbet. Quæ sit facultas mouens.

D. Adhuc de facultate animali. Quanam est facultas vitalis?

C. Est quæ vitalem in corde spiritum gignit, & inde per arterias quoqueuersum diffundit, ad vitæ conseruationem, vnde & illi nomen est impositum. Quæ sit facultas vitalis.

D iij.

D. Quid est vita?

Quid
vita.
Quid
mors.

C. Vita est caloris natiui in humore primigenio micantis permanſio: vt mors eiufdem caloris vitalis eſt extinctio. Ab Ariſtotele vita modò definitur manſio animæ vegetantis in corpore, modo ~~extrema~~ corporis animati: Ab aliis verò modò animæ cum corpore vnio; modò duratio corporis animati vſque ad terminum quo definit eſſe: quemadmodum mors definitur modò ſeparatio animæ à corpore organico, modò corruptio ſubſtancialis corporis animati.

D. Quot facultates vitali inſerviunt?

Quomodo
do facultas
respirandi,
& pulſifica
ſunt vitalis
miniftræ.

C. Duæ, respirans atque pulſans, quia vitalis ſpiritus reſpirationis & pulſus opera procreatur & diſtribuitur. Vt autem reſpiratio, inſpiratione, & expiratione conſtat, ſic & pulſus diaſtole & ſyſtole perficitur.

D. Nonne facultas irascibilis à Philoſophis in corde collocata, ad vitalem pertinet?

Cur facultas
irascibilis
& concupiſcibilis
ad vitalem
ſint referenda.

C. Quoniam ad vitam tuendam, non minùs proſequendum bonum, quàm fugiendum malum, non modò *ſummoſque*, id eſt irascibilis, animoſque

facultas, qua cor mouetur ad obiectum malum repellendum : verum etiam ἐπιθυμητικὴ concupiscibilis, qua cor ad obiectum bonum amplectendum referatur, ad vitalem facultatem referri debet.

D. At Galenus 3. de locis affectis, & lib. de placitis Hipp. & Plat. ut cor irascibilis, sic hepar concupiscibilis facultatis sedem assignat.

Obiectio.

C. Galenus per concupiscibilem illic non intelligit appetentiam, quæ feratur cum apprehensione in obiectum, sed appetitum naturalem ad alimentum, qui licet singulis partibus insitus sit, iecori tamen hæmatoseos officinæ præcipuè tribuitur.

Responsio.

D. Quenam est facultas naturalis?

C. Est quæ sanguinem in iecore gignit, & inde per venas quoquoersum diffundit ad corporis nutritionem, ac cretionem ac procreationem.

Quæ & quomodo simplex sit facultas naturalis.

D. Quotuplex est?

C. Triplex, altrix, auctrix, & generatrix.

D. Quenam est facultas altrix?

C. Altrix quæ σπέρμα Græcis dicitur, est quæ assumptum alimentum in

Quæ sit facultas altrix.

corporis substantiam conuertit, eique assimilat. Restaurat hæc, quod assidua corporis resolutione deperit, & ad vsque extremum vite diem permanet.

D. Quot facultates altrici subseruiunt?

Quæ facultates
altrici-
sint mi-
nistre.

C. Quatuor, attractrix, retentrix, concoctrix, & expultrix.

D. Quanam est attractrix?

Quæ sit
facultas
attra-
ctrix.

C. Est quæ convenientem cuique particulæ succum appetit & attrahit.

D. Quanam est retentrix?

Quæ re-
tentrix.

C. Est quæ attractum succum eo vsque retinet, donec alteratrix eum in naturam partis quæ nutritur, mutauerit.

D. Quanam est concoctrix?

Quæ co-
coctrix.

C. Est quæ id quod attractum, & aliquandiu retentum est, alterat, immutat, concoquit, & parti quæ alitur, apponit, agglutinat & assimilat. Græcis ἀναμορφή, id est alteratrix dicitur.

D. Quanam est expultrix?

Quæ ex-
pultrix.

C. Est quæ id quod à corporis nutritione alienum, & superuacaneum est, segregat & expellit.

D. Quanam est facultas altrix?

C. Est quæ corpus ad præstitutum quoddam à natura tempus, quoquo-
uersum porrigit ac profert. Quæ sit
facultas
auctrix.

D. *Quanam est facultas generatrix?*

C. Est quæ sibi simile quid procreat. Quæ ge-
neratrix.
Ea autem non simplex, sed ex duabus
aliis componitur facultatibus.

D. *Quanam illæ sunt?*

C. Immutatrix & formatrix.

D. *Quenam est facultas immutatrix?*

C. Est quæ primam substantiam, ex qua generatio fit, commutat, & in idoneam convenientemque ipsius quæ generatur materiam conuertit. Quæ im-
muta-
trix. Aliàs alteratrix dicitur.

D. *Quanam est formatrix?*

C. Est quæ formam toti corpori, & cuique parti congruam effingit. Quæ for-
matrix.

D. *Hactenus de facultate animali, vitali & naturali. Estne mutus omnium consensus?*

C. Mutua conspiratione vsque co-
inter se omnes connexæ sunt (inquit Trium
faculta-
tum cō-
sensus,
Fernelius) vt vnaquæque reliquatum
ope consistat. Vitalis cæteras perficit,
& ad agendum impellit, & ab iisdem
mutuis iuuatur officiis. Naturalis
enim pabulum ei suggerit, animalis

D. *vj*

autem pectus pulmonésque agitan-
tum alimenti tum refrigerationis eius
est effectrix.

Animali porro reliquæ duæ mate-
riam subiiciunt: naturalem autem vi-
talis per arterias illapfa tuetur atque
auger, quæ ipsa animali perpetuo
eget.

D. Quis ex mutuo consensu, faculta-
tum ordo statuitur?

Ordo
procrea-
tionis,
dignita-
tis, ne-
cessita-
tis.

C. Procreatione quidem prima est
naturalis, deinde vitalis, postrema ani-
malis.

Nobilitate & dignitate prima &
præstantissima est animalis, ab hac vi-
talis, tertia naturalis. In actionum au-
tem & vitæ necessitate omnium pri-
ma vitalis, proxima naturalis, ultima
animalis.

DE ACTIONIBVS.

D. Facultatem actio sequitur.

Quid est actio?

Quid &
quotu-
plex sit
actio.

C. Est motus à facultate procedēsi
Græcis ἐνέργεια dicitur. Latini functio-
nem, quodque & operationem ap-
pellant.

D. Quotuplex est functio?

C. Vt facultas sic & functio triplex

animalis, vitalis, & naturalis.

D. At Galenus lib. de Sympt. diff. duplicem duntaxat actionem constituit, animalem & naturalem: ἡ ἐνεργησιὶν (inquit) δύο ἴσιν. αἱ ὡροῦνται διαφοραὶ. αἱ μὲν ψυχῆς. αἱ δὲ φύσεως εἰσι. ἣ καλεῖται διὰ τὸ το ψυχικὴ μὲν αἱ ὡροῦνται, φυσικὰ δὲ αἱ δέοντες. Actionum duae sunt primae differentiae. Aliae enim animae, aliae verò naturae: proinde priores animales, secundae verò naturales appellantur.

C. Respondeo Galenum illic sub actionibus naturalibus vitales comprehendere.

D. Quo differunt actiones intellectuales à sensibilibus ?

C. Eo potissimum discrimine seiungantur, quod sensibiles suum quæque organum habeant, quo eduntur, visio oculum, auditio aurem, actio odoratus narem, gustus linguam, tactus cutim: intellectuales verò nullius instrumenti corporei opera indigeant, quia corporis nequaquam participes sunt.

Intelle:
ctuali
& sensib:
ilium
actionē
discrimen.

D. Quasi verò cerebrum non sit functionum mentis organum, cuius temperies ad intellectiones, cogitationes & rationes

86. *N. Ab. Frambesary*
nationes ritè obeundas adeo requiritur, ut
ab eâ labefactatâ delirationes obtingant.

C. Concedo cerebrum imaginationis organum esse, quod corporearum rerum imagines contineat, sed non mentis, nisi quatenus absque sensibilibus imaginibus in corpore operari nequit.

D. Quo discrepant actiones voluntaria à naturalibus?

*Actioni
volunta-
riarum
& natu-
ralium
differen-
tia.*

C. Eo discrepant, quod illæ à voluntate nostra pendeant, ac muscutorum adminiculo cedantur: hæ verò extra omnem voluntatis potestatem, sua sponte, id est solo naturæ instinctu, fibrarum ope fiant.

D. Quotuplices sunt actiones voluntaria?

*Quotu-
plices
sunt a-
ctiones
volun-
taria?
Quæ
ennino
liberæ
sunt.*

C. Duplices. Aliæ siquidem omninò liberæ sunt, aliæ corporis affectibus subditæ.

D. Quanam sunt omnino libera?

C. Quæ perpetuò absque impedimento à nobis, quoties & quando volumus, fiunt, ut locutio & progressio.

D. Quanam affectibus corporis subditæ?

C. Quæ non perpetuò, sed in tempore quodam, vrgentibus corporis affectibus fiunt, vt mictio & egestio.

Quæ affectibus corporis subditæ,

D. *Quomodo distinguuntur functiones vitales?*

C. Actionum vitalium, vna princeps, spiritus vitalis elaboratio: duæ ministræ, respiratio & pulsus. Sub actionibus pulsatilibus continentur & cordis motus, à facultate concupiscibili & irascibili prodeuntes; ab illa quidem, lætitia, spes, amor; in quibus cor dilatatur, vt obiectum bonum amplectatur: ab hac verò, tristitia, metus, odium, in quibus cor constringitur, premitur, angitur, obiectum malum fugiens.

Functionum vitalium distinctio.

Functionum pulsatilibus distinctio.

D. *Estne respiratio animalis, an naturalis actio?*

C. Est actio quidem voluntaria, quia fit musculorum thoracem distendentium & contrahentium ministerio, sed non omnino libera, quia vrgente necessitate editur. Alii respirationem arbitrantur mixtam esse actionem; partim animalem, ratione organorum; partim naturalem, quòd à cordis motu, qui naturalis est, de-

An respiratio animalis sit, vel naturalis actio.

pendeat; quódque nobis dormientibus & vigilantibus obtingat, cum actiones animales per somnum cessent omnes.

D. Estne pulsus, animalis, an naturalis motus?

An pulsus sit animalis, vel naturalis motus.

C. Pulsus, nec à voluntate pendet, nec à natura simpliciter, sed à facultate animæ vitali, quæ naturalis est. Non à voluntate, quia hunc motum nec cohibere, nec excitare possumus pro voluntatis imperio. Non à natura simpliciter, nihil enim mouet in corpore animato, nisi anima, alioqui plures essent formæ. Anima ipsa animalis natura est, quæ ad vnionem cum corpore conseruandam, mouet cor, coquit in ventriculo, & in iecore, & reliqua vitæ munia exequitur. Est ergo pulsus, naturalis cordis motus, à naturali facultate animæ, quæ voluntaria non est, sed vitalis, profectus.

D. Quotuplices à naturali facultate proficiuntur actiones?

Quotuplices actiones naturales.

C. Triplices, nutritio, auctio, generatio.

D. Quid est nutritio?

C. Est adiectio alimenti in corporis

substantiam conuersio.

D. Quomodo fit nutritio?

C. Succus, qui omnem corporis particulam nutriturus est, in exilibus venis primùm apponitur, mox in totam eius substantiam roris instar dispergitur, deinde agglutinatur, demum assimilatur, adeo ut nutritio sit perfecta assimilatio: ut autem assimilatio fiat, agglutinatio præcedat oportet, & agglutinationem irroratio, & irrorationem appositio.

quid
nutritio?
quomodo
fit?

D. Quanam sunt nutritionis ministræ?

C. Attractio, retentio, concoctio, & expulsio.

D. Quomodo sunt hæ functiones?

C. Omnes, dempta concoctione, fibrarum ope perficiuntur, attractio rectarum, retentio obliquarum, expulsio transuersarum. Ut enim in musculis fibræ nutu nostro & arbitrio contractæ, & ad suam originem quasi reductæ, motum efficiunt: ita & naturalibus instrumentis accidit, rectis fibris solius naturæ instinctu contractis alimentum attrahi, transuersis autem astrictis subditam capacitatem in angustiam adduci, & quicquid in

quomodo
fit
attractio,
retentio &
expulsio.

ea continetur expelli. Quia verò obliquæ fibræ intentæ, nec breuiorem nec angustiorē partem reddunt, seruata quadam naturali æquabilitate & constantia, omnia planè continent, nihilque vel attrahunt vel expellunt.

D. Quomodo fit concoctio?

C. Innato dumtaxat nobis calore.

D. Quotplex est concoctio?

C. Triplex, prima in ventriculo, secunda in iecore, tertia in singulis partibus fit.

D. Quid est actio?

C. Est solidarum corporis partium ampliatio in longum, latum, & profundum.

D. Quid est generatio?

C. Est nouæ substantiæ productio. Quæ propter simplex naturæ actio non est, sed ex immutatione, formationeque composita. Duabus hisce functionibus, omnis generatio absoluitur. Dum enim substantia quæuis in aliam transmutatur, propriæ essentia mutatione subit: veluti quando ex semine genitali & sanguine, os, aut neruus, vel alia pars generatur: simul verò & in conuenientem naturæ figuram effingitur.

Quomodo
fit concoctio.
Quotplex sit.

quid actio,

Quid
generatio.

Quomodo
nat.
Quando
fit.

Quando
per
nec.
patu ob.
sineat

Principatum autem hæc præcipuè obtinet, quo tempore fœtus in vtero gestatur.

DE ADMINISTRATIONE

Anatomica.

D. Huc usque de naturali hominis syn- Transi-
thesi disputauimus: placet nunc paucis de tus à
artificiosa Humani corporis analysi te- synth. Et
cum agere: quia nemo corporis totius natu- ad ana-
ram perfectè cognitam habere potest, nisi lysin
singulas eius partes accuratè resolutas, pe- Humanit-
nitus perspectas habuerit. Nón nec corporum corpo-
Humanorum confectioni operam na- ris.
uasti?

C. Ego publicis administrationibus Anatomicis in crebrioribus Aca-
 demijs fieri solitis diligenter à pluri-
 bus annis interfui, vt à π. §. ipse dis-
 cerem singularum partium Anato-
 men, apprimè Medicis necessariam,
 quam sola librorum lectione vix quis-
 quam per se consequi potest. Sed du-
 riores corporis partes velut bases
 mollioribus suffulciendis dicatas, su-
 periectis quibus subiiciuntur, tanquàm
 vestibulis indutas & obiectas, accuratè
 in Skeleto denudatas & detectas per-
 lustraui, antequam molliores duriori-

bus superstratæ à confectoribus in caduere demonstrarentur, vt clariùs ambas haberem perspectas.

D. Quomodo in scholis Medicorum administretur Anatome, ad singularum corporis partium notitiam ἀνοψία consequendam, ex te audire cupio?

Quomodo ad-
mini-
stretur
Anato-
me in
scholis.
Cur à
ventris
sectione
præ mer-
dium ca-
piatur.

Epigast-
rium.
Regio
epiga-
strica.

Omphali-
ca.

C. Cadauer præcelso editoque scamno volubili collocatum, medio theatro perflabili, confidentes spectatorum corona, in caput, thoracem, ventrem & artus distribuitur. Sed venter Græcis κοιλία, sæpiùs γαστήρ dictus, imprimis dissecatur, quod putredini præ cæteris sit magis obnoxius. Quod extrinsecus ventrem integit atque abdit, id vniuersum à Græcis ἐμφαντικόν, à Latinis abdomen appellatur. Sed epigastrica regio ea propriè dicitur, quæ supra umbilicum sita est, cuius partes laterales ὑποχόνδρια nominantur, quia nothis subsunt costis, quæ plerùmque χόνδρια vocantur. Quæ δὲ τὸ ὀμφαλόν, circa umbilicum regio est, inter epigastricam & hypogastricam media, tres digitos lata, umbilicalis nomen sibi vendicat, cuius partes laterales, lumbi vocantur, in qui-

bus renes siti sunt, in dextro dexter, in sinistro sinister. Regio subter umbilicum ad pubem exporrecta, peculiariter ὑπογάστριον, aliàs ἡγαστρον, id est venter imus, nuncupatur, cuius partes laterales ilia, Græcè λαγόνες, dicuntur.

Hypogastrica.

DE VENTRIS ANATOMIE.

D. Designatis sedibus externis, ad Anatomicam ventris ἐγχεσησιν accingamur. Quomodo secari solet in scholis epigastrium, ad ventrem aperiendam atque delegendum?

C. Circinata imprimis sectio circum umbilicum adhibita nouacula in orbem agitur: recta deinde sectio ducitur à medio sternone, ad os usque pe-ctinis: alia demùm transversa ab umbilico protrahitur versus lumbos. His peractis epigastrium in suas partes diuiditur, quarum aliæ continent, aliæ continentur. Ambæ deinceps ordine exhibentur.

Quomodo epigastrium secari soleat in scholis.

D. Quenam sunt continentes epigastrii partes?

C. Continentes epigastrii partes, aliæ sunt duriores, aliæ molliores. Duriores quæ mollioribus sustinendis, κατὰ πρὸς θεμέλια, velut fundamēta, sub-

Continentium ventris partium diuisio duriores abdominis partes.

Propria.

Communes.

sternuntur, propriae sunt vel communes. Propriae sunt ossa ilium, pubis & coxendicis, os sacrum, & quinque lumborum vertebrae: Communes vero sunt inferiora thoracis ossa. Vt enim abdomen deorsum & retrorsum propriis ossibus, ita sursum inferioribus thoracis ossibus cohaeret & innititur.

Os iliū.

Os pubis.

Ischion.

Os sacrum.

Ossa ilium, pubis & coxendicis, in iunioribus linea triplici distincta cernuntur, sed ætate prouectis cartilagine qua fuerant copulata in osseam naturam degeneratâ, vnicum os apparet tripartitum, cuius pars prima omnium latissima & suprema, imum ventrem sustinens, os ilium dicitur, quod strictè cum osse sacro committitur: secunda os pubis, pectinisve vocatur, in quo foramen amplum percipitur: tertia ἰσχίον, os coxendicis nominatur, in quo profunda conspicitur cavititas, quam Græci κοτύλην nuncupant, id est acetabulum femoris capiti excipiendo dicatum.

Os sacrum sex constat ossibus, quæ in puerulis facilè separantur: in adultis verò ita coalescunt, vt vnicum ap-

pareat os: à cuius extremo, cartilagineum os appensum caudæ instar demittitur, quod Græcè *κόκκυξ* dicitur, *Coccyx*. tribus quatuorve cartilaginosis ossiculis compactum.

Lumbi quinque vertebri constant, quarum transuersæ apophyses cæteris oblongiores sunt, sed tenuiores *Lumborū vertebrae*. costularum vicem gerentes: acute verò reliquis crassiores, & latiores.

Molliores pariter abdominis partes, quæ durioribus superpositæ prominent, communes sunt, vel propriæ. Communes sunt suprema cuticula, quæ *ἐπίδερμις* Græcè dicitur, cutis verò quæ *στέμμα* nuncupatur, & panniculus carnosus, cui adeps obhæret. Propriæ verò sunt muscoli epigastrii & peritonæum. *Molliores ab abdominis partes. Cōmanes. Epidermis. Cutis. Panniculus carnosus.*

Musculi epigastrii decem enumerantur, ex quibus quatuor obliqui, duo externi, perperam Descendentes dicti, qui priores consectori occurrunt, ac duo interni prioribus subditi, ita oppositas obtinentes fibras, ut decussatim instar literæ X sese intersecent: Duo recti fibris rectis præditi, medium situm occupantes, sub qui-

Propriæ, Musculi epigastrii.

bus venæ duæ, mammaria & epigastrica, circa umbilicum coeuntes videntur, unde in mulieribus mammae cum utero consensus fit: Parui duo pyramidales, rectis succenturiati subter additi: & duo transversii villis transversis contexti, peritonæo firmiter hærentes.

Peritonæum.

Peritonæum membrana quæ in uolucris modo omnibus regionis imæ visceribus *μεταίεται*, id est circumtenditur, unde illi nomen est inditum. Licet autem tenuissima ea sit, duplex tamen conspicitur, inter cuius duplicaturam quatuor umbilicalia vasa feruntur, vena embryi nutricula ab umbilico ad hepatis rimam, arteriæ duæ ad ramos iliacos, & ourachos ad vesicæ fundum, quæ foetu in lucem edito, tanquam emerita in ligamentum degenerant.

Obiectio.

D. Dilucidè continentes epigastrii partes, cum duriores, tum molliores, non modo communes, verum etiam proprias enarrasti; sed antequam ad contentas progrediamur, scire velim cur priores abdominis musculos perperam obliquos descendentes appellari dixeris?

C. Quia

C. Quia abdominis muscoli, quot-
quot sunt, ab osse pubis oriuntur, &
in costas inferiores inseruntur; ac
proinde ascendentes sunt omnes, de-
scēdentes nulli, ut contendit Lauren-
tius cōtra ceteros Anatomicos: quod
musculorum origo firma & stabilis
esse debeat, quale est os pubis; non
autem mobilis, ut thorax.

D. Riolanus Galenicæ doctrinæ de-
fensor, Laurentij sententiam refutat, ac
omnes epigastrij musculos nec ab infernis
partibus oriri, nec in supernas partes inseri
demonstrat. Galenus rectos è xiphaide
cartilagine deorsum in os pubis; alij ex osse
pubis sursum in xiphaidem ferri asserunt.

Muscu-
lorum
epiga-
stri ori-
go &
insertio.

At ceteros cum obliquos, tum transuersos
à transuersis lumborum apophysibus ema-
nare, ac ossibus ilium & costis, quibus obiter
affiguntur, firmatos, in lineam albam de-
sinere, rationi consentaneum videtur. Cum
enim origo & principium musculi suma-
tur ab insertione nerui, omnes autem abdo-
minis muscoli, exceptis rectis, neruos à
costalibus & lumbaxibus accipiant, nemi-
ni dubium esse potest, quin ab ea parte or-
tam ducant. Adde quod omnis musculi in-
sertio semper origini opponatur, ut sunt

principio. Sed præfati muscoli in lineam
albā finiuntur, quæ nihil aliud est quàm
eorū terminus & extremitas, mediū ven-
trem in duas partes; dextram & sinistra
discriminans. Ab extremis igitur parti-
bus oppositis, nimirum lumbis, eos oriri
fatendum est. Nam cum aequali abdominis
cōpressioni inferuiant, facilius & cōmodius
ventrē inferiorem aqualiter compriment,
versus suum principium collecti, & adiuti
diaphragmate, quod deorsum expellit.
Sed de musculis epigastrij abundè satis dis-
putatum est: Anatomicam deinceps par-
tium in epigastrio contentarum demon-
strationem perstringe.

Partes
conting.

Epi-
ploon.

Intesti-
na.

Mesente-
rium.

C. Aperto ventre omentum im-
mis conspicitur, ἐπίπλοον à Græcis ap-
pellatum, quia ventriculi fundo &
intestinis ἐπιπλέει, id est, innatat.

Quo exempto intestina in aper-
tum se dant, tū tenuia, duodenum,
ieiunum, ileum; tū crassa, cæcum,
colon, rectum. His remotis viscera
omnia denudata se produnt, adeo ut
situs adhæsiōesque singulorum per-
spiciuè observari queant. Mesente-
rium tunc speculari licet, ut μέσον &
ἐπίπλοον, medium intestinorum existat,

eaque gestet, distinguat, dorso alliget, venasque mesaraicas tanquam canales sustentet, chylum ex intestinis haurientes, & ad hepar transfuentes, necnon & arterias calorem præbentes, & nervos sensum impertientes.

Quin & glandulosa mesenterio inserta caro, Græcè *μάκρην* appellata, Plicata. oculis subiicitur, quæ loca explet inter ventriculum, hepar & splenem vacua, & velut mollem præbet his visceribus sedem, fulcitque vasa mesenterica.

Ventriculus *σπλῆν* deinceps figura rotunda & oblonga, fistulæ Pastoritæ instar, se manifestè promit, in quo considerantur orificia duo: vnum superius, *στόμαχος* propriè dictum, quo cibis ingreditur: alterum inferius, *πύλωρ* appellatum, quo chylus egreditur. Ventriculus.

Subinde jecur hæmatoseos organum, venarumque principium, in hypochondrio dextro situm ante oculos exponitur, ac venæ portæ origo à caua hepatis parte, & venæ cauæ à gibba perspicuè demonstratur. Hepar.

Et trunco venæ portæ propagines Vena porta.

quatuor obseruantur, Kystica, Gastrica, Gastrepiploica, & Intestinalis, antequàm in duos insignes ramos diuidatur, Splenicum, à quo quatuor emergunt venæ, Gastrica minor, Epiploica anterior, & posterior, Coronaria stomachica: & Mesentericum, à quo innumeræ quidem venæ, sed tres præcipuæ adnotantur, Hamorrhoidalis, Cæcalis & Mesenterica strictè sumpta.

Venæ caua
ascen-
dens.

E trunco autem venæ cauæ ascendentis, quatuor furculi cernuntur, Phrenica, Coronaria, Azygos & Intercoastalis, priusquam dirimatur in ramos tum Subclauios, à quibus Mammaria, Capsularis & Cervicalis prodeunt, cum Axillari, vnde Pectoralis, Cephalica & Basilica: tum Superclauios, à quibus Iugulares duæ, interna, & externa, nascuntur.

Descen-
dens.

E trunco venæ cauæ descendentis, quinque venæ spectantur, Adiposa, Emulgens, SpermatICA, Lumbaris, & Muscula, priusquam in duos ramos Iliacos diuidatur, à quibus quatuor venæ scaturiunt, Sacra, Hypogastrica, Epigastrica, & Pudenda, cum Crurali.

Mox sublatis leniter λοβεῖς hepatis, Kystis
fellis.
 folliculus fellis in apertum profertur,
 duobusque χολιδόχοι ductus in illum per-
 tinentes depræhenduntur, vnus ex eo
 loco vbi vena porta hepar subit, quo
 bilem in se allicit: alter ad duodeni
 terminum, ieiunique initium proie-
 ctus, quo bilis expellitur, ad facum
 deiectionem stimulandam.

Lien figura oblonga & propemo- Lien.
 dum tetragona, linguæ bubulæ spe-
 ciem referens, in hypochondrio si-
 nistro se offert, quæ ventriculum cin-
 git concavus, extrinsecus intumes-
 cens: ac venæ intrò se inferentes, per
 quas ex iecoris cauo succus melan-
 cholicus quasi haustus allicitur, primo
 statim oculorum obtutu obuiæ sunt.

Renes dein serosum humorem san- Renes.
 guini permistum per emulgentia yasa
 prolucentes: & vreteres à cana re- Vreter-
res:
 num parte orti, & vesicæ lateribus
 implantati, eum transmittentes, ac-
 curatè considerantur:

Vesica tandem in hypogastrio su- Vesica.
 pra rectum intestinum in viris, inter
 vterum autem & os pubis in fœminis
 sita videtur.

Testes.

Testes insuper & vasa spermatica, præparantia & deferentia sedulo lustratur. Si mulier consecatur, modicè sublata vesica, vterus apertè cõmonstratur, in eoque situs, figura, cornua, testes, ceruix, canalis, orificium gremium, atque huic infixæ venæ omnes observantur.

Vterus.

DE THORACIS ANATOMIE.

Transitus à partibus naturalibus ad vitales.

D. Partes naturales ventre conclusas solerter ordine Anatomico recensuisti omnes, eodem vitales in thorace contentas aperiri, simul ac continentibus enarraveris.

Continentium thoracis partium divisio.

C. Continentes thoracis partes, aliæ sunt duriores, aliæ molliores.

Duriores thoracis partes. Claviculae

Duriores mollioribus sustinendis & fulciendis dicatae, sunt claviculae duae, thoracem claudentes, quibus superior situs obtigit: dorsi vertebrae duodecim, posteriorem thoracis partem constituentes; ut anteriorem sternum septem ossibus in transversum coherentibus constans; à cuius extremo dependet cartilago *expositio*, ensis effigiem representans: & costae duodecim utrumque latus occupantes, septem legitimæ quæ sterno articulantur, & quinque spuriae quæ ad ster-

2. Dorsi vertebrae

12. Sternum 7. ossibus constans.

Cartilago xiphoides. Costae 12.

num neutiquam perueniunt.

Molliores verò partes, quæ durioribus supersternuntur, sunt thoracis muscoli, quorum alii communes, alii proprii.

Molliores thoracis partes.

Communes qui in thorace quidem siti, sed aliis partibus inserviunt, ut in anteriore thoracis parte Pectoralis brachio, & Serratus minor omoplatæ: in posteriore Trapezium & Rhomboides, scapulæ item mouendæ dicati. Suam tamen thoraci præstât operam, tanquam subsidiarij. Hi quia priores occurrunt, prius fecandi sunt; & obiter demonstrandi, sed inter artuum musculos describendi.

Musculi thoracis communes.

Proprii verò thoracem mouentes hæc duntaxat explicandi, perlustratis mammis, quæ detracta cute, in anteriore thoracis parte, omnium primæ se offerunt, Pectoralibus musculis incubantes, in maribus quidem ex cutaneis tantum papillis copioso adipe circumfusus conflata; in fœminis verò præter adipem maiori artificio ex multiplicibus glandulis, vasorum myriadibus intertextis constructæ, quibus *μαλεκτοπνηλικὴ δὺβαις*, i. lactis

proprii.

Mammæ.

generandi facultas insita est.

**Motus
thoracis
necessi-
tas.**

Thorax est vitalium partium custos. Absque respiratione vita subsistere nequit. Respiratio motu thoracis perficitur. Thoracem igitur moveri oportuit, ut pulmones dilatarentur inspiratione, ac contraherentur expiratione. Dilatatio fit elevatione, contractio depressione thoracis.

**Musculi
thoracis
inspirando
dilatantes.**

Dilatant attolluntque thoracem musculi quatuor costis superstrati, duo antici, Subclavius & Serratus maior: duo postici, Serratus superior & Serratus inferior: & Intercostales externi undecim.

Subclavius.

Subclavius à clavicula interna exortus oblique antrorsum in primam costam prope sternum inseritur.

**Serratus
maior.**

Serratus maior ex interna omoplate basi enatus, in septem superiores costas serratim inseritur, ubi cum obliquo epigastrii externo pectinatim, digitatimque committitur.

**Serratus
superior.**

Serratus superior sub Rhomboide situs, ex spinis cervicis tribus inferioribus, & prima dorsi exortus, oblique in tres costas superiores desinit.

Serratus inferior ex inferioribus dorsi, & superioribus lumborum spinis pronatus, in tres quatuorve inferiores costas digitatim inseritur.

Serratus inferior.

Intercostales externi ex costæ infero latere, in subditæ costæ latus superum obliquè antrorsum feruntur.

Intercostales externi.

Contrahunt, deprimuntque thoracem musculi duo, costis incubantes, Sacrolumbus & Triangularis, atque Intercostales interni vndecim.

Musculi thoracis expirando contrahentes.

Sacrolumbus ab osse sacro & spinis lumborum ortus, in costas ferè omnes protenditur, prope ipsarum radicem, singulis duplicem tēdinem tribuens.

Sacrolumbus.

Triangularis internam sterni partem occupans, ab inferiore eius parte ortus, & fursum protensus, cartilagineas deorsum adducit, pectusque angustat.

Triangularis.

Intercostales interni ex costæ supero latere in suprapositæ latus inferum obliquè antrorsum inseruntur, externos ubique in X literæ formam intersecantes.

Intercostales interni.

Has thoracis actiones multum iuvant, tum diaphragma, tum musculi epigastrij.

D. Sed de musculis thoracem moventibus quidem satis: ad interiorem eius apertionem progredere, ut singula vitalis facultatis organa intus recondita oculis subiicias.

Thora-
cis aper-
tio.

C. Discissis utrinque extremitatibus costarum cartilaginosis, sublatoque sterno, omnia quaecumque thoracis capacitas includit, aperte recluduntur:

Dia-
phrag-
ma.
Pleura.

Primum quidem Diaphragma è costarum extremis natum, iisque supra subterque annexum: deinde Pleura, costas succingens membrana, atque Mediastinum à Pleura ortum & sterno alligatum, totam thoracis cavitatem secundum longitudinem in duas partes, dextram & sinistram dirimens.

pulmo-
nes.

Secundo Mediastino. Pulmones respirationis authores, bubuli pedis figuram representantes, contemplari expedit, ut ij cor amplectentur, omnemque capacitatem impleant.

Peri-
cardiū.
Jor.

Ab his Pericardium suprà aperitur, ut cor Princeps facultatis vitalis organū, in eo velut capsula inclusum, circumfusæ aquæ innatans cōspiciatur.

Duo in corde ventriculi, medio scripto disclusi. observantur, dexter sanguinis elaborationi dicatus, & sinister spiritus vitalis generationi destinatus.

Cordis
ventriculi.

In ventriculis item quatuor insignia vasa cernuntur, duo in dextro, vena caua cor ingrediens, & vena arteriosa ex eo egrediens: duo pariter in sinistro, arteria magna, Aorta Græcis dicta, vitalem spiritum per totum corpus diffundens, & arteria venosa aërem à pulmonibus aduehens, ac fuliginem foras reuehens.

Cordis
vasa.

In vasorum orificiis valvulae undecim percipiuntur, sex in ventriculo dextro, tres in orificio venae cauae foris apertae, intus clausae: & totidem in orificio venae arteriosae intus apertae, foris clausae: quinque verò in ventriculo sinistro, tres in arteriae aortae orificio intus apertae, foris clausae, duae autem in arteria venosa foris apertae, intus clausae.

Valvulae.

Duae insuper in basi cordis auriculae animadvertuntur, dextra venae cauae ostio adiacens, & sinistra arteriae venosae.

Auriculae.

Distributio
arteriæ
magnæ.

Ascen-
dentis.

Descen-
dentis.

Transi-
tus ad
partes
animæ
les.

Magna arteria è sinistro cordis sinu
profiliens, missa ad eius basim & am-
bitum ramulo, coronæ instar, mox to-
ta quasi in duos prægrandes stipites
dirempta conspicitur, quorum trun-
cus maior deorsum secundum lum-
borum vertebrae contorquetur: mi-
nor sursum ad claviculas usque fer-
tur, ubi in duos insignes ramos Sub-
clavios diuiditur, à quibus quinque
utrinque emergunt arteriæ, Interco-
stalis superior, Mammaria, Musculo-
sa, Cervicalis & Carotis, cum Axil-
lari, unde Thoracica & Basilica inte-
rior & exterior procedunt.

Ab arteriæ descendente trunco
propagines novem emanare vident-
ur, Intercoastalis maior, Phrenica,
Celiacæ, Mesenterica superior & in-
ferior, renalis, Spermatice, Lumbaris
& Musculosa: deinde in duos præ-
grandes ramos Iliacos diuisa specta-
tur, à quibus utrinque propagantur
quinque arteriæ, Sacra, Hypogastrica,
Umbilicalis, Epigastrica, & Pu-
denda, cum Crurali.

DE CAPITIS ANATOMIE.

D. Demonstratis naturalibus & vi-

talibus partibus per Anatomiam administrationem, partes animales in capite contentae pariter indicanda supersunt, ubi dilucide continentes exposueris?

C. Caput tribus constituitur partibus, quarum suprema capillis recta, cerebrum complectens, totius nomen retinet: media, facies nobis, *πρόσωπον* Græcis dicitur: infima *νεαχιλος* & *αὐχὴν* à Græcis, collum & ceruix à nobis nuncupatur. Anterior capillati Capitis pars, Græcis *βρέγμα*, nobis synciput appellatur, posterior *ὀπίον*, occiput, laterales partes *κρόταφοι*, tempora vocantur.

Continentes capitis partes, aliae sunt duriores, aliae molliores.

Duriores mollioribus sustentandis & stabiliendis dicatae, sunt ossa calvariae, quam Græci *κρανιον* vocant, quod sit, veluti *κρανίς*, id est galea, cerebrum undequaque obvallans.

Cranii ossa, quaedam communia sunt, alia propria.

Propria sunt quinque, Syncipitis duo, Græcis *βρέγματα*, parietalia vulgò dicta; occipitis unum, quod *ὀπίον* Græci vocant; temporum duo, squammæ

Caput
capilla-
tum.

Facies.
Collum.
Syn-
ciput.

Occi-
put.
Tempora.

Conti-
nentium.

capitis
partium
divisio.

Durio-
res capi-
tis par-
tes.

Calvarie
ossa.

Propria

5.
Syncipitis

2.
Occipi-
tis

1.
Tempo-
rum

2.

similia, ideo λεπτότες sū Græcè, squam-
mosa Latinè nuncupata, in quibus
tres conspiciuntur apophyses: vna à
μαῖα, i. papillæ, mammarum similitu-
dine Mastoïdes appellata: altera à si-
militudine στήλη, i. columnæ, Styloïdes
dicta: tertia Zygomatis portionē con-
stituens, Zygomatīca inde nuncu-
pata.

Comu-
nia
3.

Communia verò sunt tria, os fron-
tis anteriorem cranii, & superiorem
faciei partem constituens, quod ple-
rūmque vnum & integrum est, ali-
quando in medio diuisum cernitur,
os Coronale vulgò dicitur.

Os Co-
ronale.
Sphe-
noïdes.

Sphenoides sic dictum ἀπὸ τοῦ σφην-
ος, quod cunei modo, cranii & faciei
ossibus inferatur. Basilare vulgò vo-
catur, quod caluarię basim constituat.
Apophyses habet internas κατωθεντικὰς
appellatas, quod inferiorē lecti par-
tem referant; & externas περιγώδικας
dictas, quod vesperilionum περιγῶνα, id
est alam, representent.

Ethmoï-
des.

Ethmoïdes in media frontis basi
positum, & ad summam nasi radicem
intus fixum, sic dictum quod cribri
modo perforatum sit.

Cranii ossa futuris inuicem connectuntur. Suturae in cranio quinque sunt, tres verae: prima Coronalis dicta, quod ea capitis parte coronae gestari soleant: secunda in capitis longitudinem porrecta, Sagittalis nomen sortita: tertia à figura literae A, Lambdoides appellata: & duae mendosae, quae squamosae nuncupantur.

Suturae
cranii.

Adhuc duriores capitis partes fuerunt, molliores supersunt.

Molliores capitis partes quae durioribus adherent: aliae sunt communes, ut cutis capillata & panniculus carnosus: aliae propriae, ut pericranium, membrana cranium extrinsecus tegens, & Meninges cerebrum proximè ambientes; crassa & tenuis, pluribus venis & arteriis ad suam & cerebri nutritionem vitamque contextae, quas Arabes vocant matres, quasi ab his ceterae omnes membranae propagarentur. Crassa meningum à superno cranio tantum distat, quantum cerebro dilatando & constringendo satis est. Alligatur tamen cranio villorum interiectu, qui per suturas egredientes & expansi pericranium creant.

Molliores
res capi-
tis par-
tes.
Communes.
Cutis
capillata.
Panniculus
carnosus,
propriae.
Pericranion.
Meninges.
Crassa.

Tenuis. Tenuis meninx proprium est & immediatum cerebri velamen, non exteriorem modò eius superficiem tegens, sed in penitiores eius recessus peruadens.

D. A continentibus capitis partibus, ad contentas transeundum est. Quanam sunt partes contentae?

**Partes
conten-
tae.**

C. Cerebrum, cerebellum, huic continua medulla spinalis, nerui inde propagati, & aliae illis inclusae partes, quas ipsa dissectio patefacit.

**Apertio
cranii.**

Ad cerebrum demonstrandum & quicquid in eo notatu dignum per-lustrandum, orbiculatim cranium serrâ circunciditur, mox sensim extirpatur, vt qui è meningibus per futuras in pericranion emanant villi spectentur.

**Duplex
cranii la-
mina.
Diploë.**

Exempto cranii operculo, in marginibus duplex ossis lamina considerata-
tur & interiecta diploë rubicunda, id est fungosa substantia sanguine con-spersa, è venis capillaribus inter du-plex tabulatum eximente.

**Cere-
brum.**

Corpus caluariæ subiectum duplex conspicitur, anterius quod Græcis *ἑξίπικον*, nobis cerebrum propriè di-

citur, & posterius quod *παρακείμενον*,
id est cerebellum, appellatur.

Cere-
bellum.

Cerebrum autem in dexteram & sinistram partem septo proprio discretum animadvertitur. Visu percipiuntur ambæ meninges iunctæ, inter priores cerebri partes demersæ, cerebrum à cerebello determinantes.

Extima cerebri superficies, mollis, subcineritia, multis gyris & vermicibus multiformi velut implexu striata, pluribusque venulis & arteriis con-

Exte-
rior ce-
rebri su-
perfici-
es.

spersa quidem videtur: sed superiore illa medullæ portione duorum triumve digitorum crassitie minutatim resecatâ, statim se offert altera cerebri pars durior, candidior, levis & uniformis, venulis & arteriis nullis obfita, quam veteres Græci *παλῶδες σῶμα*, id est callosum corpus, ob duritiem

Callosū
corpus.

appellarunt. Cuius interuentu quæ prius discretæ erant cerebri partes, dextra & læva continuantur. Mox callosa hæc substantia in medio ferè cerebro geminis ventriculis dextro & sinistro in semicirculi formam excavata cernitur. Hi sunt priores cerebri sinus, omnium amplissimi, septo lu-

priores
cerebræ
ventri-
culi.

cido discreti, quos anteriores vocat Galenus, superiores appellare mauult Laurentius.

His substernitur tertius in posteriorem partem vergens; & sub tertio quartus, ad cerebelli præcipitium, versus spinalis medullæ initia. Omnes certis ductibus inter se coniuncti sunt, quibus animalis spiritus ab vno in alium commeare possit.

**Plexus
choroi-
des.**

In prioribus ventriculis conspicitur plexus choroides, tenuis meningis epiphyssi, venis arteriisque inuicem variè implexis, in retis formam contextus, in quo spiritus animalis præparatur.

**Priorum
ventri-
culorum
ductus.**

Duo insuper ductus observantur, vnus ad processus mammillares fertur, inspirationi expirationique cerebri, ac suscipiendis odoribus destinatus: alter ad tertium ventriculū dirigetur, spiritum animale deferens.

**Tertius
ventri-
culus.**

In tertio ventriculo multa considerantur, primū *σῆμα ψαλλοειδὲς*, id est corpus camerae modo extructum, & tribus columnis fultum, ad superpositam cerebri molem sustentandam.

Fornix.

Fornix nobis dicitur.

Deinde gemini meatus ab hoc sinu emanantes, quorum vnus ad basim cerebri descendit, à Græcis *ῥοαίν*, id est infundibulum, dictus, per quem excrementitia cerebri pituita in glandem pituitariam defluit: alter ad quartum ventriculum recta fertur, spiritum animale[m] transmittens.

Infundibulum

Hic præterea occurrunt plures particulae, glandula imprimis nuci pineae similis, Græcè *κωνάειον* appellata, quæ vasa in cerebrum diffusa firmat.

Cornu

Duæ deinceps à formâ nates dictæ, ac totidē inferiùs meatum sustentâtes, quæ ratione formæ testes nuncupantur.

Nata

Quartus ventriculus inter cerebellum & spinalem medullam situs est, in quo epiphyses duæ vermiformes ex cerebelli reuolutionibus productæ obseruantur, quæ spiritus animalis transitui præfunt, vt in vltimum hunc sinum sensim dilabatur.

Testes.

Quartus ventriculus.

Epiphyses vermiformes.

Ex posteriori cerebro medulla spinalis, oblongæ caudæ similis propendet. Haud absimilis est cerebro, præterquam quod motu caret, & multò durior est. Duabus pariter membranis inuestitur, quarum vna, à tenui; altera.

Medulla spinalis.

Qui similitudo est cerebro.

Quomo-
do sit in
duas
portio-
nes divi-
sa.

à crassa meninge oritur : sed insuper crassa & densa tunica circumdatur. In basi cerebri quatuor radices eo in- uerso spectantur, duæ ex cerebro, tot- idem ex cerebello prodeuntes, qui- bus simul iunctis conflatur spinalis medullæ corpus bipertitum, atque te- nuï meninge secretum, ita ut vna me- dullæ pars resolui possit, integra & il- lassa remanente altera.

Nerui,

Nerui sunt canales substantiæ mem- branæ ex cerebro deferentes spiri- tum animale in singula corporis membra, sensus & motus gratiâ. Sunt autem alij molliores, alij duriores.

Mollio-
res.

Molliores nerui sunt, qui à cerebro in alia membra propagantur.

Eorum
paria

Eorum septem sunt paria.

7.

1.

2.

Primum par est neruorum ad ocu- los visus gratiâ destinatorum. Vnde dicuntur nerui optici. Alterum par est neruorum ad oculos motus gra- tiâ commissorum.

3.

Tertium par est neruorum in lin- guæ tunicam, aliasque faciei partes propagatorum.

4.

Quartum par est neruorum in pa- lati tunicam sparsorum.

Quintum par est neruorum per foramen ossis petrosi in auris cauitatem penetrantium. Vnde dicuntur nerui auditorij. 5.

Sextum par est neruorum in omnia viscera thoracis & ventris inferioris distributorum. 6.

Septimum par est neruorum in lingua & laryngis musculos insertorum. 7.

Duriore nerui sunt, qui à spinali medulla ad alia membra pergunt. Diffiores.

Eorum triginta sunt paria: ceruicis octem, dorli duodecim, lumborum inque, ossis sacri sex, quæ singulus varios ramos in reliquas corporis partes diffundunt. Eorum paria 30.

DE FACIEI ANATOMIE.

D. Dissectis capillati capitis partibus, & externis, tum internis, consectio Faciæ sequitur, in qua tam admirabilis exornatura industria, ut ex infinita hominum multitudine, ne duos quidem ita similes perias, quin aliqua faciei dissimilitudine distingui queant. Quæ profectò facies suis mutationibus suis, indicat, & exprimit, quibus passionibus afficiatur animus spe vel metu, an gaudio vel mœ-

Transitus à capite pilis testato, ad Faciem.

rore tentetur : quo statim nostrum sit corpus, sano, agro, an neutro. Quare cum facies tanti sit in nobis momenti, Anatomica eius descriptio aperte exequenda. Quomodo facies diuiditur?

Facies
diuisio.
Pars su-
perior.
Infe-
rior.

C. In superiorem & inferiorem partem. Superior faciei pars Græcis *μετωπον*, nobis frons dicitur. A syncipite ad supercilia protenditur. Inferior pars complectitur quicquid à superciliis in mentum usque patet, ut oculos, nasum, aures, genas, os, linguam & alias partes ore aperto conspicuas. Vtrâque ossibus, musculis, ac vasis cute obductis constat.

D. Singularum partium Anatomem perstringe, ducto ab ossibus initio, ut musculorum faciem mouentium origo & insertio certior sit & manifestior?

Maxilla
superior,
inferior.

Dentes.

C. Facies maxillam utrâque superiorem & inferiorem continet, Galenus illam *πλω ἀνω γένυ*, hanc *πλω κάτω γένυ* vocat. Hippocrates *πλω γνάθον* appellare solet. Vtrique dentes sexdecim per gomphosim articulantur, quatuor incisores, duo canini, & decem molares.

DE MAXILLÆ OSSIBVS.

Anatomici genæ superioris ossa
 alij plura, alij pauciora enumerant.
 Ego vndecim duntaxat agnosco,
 quinque vtraque parte per harmo-
 niam inter se commissa, & vnicum
 npar. Tria sunt in vtraque oculi or-
 ita, quibus capiti maxilla coniungi-
 ir, primum minorem canthum con-
 ituit & portionem orbitæ, necnon
 Zygomatis, malæque partem.
 Secundum omnium minimum ma-
 rem canthum efformat, in quo fo-
 nen est ad nares peruium, in hoc
 glandula.
 Tertium omnium maximum om-
 sui lateris dentes continet, orbi-
 inferiorem ferè totam constituit,
 otundam apophysin, quam *μύλον*
 ci appellant, id est malum.
 alati duo exiguâ lineâ in medio
 ncta.
 asi duo simul coniuncta, & vnum
 s, quod nares æquè discriminat,
 nâsque reddit. Idèd narium in-
 tium iure appellatum.
 axilla inferior duobus tantum
 at ossibus, quæ ad medium men-

Maxillæ
superio-
ris ossa
21.

Oculi
vtrius-
que
3.

palati
2.

Nasæ
3.

Maxillæ
inferio-
ris ossa
2.

tum interiectu cartilaginis vniuntur. Cartilago hæc in puerulis manifesta est, sed ætate prouectioribus in ossis naturam degenerat, vt vnicum videatur esse genæ inferioris os. Superior eius pars in duos processus vtrinque desinit, quorum vnus acutus, tendinem à temporali musculo descendentem excipiens, *κορώνη* vocatur, quod cornicis rostro similis sit, alter condyli modo rotundus, vnde *κοινδύλωδης* appellatur, cavitati ossis petrosi articulatus.

DE MUSCULIS FACIEI.

D. Recensitis faciei ossibus, adinherentes eis musculos solerter diffecandos accinge?

C. Existimarent plerique Anatomici faciem totam à solo panniculo carnosio moueri, quem propterea musculum latum vocarent. Sed fibrarum diuersitas & motuum varietas peculiare esse faciei musculos, diuersarum partiū motui destinatos arguit.

Frontis
musculi

Frontis quippè musculi duo sunt, superciliis attollendis dicati, qui à supernis partibus orti, in inferiores inferuntur, fibræ à summo ad imum

in

tum porrectis.

Palpebra inferior immobilis est:
 or verò sursum & deorsum mo-
 , dum aperitur & clauditur.

Palpe-
 bræ
 musculi

3.

Aperiens

1.

eritur ab vnico musculo, qui ab
 ore orbita, cum eo qui oculum
 it enatus, in extremam palpebrę
 , quam *τρυχών* Græci vocant, inse-

audunt palpebram duo musculi
 ulares, vnus maior & latus ab in-
 e angulo totam oculi orbitam
 mdat sphyncteris instar: alter
 r, Ciliaris dictus, à nasi radice
 , in tarsum inferitur, cilium or-
 atim cingens & exquisitè clau-

Claudē-
 tes 2.
 Maior.

Minor.

ulum mouent sex musculi, qua-
 recti ex fundo orbitę orti, sur-
 vnus supernè situs, Attollens,
 bus vulgò dictus;
 orsum, vnus infernè, Deprimēs,
 ilis appellatus;

Oculorū
 musculi
 6.
 recti 4.
 Attol-
 lens
 Depri-
 mens.

rfus nasum vnus, ad magnū can-
 , Adducens, à Barbaris Bibito-
 nuncupatus; versus Zygoma
 ad paruum canthum, Abducēs,
 isoribus Indignatorius vocatus.

Addu-
 cens.
 Abdu-
 cens.

Obliqui Et duo obliqui oculum circumagentes, quos Amatorios ipsi nominant.

Vnus à magno cantho ad paruum supernè porrectus.

Alter infernè à paruo cantho ad magnum extensus.

Narium musculi. In naribus musculi observantur perexigui.

Dilatatores. Eorum alii pinnas narium dilatât, à fronte acuto carnosóque exorti principio, in narium cartilagine tendine latiore feruntur:

Constrictores. Alii nares constringunt, labiorum musculis continui.

Labiorum musculi Labium utrúmque sursum, deorsúmque movetur.

Labrum superius Labium superius mouent sursum duo musculi, qui à malo orti, in labrum superius inseruntur: deorsum mouent totidem, à mento in idem labium delati.

Labrum inferius Inferius labium sursum movetur duorum musculorum opera, qui à malo orti in labium inferius inseruntur:

Attollentes Deorsum mouent totidem, à mento in idem labium inserti.

Deprimentes In homine sola inferior maxilla mobilis est. Mouetur autem sursum,

Maxillae inferiores musculi 10.

turn & ad latera. Mouetur sur-
cùm os clauditur; deorsum, cùm
tùr; ad latera, dum manduntur

maxillam sursum mouent sex mus-
cles vtrique.

otaphitæ, id est temporales duo, Crotaphitæ
2.
titudine insignes, vtrique vnus,

tota temporum cavitare sub
mate orti, validissimo tendine
o in apophysin Coronoidem
inferioris inseruntur.

rygoidei duo parui, in ore la- Pterygoidei
2.
s, qui à cauo pterygoidis apo-
os toto exorti, in genæ infernæ
n latissimam intus implantan-

tundi duo, Buccinatores vulgò Buccinatores
2.
à genæ supernæ gingiuvis omni-
genæ infernæ gingiuas omnes,
nica tecti.

fati musculi omnes maxillam
orem rectè ad superiorem addu-
oris claudendi gratia.

orsum verò maxillam mouent, Digastrici
2.
aperiendum, duo musculi gra-
Digastrici dicti, vnus vtrique,
loide orti, in principio & fine

carnosi, in medio neruosi, tandem in mentum interius inferuntur.

Massete- res 2. Circumagunt maxillam musculi duo, Masseteres appellati, id est molitores, quòd mandendo plurimum valeant. Bicipites sunt, caput vnum à malo in extremum maxillæ angulum; alterum à Zygomate versus mentum fertur: interfecant sese horum capitum fibræ in modum X.

Linguae musculi 10. Lingua mouetur sursum, deorsum, antrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum, decem musculorum ope.

Sursum mouentes 2. Sursum linguam mouent duo, à styloïde, in linguæ latus.

Deorsum 2. Deorsum duo, à genâ infernâ, quæ sunt molares, in linguæ latus infernè.

Antrorsum 2. Antrorsum aut extrorsum duo, à mento interno ad linguæ radicem.

Retrorsum 2. Retrorsum duo magni, contigui, villis omnibus intertexti, ab hyoïdis basi, in linguæ partem infernam.

Dextrorsum 1. Dextrorsum vnus. } Ambo ab hyoïdis cornibus supernis
Sinistrorsum 1. Sinistrorsum alter. } in linguæ latera inferuntur.

Oshyoïdes. Hyoïdes est literæ vpsilo simile, ad linguæ radicem situm, supra laryn-

n, quod duo vtrunque ceu cornua
mittit, vnum breuius & inferius, in
thyroïdis apophysin insertum; alte-
ra longius & superius, ad styloïdis
radicem ascendens.

Ad mouent octo muscoli.

Sursum duo, à Styloïdis radice, in
thyroïdis cornuum principium.

Deorsum duo, in medio neruosi, à
thyroïde in idem cornuum princi-
pium.

Antrosum duo, ab interno men-
to ad thyroïdis radicem.

Retrorsum duo, à sterno secundum
arteriam in thyroïdis radicem.

DE NERVIS PER FACIEM expansis.

D. Declarasti musculos faciem mouen-
tes, nunc ostende neruos è cerebro ad faciem
vntes, qui proprium cuique organo sen-
sui impertinunt, quique præfatis musculis
iunguntur ad motum?

C. Nerui è cerebro coniugati per-
uocò prodeunt. Eorum paria septem
aspicua sunt in imo cranio, simul
medullosa cerebri substantia de-
lecta est.

Primum in oculum vtrûmque

F. iij

Thyroïdis
musculi

8.

Sursum
mouen-
tes 2.

Deorsum
2.

Antrosum 2.

Retror-
sum 2.

Nervo-
rum ce-
rebraliu
paria;

transmittitur, spiritum animale de-
ferens ad visum, vnde Optici nomen
illi est inditum.

5. Quintum in aurem vtrámque im-
plantatur, ad auditum. Vnde Acous-
tici appellationem sortitur.

3. 4. 7. Tertium, quartum atque septi-
mum, distributis obiter furculis parti-
bus vicinis, in linguam inseruntur, ad
gustatum. Idcirco Geustica dicuntur,
id est Gustatoria.

6. Sextum subditis visceribus distri-
buitur, ad Tactus sensum.

2. At sizygia secunda in singulos
oculorum musculos dispergitur ad
motum.

Nervo-
rum pro-
pazines. Alii nervi è tertia, quinta, plures è
sexta coniugatione propagati, per
Crotaphitas, Masseteras, Pterygoi-
deos, ceterosque faciei musculos, de-
tes, gingivas, cutimque totam spar-
guntur.

Nervo-
rum fo-
ramina. Paria hæc septem cranio excidunt
per foramina, primum rotunda, se-
cundum scissa, tertium & quartum
oblonga, quintum mediocria in osse au-
ditorio, sextum maxima, septimum par-
ua, occipitis maximo foramini iuncta.

E PARTIBVS TOTVM

visusque sensus organum constituen-
tibus, separatim demonstrandis.

1. Recense ceteras partes totum cuiusque
visus, ac imprimis visus organum, cum
oculis & nervis constituentes?

1. Humores tres, Aqueus, Crystal-
lus, & Vitreus: tunicę quinque hu-
mores complexę, Adnata, Cornea,
Sclerotica, Aranea & Retiformis: plures
nervulę à iugularibus internis, & arte-
rię à carotidibus derivatę, per tu-
nicas sparsę: copiosus adeps vndi-
que, & glandulę in utrõque an-
te, cum prefatis ossibus, musculis
oculis, totam oculi, visus organi,
structuram perficiunt.

Partes
oculi, &
visus or-
ganum,
consti-
tuentes.

2. Enumeratis oculi partibus, ad auri-
s transeundum est?

1. Auris partes duę sunt, vna exte-
rior, altera interior.

Exterior primo obtutu cartilagi-
nis semicircularis, foris gibba, intus
concava percipitur.

In interiori aure (vero auditus or-
gano) quatuor deprehenduntur mea-

Partes
aurem,
auditus
organum,
consti-
tuentes.

rimus πρῶτος ἀκυστικός Græcis dictus,

C. Nasus, odoratus organum, alius externus, alius internus. Partes
nasum,
olfactus
organū,
consti-
tuentes.
Externus in faciei medio protube-
ns, omnibus conspicuus, constat
labris, cartilaginibus, musculis, ner-
vis suo loco expositis, ac venulis à iu-
gularibus, & arteriis à carotidibus
supra, duabusque cingitur membra-
bus: una interiore, crassa, quæ ori, lin-
guæ & palato communis est; altera
exteriore, quæ cutis est, adipe denu-
da.

Internus verò nasus, verum olfactus
instrumentum, duabus constituitur
partibus, osse ethmoide superius de-
scripto, & processibus mammillari-
bus, ad foramina ethmoidea produ-
ctis, qui nervi sunt mollissimi, ab an-
terioribus cerebri ventriculis pro-
surgentes, licet in nervorum censum
non ascribantur, quia crania non ex-
eunt.

2. *Lingua structuram breviter per-
trahere?*

C. Lingua gustatus necnon & ser-
vatus organum, carne constat molli,
laxa, spongiosa, dignoscendis sa-
poribus maximè idonea, nullis fibris Partes
linguā,
gustus
organū,
consti-
tuentes.

contexta, nec proinde musculosa; sed sibi propria & peculiari, quam membrana tegit tenuissima, ori & palato communis, in quam præfati tertiæ & quartæ coniugationis nervi expanduntur. Venæ sub lingua apparent duæ, à iugulari externa exortæ, quas vulgus Raninas vocat. Totidem arteriæ à carotidibus prodeuntes, venas has comitantur. Medio inferioris linguae corpori ligamentum validissimum subiicitur, cuius auxilio suffulta linguae mollities, facilius vibrari ac produci potest. Ad lingue multiplices motus, musculi decem supra descripti, sunt illi à natura tributi.

DE COLLI ANATOME.

Trans-
itus ad
Anato-
micam
Colli de-
monstra-
tionem.

D. De tribus capitis partibus, ultima superest, Collum, cuius interiectu partes Animales, Vitales & Naturales inter se consentiunt, ac officio mutuo se sustentant. Nam per triplicia Colli vasa, duo sursum, aliud deorsum, vergentia, superioribus corporis partibus, sanguis & spiritus vitalis, ad alimoniam & vitam inferioribus vero, animalis ad sensum & motum distribuuntur. Idcirco accuratam Colli Anatomiam (apud Anatomicos plerisque com-

in) clara methodo instituat exopto?

Colli partes alia, sunt duriores, partium Colli di-
uisio.
molliores.

Quanam sunt duriores?

Duriores cervicis partes, quibus Durio-
res cer-
vicis
partes.
fundamentis innituntur mollio-
unt propriae vel communes.

Propriae sunt septem superiores propriae,
hitidis vertebrae, spinalem me-
am è cerebro derivatam conti-
es, ex qua septem paria nervo-
motoriorum, musculis sibi pro-
uis distributorum, ducunt origi-

omunes verò sunt capitis & cõmun-
nes.
acis ossa, quibus collum superne
terne connectitur?

Quanam sunt molliores colli par-

Molliores colli partes, quae du- Mollie-
res colli
partes.
bus supersternuntur, sunt proprie
omunes.

Propriae sunt octo musculi collum Propriae.
Colli
musculi
8.
entes; communibus substrati.

Quatuor flectentes: Flexores
4.
Longi 2.
Angi duo sub oesophago sibi, à su-
ribus spondylis quinque thora-
et totam cervicem villis obli-

Scaleni

2.

quis ascendentes ad occiput vsque, cui obscurè inferuntur : & Scaleni duo, à prima costa thoracis, in omnes cervicis apophyses transuersas internè inferi, villis omnibus obliquis, &

Extensor**4.****Transuér****sarii.**

Quatuor extendentes:

Transuersarii duo à radicibus apophyseon sex transuersarum thoracis, in omnes transuersas cervicis externè : &

Spinati

2.

Spinati duo, à radicibus spinarum septem thoracis, in cervicis spinas.

Cōmunes**colli****partes.**

Communes verò colli partes sunt, quæ commercium habent cum capite, & cum subditis partibus. Hæ anticæ sunt vel posticæ. Anticæ conspirāt cum thorace ad vitam tuendam : posticæ cum ventre, ad naturam roborandam. Aliæ insuper communes, quæ per cæteras disperguntur.

D. Quanam sunt colli partes capiti toti communes ?

Capitis**musculi**

14.

Flexores

2.

Mastoï-**dei.**

C. Musculi sunt quatuordecim caput mouentes.

Mastoïdei duo, anteriore parte siti, id flectunt, qui à sterni summo, & clavicula media in apophysin mastoïdem obliquè inferuntur.

Extendunt octo, postica parte collocati, quatuor magni, ac totidem parui. E magnis Splenii duo à spinis quinque thoracis supernis, & quatuor infernis cervicis in occiput implantantur.

Extensor
8.

Magni
4.
splenii
2.

Complexi duo, ex transuersis superiorum vertebrarum thoracis apophysibus, & inferioribus cervicis, ad occiput feruntur.

Complexi
2.

E paruis duo à spina spondyli secundi, & totidem sub his minores, à parte postica spondyli primi, in occiput medium inferuntur.

parui 4.

Circumagunt caput obliqui quatuor, quorum duo parui à spina secundæ vertebræ, ad apophysin transuersam primæ feruntur; ac duo minores, ab eadem apophysi ad occiput.

Circum-
agentes.
Obliqui
4.

D. Expositis colli partibus ad caput pertinentibus, anticæ deinceps persequere, quæ thoracem respiciunt.

C. Larynx & tracheia arteria, anticæ colli partes, vitalium partium in thorace contentarum consortes sunt.

Anticæ
colli partes,
ad
thoracem
vergentes

Larynx asperæ arteriæ caput, canalis principium, quo aëri pater aditus & exitus, cum ad respiciendum, tum

Larynx
quid.
Larynx
guttur.

Compo-
sitio.

ad formationem vocis, cuius præcipuum est organum, tribus constat cartilaginibus, quarum duæ sunt mobiles, prima Thyroïdes Græcis dicta, quod scuti formam referat, & vltima Arytænoïdes appellata, quod aqualis os imitetur: Sed media olim innotinata, nunc Cricæidis nomen sortita, quod annulum æmuletur, prorsus est immobilis. Ideò basis existit, super quam Thyroïdis motus fit duplex, dilatatio & constrictio: & Arytænoïdis totuplex, apertio & clausio, musculorum ministerio superiorem laryngis partem dilatantium & constringentium in Thyroïdem, reserantium verò & obserantium in Arytænoïdem inferiorum.

Muscu-
lorum
nume-
rus.

Quorum numerus valdè controversus est. Alii quippè sexdecim, alii octodecim, alii viginti musculos ad hos motus destinatos numerant. Nos quatuordecim tantùm agnoscimus, communes quatuor, ac decem proprios.

Muscu-
li laryn-
gis com-
munes
4. +

Communes appellamus, qui ab aliis partibus quàm à larynge oriuntur: proprios verò qui à larynge orti,

in eandem inferuntur.

Communes quatuor sunt:

Bronchii duo dicti, à superiore & interiore sterni parte, per latera arteriæ ascendentes, in inferiorem Thyroïdis partem inferuntur, quam deorsum trahunt.

Bronchii,
2.

Duo antagonistæ, Hyothyroïdei à recentioribus appellati, à cornibus hyoïdis exorti, in Thyroïdem inferuntur, quam sursum trahunt.

Hyothyroïdei
2.

Proprii laryngis, musculi decem sunt, exigui omnes, quinque vtrâque parte.

Proprii
10. 5.
vtrâque

Primus à parte Cricoïdis antica & externa in Thyroïdis latera internè definit, vt eam dilatet.

1.
Cricothyroïdeus anticus.

Secundus à parte laterali Cricoïdis, in latera Thyroïdis externè inseritur, vt eam contrahat.

2.
Cricothyroïdeus lateralis.

Tertius à parte postica Cricoïdis in Arytenoïdem fertur, vt eam reseret.

3.
Cricoa-rytenoïdeus.

Quartus huic auxiliatur, qui à parte interiore & anteriore Thyroïdis emergens, in latera Arytenoïdis definit.

4.
Thyroa-rytenoïdeus.

Postremus est orbicularis, circum-

5.
Arytenoïdeus.

dens & claudens Arytænoïdem cartilaginem. Idcirco Arytænoïdeus dicitur.

Epiglottis.

Larynx operculum habet cartilagineum, linguæ formam referens. Vnde. ἐπιγλωττίς nomen illi est inditum, quod, dum inspiramus, stat erectum; depressum verò se continet, dum deglutimus. Vtrinque alligatur communi oris membranâ lateribus Arytænoïdis vsque ad ipsius postica, ut orificium laryngis claudat & aperiat, ne ex poculentis & esculentis inter deglutendum quicquam in asperam arteriam illabatur. Epiglottidis motum naturalem esse iudicauit Galenus. Itaque frustra fuere ab Anatomicis quibusdam attributi muscoli illam erigentes & deprimentes, quos ne oculatiores quidem vnquam in homine potuerunt intueri.

Eius v. tus.

Beneficio epiglottidis & musculorum præfatorum, cartilagines laryngis inter se aptæ vocem distinctam edunt. Cùm enim reserantur, dilatanturque, vocem grauem faciunt; cùm constringuntur, acutam; infinitis denique modis variam, pro dilatationis

constrictionis infinita varietate.

adjuvantur etiam gargarone, Gargareon.
incula de palato summo & intipendente, vocem ipsam plectri modulante.

Ad latera laryngis gládulæ adsunt, Glandulæ.
e humore suo subditas partes irritat.

Aspera arteria inter laryngem à Aspera arteria.
oortum ducit, & pulmones in quos limit sita, tubi instar aërem in eos ducens, fumidósque vapores abdem excipiens, vnde organum spirabile dicitur, constat cartilaginibus regularibus, non tamen in perfectum tubum ductis, in canalis formam contextis, sibi que ordine inuicem adnexis, vi ligamentorum mutuo ex eam lateribus & extremis exeuntium, quæ reliquum eius circuitum absolunt, quâ parte œsophago incumbit. Hæc tunicis duabus vestitur, intus quidem densa & dura, villis ubique rectis intertexta, cum tunica oris & œsophagi interiore continua, foris verò molli & tenui, nervos recurrentes colligante.

D. Declara nunc posticas colli partes,

138^o *N. Ab. Frambesarii*
quibus ad ventrem patet aditus?

C. Pharynx & œsophagus, posticæ
cervicis partes, ad ventrem feruntur;
in quo partes naturales continentur:
Illum fauces, hunc gulam Latini
vocant.

Pharynx
quid.

Pharynx pro corpore membranoso
ἰσχυρ, i. interius oris spatium, ambien-
te sumitur, quod principium est œso-
phagi. Octo musculos obtinuit, qua-
tuor utrinque, partim dilatantes, par-
tim constringentes, quorum opera
perficitur deglutitio.

Spheno-
pharyn-
gei 2.

Primus oritur ab acuto apice Spheno-
noïdis prope styloïdem, & deorsum
inclinans ad faucium latera definit, ut
Pharyngem supernè trahat. Spheno-
pharyngeum recentiores Anatomici
vocant.

Cepha-
lopha-
ryngei
2.

Secundus prodit ab ea parte quâ
caput iungitur, & descendens in pha-
ryngem expanditur, ipsamque tunicâ
pharyngis effingere videtur. Cepha-
lopharyngeum appellant.

Stylo-
pharyn-
gei 2.
œso-
pharyn-
gei 2.

Tertius à styloïde natus in pharyn-
gis latus inseritur, ut eum dilatet:
Stylopharyngeum nuncupant.

Quartus Oesophageus dictus, à

Thyroïdis latere ortus, in posticam œsophagi partem implantatur, adeo ut pharyngem orbiculatim utrèque cingat, & constringat.

Oesophagus cibi potúsque ductus, inter spinam & asperam arteriam, à Pharynge adventriculum vsque situs, substance est inter neruum & carnem mediæ; quia duabus membranis, vna nervosa, altera carnosa constat. Nervosa quidem intrinsecus posita, interiori tunicæ oris & asperæ arteriæ continua. Carnosa verò extrinsecus, villis utrèque contexta, illa rectis, hæc transversis: sed ambobus deglutionem celerantibus, & vomitum; dum illi trahunt, hi trudunt. Tertiam habet tunicam à ligamenti spondyrorum, quibus incumbit, quæ has duas extrinsecus obducit.

Oesophagus
quid.

Eius
fistula
Substantia.

D. Superfunt colli partes, quæ per cæteras disseminantur, quas brevi expedias velim?

C. Venæ Iugulares; Musculæ & Cervicales: Arteriæ Carotides, necnon Musculæ & Cervicales, ac Nervi Recurrentes, per cæteras colli partes, non proprias modò, verumetiam

communes, supernas & infernas, anticas & posticas sparsim expāduntur.

Vena
iugulari.

Iugulares venæ à ramo superclauio oriuntur duæ, vna externa, altera interna.

Externæ.

Externa ascendens per colli latus sub cuti & musculo lato, furculis obiter in vicinos musculos, membranas & cutim, dimissis; vbi fauces attingit, in duas partes diuiditur: quarum altera in musculos laryngis, hyoïdis, & linguæ absumitur: altera semper subcutanea, per vtrâque labra, pinnas nasi, frontem, faciem reliquam, majorem oculi angulum, glandulas ad aures, & capitis cutim dispergitur.

Interna.

Iugularis interna insignior in homine secundum latus asperæ arteriæ ascendens ad fauces venulis exilibus obiter dimissis partibus vicinis, per cranij foramina ad crassæ meningis sinus fertur, à quibus infiniti venarum furculi prodeunt, ambas meninges & totum cerebri corpus alituri.

Venæ duæ Muscula & Ceruicalia à ramo subclauio ducunt originem.

Muscula.

Muscula ante muscolum Scalenum nata, in musculos rhachiras, tum ima

cervicis, tum summi thoracis fertur.

Cervicalis per foramina apophyseon transversarum cervicis perreptat in cerebrum, ramulis obiter dimissis in musculos vicinos, & colli rhachitida per suorum nervorum foramina.

Cervicalis.

Arteriæ Carotis, Muscula & Cervicalis utraq; à ramo pariter subclavio prodeunt.

Arteriæ.

Carotis per latera asperæ arteriæ, cum interna jugulari ascendit. Vbi verò fauces attingit, bipertita ramo interno & maiore cranium subit per foramen lacerum choanæ propinquum: externo & minore in fauces, tempora, aures, oculos & faciem fertur.

Carotis.

Muscula intra thoracem orta in posticos cervicis musculos spargitur, ad occiput usque.

Muscula.

Cervicalis per foramina apophyseon transversarum cervicis emicat in cerebrum, in crassam meningem se insinuans cum vena Cervicali, datis obiter furculis per foramina nervorum rhachitidi colli, & musculis vicinis.

Cervicalis.

In colli lateribus insignis apparet.

Nervi.

communes, supernas & infernas, anticas & posticas sparsim expāduntur.

Vena
ingula-
ri.

Iugulares venæ à ramo superclauio oriuntur duæ, vna externa, altera interna.

Externs.

Externa ascendens per colli latus sub cuti & musculo lato, furculis obiter in vicinos musculos, membranas & cutim, dimissis; ybi fauces attigit, in duas partes diuiditur: quarum altera in musculos laryngis, hyoïdis, & linguæ absimitur: altera semper subcutanea, per vtrâque labra, pinnas nasi, frontem, faciem reliquam, majorem oculi angulum, glandulas ad aures, & capitis cutim dispergitur.

Interna.

Iugularis interna insignior in homine secundum latus asperæ arteriæ ascendens ad fauces venulis exilibus obiter dimissis partibus vicinis, per cranij foramina ad crassæ meningis sinus fertur, à quibus infiniti venarum furculi prodeunt, ambas meninges & totum cerebri corpus alituri.

Venæ duæ Muscula & Cercialis à ramo subclauio ducunt originem.

muscu-
la.

Muscula ante musculus Scalenum nata, in musculos rhachitas, tum imæ

cervicis, tum summi thoracis fertur.

Cervicalis per foramina apophyseon transversarum cervicis perreptat in cerebrum, ramulis obiter dimissis in musculos vicinos, & colli rhachitida per suorum nervorum foramina.

Cervicalis.

Arteriæ Carotis, Muscula & Cervicalis utraq; à ramo pariter subclavio prodeunt.

Arteriæ.

Carotis per latera asperæ arteriæ, cum interna jugulari ascendit. Vbi verò fauces attingit, bipertita ramo interno & maiore cranium subit per foramen lacerum choanæ propinquum: externo & minore in fauces, tempora, aures, oculos & faciem fertur.

Carotis.

Muscula intra thoracem orta in posticos cervicis musculos spargitur, ad occiput usque.

Muscula.

Cervicalis per foramina apophyseon transversarum cervicis emicat in cerebrum, in crassam meningem se insinuans cum vena Cervicali, datis obiter surculis per foramina nervorum rhachitidi colli, & musculis vicinis.

Cervicalis.

In colli lateribus insignis apparet.

Nervus.

Recur-
gentes.

sextæ coniugationis Nervus, arteriæ Carotidi contiguus, qui furculis in vicinos quosdam musculos obiter distributis, dum ad ingulum accessit, in tres conspicuos finditur ramos, quorum unus per latera costarum excurrens, Costalis vocatur: alter ad ventriculum perreptans, Stomachicus. Sed reliquus, dexter quidem, axillarem arteriam amplectitur; & per eam reflexus, instar ductarii funis, qui per trochlearum orbiculos traicitur, sursum ascendit, in musculos laryngis, numerosos spargens ramulos: sinister ob axillaris arteriæ rectitudinem, ibi non reflectitur, sed magnæ arteriæ truncum circumplicat.

Hi nervi *παλινδερµάντες*, id est recurrentes, appellantur, & vocales, quod vocis præcipua sint organa. Illis enim interceptis, aut sectis, *ἀφ' ὧν* statim redditur animal.

DE MANVS ANATOME.

Trans-
itus à
corporis
trunco,
ad artus.

D. Perlustrato corporis Humani trunco, ad artus, veluti ramos ab arboris candece propagatos, transeundum est; Manus nimirum & pedes, pluribus constantes ossibus, musculis ac vasis cute obductis. Sin-

*gulorum Anatomem ordine persequere,
ducto à manuum ossibus exordio.*

C. Manus nomen generaliter, aut Manus
divisio.
propriè sumitur.

Manus generaliter dicta in tres dividitur partes, supremam, mediam & extremam, quæ Græcis ἀκρόχειρ, & absolute χεῖρ, nobis manus propriè dicitur, ὄργανον ἀντλητικόν, apprehendendi instrumentum: cuius in vniuersum tres sunt partes, carpus, metacarpium, & digiti.

DE OSSIBVS TOTIVS

Manus.

Fulciendæ manui substernuntur Ossa totius
Manus.
ossa, supernæ duo, omoplata & brachium: mediæ item duo, cubitus & radius: carpo, metacarpio & digitis extremam manum constituentibus plura.

Ὠμοπλάτη, quæ nobis scapula dicitur, ceruicem habet, & in eius extremo glenoidem cavitatem, per quam articulatur cum brachio: habet & spinam à basi sursum ascendentem, cuius extremum dicitur ἀκρόμιον, per quod Omo-
plata.
cum clauicula thoracē desuper claudente articulatur: habet & acutam Acro-
mion.

Compo-
sitio.

ad formationem vocis, cuius præcipuum est organum, tribus constat cartilaginibus, quarum duæ sunt mobiles, prima Thyroïdes Græcis dicta, quod scuti formam referat, & vltima Arytēnoïdes appellata, quod aqualis os imitetur: Sed media olim innotinata, nunc Cricēidis nomen sortita, quod annulum æmuletur, prorsus est immobilis. Ideò basis existit, super quam Thyroïdis motus fit duplex, dilatatio & constrictio: & Arytēnoïdis totuplex, apertio & clausio, musculorum ministerio superiorem laryngis partem dilatantium & constringentium in Thyroïdem, reserantium verò & obserantium in Arytēnoïdem inferiorem.

Musculorum
nume-
rus.

Quorum numerus valdè controversus est. Alii quippè sexdecim, alii octodecim, alii viginti musculos ad hos motus destinatos numerant. Nos quatuordecim tantùm agnoscimus, communes quatuor, ac decem proprios.

Musculi
laryngis
communes

4. +

Communes appellamus, qui ab aliis partibus quàm à larynge oriuntur; proprios verò qui à larynge orti,

in eandem inferuntur.

Communes quatuor sunt:

Bronchii duo dicti, à superiore & interiore sterni parte, per latera aspera arteriæ ascendentes, in inferiorem Thyroidis partem inferuntur, quam deorsum trahunt.

Bronchii,
2.

Duo antagonistiæ, Hyothyroidei à recentioribus appellati, à cornibus hyoidis exorti, in Thyroidem inferuntur, quam sursum trahunt.

Hyothyroidei
2.

Proprii laryngis, musculi decem sunt, exigui omnes, quinque vtrâque parte.

Proprii.
10. 5.
vtrâque

Primus à parte Cricoïdis antica & externa in Thyroidis latera internè definit, ut eam dilatet.

1.
Crico-
thyroï-
deus an-
ticus.

Secundus à parte laterali Cricoïdis, in latera Thyroidis externè inseritur, ut eam contrahat.

2.
Crico-
thyroï-
deus la-
teralis.

Tertius à parte postica Cricoïdis in Arytenoïdem fertur, ut eam reseret.

3.
Crico-
arytenoï-
deus.

Quartus huic auxiliatur, qui à parte interiore & anteriore Thyroidis emergens, in latera Arytenoïdis definit.

4.
Thyro-
arytenoï-
deus.

5.
Aryte-
noïdeus.

Postremus est orbicularis, circum-

dans & claudens Arytænoïdem cartilaginem. Idcirco Arytænoïdeus dicitur.

Epiglottis.

Epis v. 145.

Larynx operculum habet cartilagosum, linguæ formam referens. Vnde. ἐπιγλωττίς nomen illi est inditum, quod, dum inspiramus, stat erectum; depressum verò se continet, dum deglutimus. Vtrinque alligatur communi oris membranâ lateribus Arytænoïdis vsque ad ipsius postica, ut orificium laryngis claudat & aperiat, ne ex poculentis & esculentis inter deglutiendum quicquam in asperam arteriam illabatur. Epiglottidis motum naturalem esse judicauit Galenus. Itaque frustra fuere ab Anatomicis quibusdam attributi musculi illam erigentes & deprimentes, quos ne oculatiores quidem vnquam in homine potuerunt intueri.

Beneficio epiglottidis & musculorum præfatorum, cartilagines laryngis inter se aptæ vocem distinctam edunt. Cum enim referantur, dilatanturque, vocem grauem faciunt; cum constringuntur, acutam; infinitis denique modis variam, pro dilatationis

aut constrictionis infinita varietate.

Adjuvantur etiam gargareone, Gargareon.
caruncula de palato summo & intimo pendente, vocem ipsam plectritu modulante.

Ad latera laryngis gládulæ adsunt, Glandulae.
quæ humore suo subditas partes irri-
gant.

Aspera arteria inter laryngem à Aspera arteria.
quo ortum ducit, & pulmones in quos
desinit sita, tubi instar aërem in eos
deducens, fumidósque vapores ab
iisdem excipiens, vnde organum spi-
rabile dicitur, constat cartilaginibus
circularibus, non tamen in perfectum
orbem ductis, in canalis formam
contextis, sibi que ordine inuicem ad-
nexus, vi ligamentorum mutuo ex ea-
rum lateribus & extremis exeuntium,
quæ reliquum eius circuitum absol-
vunt, quâ parte œsophago incum-
bit. Hæc tunicis duabus vestitur, intus
quidem densa & dura, villis ubique
rectis intertexta, cum tunica oris &
œsophagi interiore continua, foris
verò molli & tenui, nervos recurren-
tes colligante.

D. Declara nunc posticas colli partes,

138^o *N. Ab. Frambesarii*
quibus ad ventrem patet aditus?

C. Pharynx & œsophagus, posticæ
cervicis partes, ad ventrem feruntur;
in quo partes naturales continentur:
Illum fauces, hunc gulam Latini
vocant.

Pharynx
quid.

Pharynx pro corpore membranoso
Ἰσχυρ, i. interius oris spatium, ambien-
te sumitur, quod principium est œso-
phagi. Octo musculos obtinuit, qua-
tuor utrinque, partim dilatantes, par-
tim constringentes, quorum opera
perficitur deglutitio.

Pharyn-
gis mus-
culi 8.

Spheno-
pharyn-
gei 2.

Primus oritur ab acuto apice Sphe-
noïdis prope styloïdem, & deorsum
inclinans ad faucium latera definit, ut
Pharyngem supernè trahat. Spheno-
pharyngeum recentiores Anatomici
vocant.

Cepha-
lopha-
ryngei
2.

Secundus prodit ab ea parte quâ
caput iungitur, & descendens in pha-
ryngem expanditur, ipsâque tunicâ
pharyngis effingere videtur. Cepha-
lopharyngeum appellant.

Stylo-
pharyn-
gei 2.
Oeso-
pharyn-
gei 2.

Tertius à styloïde natus in pharyn-
gis latus inseritur, ut eum dilatet:
Stylopharyngeum nuncupant.

Quartus Oesophageus dictus, à

Thyroidis latere ortus, in posticam
œsophagi partem implantatur, adeo
ut pharyngem orbicularim utrèque
cingat, & constringat.

Oesophagus cibi potúsque ductus,
inter spinam & asperam arteriam, à
Pharynge adventriculum vsque situs,
substantiæ est inter neruum & carnem
mediæ; quia duabus membranis, vna
neruosa, altera carnosa constat. Ner-
uosa quidem intrinsecus posita, inte-
riori tunicæ oris & asperæ arteriæ
continua. Carnosa verò extrinsecus,
villis utrèque contexta, illa rectis,
hæc transversis: sed ambobus deglu-
titionem celerantibus, & vomitum;
dum illi trahunt, hi trudent. Tertiam
habet tunicam à ligamenti spondy-
lorum, quibus incumbit, quæ has
duas extrinsecus obducit.

Oeso-
phagus
quid.

Eius fi-
tus
Substan-
tia.

*D. Superfunt colli partes, quæ per cæte-
ras disseminantur, quas breui expedias
velim?*

C. Venæ Iugulares; Musculæ &
Cervicales: Arteriæ Carotides, nec-
non Musculæ & Cervicales, ac Nervi
Recurrentes, per cæteras colli partes,
non proprias modò, verumetiam

communes, supernas & infernas, anticas & posticas sparsim expāduntur.

Vena
iugula-
ri.

Iugulares venæ à ramo superclauio oriuntur duæ, vna externa, altera interna.

Externæ.

Externa ascendens per colli latus sub cuti & musculo lato, furculis obiter in vicinos musculos, membranas & cutim, dimissis; ybi fauces attigit, in duas partes diuiditur: quarum altera in musculos laryngis, hyoïdis, & linguæ absimitur: altera semper subcutanea, per vtrâque labra, pinnas nasi, frontem, faciem reliquam, maiorem oculi angulum, glandulas ad aures, & capitis cutim dispergitur.

Interna.

Iugularis interna insignior in homine secundum latus asperæ arteriæ ascendens ad fauces venulis exilibus obiter dimissis partibus vicinis, per cranij foramina ad crassæ meningis sinus fertur, à quibus infiniti venarum furculi prodeunt, ambas meninges & totum cerebri corpus alituri.

Venæ duæ Muscula & Ceruicalis à ramo subclauio ducunt originem.

Muscula
la.

Muscula ante musculum Scalenum nata, in musculos rhachitas, tum imæ

cervicis, tum summi thoracis fertur.

Cervicalis per foramina apophyseon transversarum cervicis perreptat in cerebrum, ramulis obiter dimissis in musculos vicinos, & colli rhachitida per suorum nervorum foramina.

Cervicalis.

Arteriæ Carotis, Muscula & Cervicalis utraq; à ramo pariter subclavio prodeunt.

Arteriæ.

Carotis per latera asperæ arteriæ, cum interna jugulari ascendit. Vbi verò fauces attingit, bipertita ramo interno & maiore cranium subit per foramen lacerum choanæ propinquum: externo & minore in fauces, tempora, aures, oculos & faciem fertur.

Carotis.

Muscula intra thoracem orta in posticos cervicis musculos spargitur, ad occiput usque.

Muscula.

Cervicalis per foramina apophyseon transversarum cervicis emicat in cerebrum, in crassam meningem se insinuans cum vena Cervicali, datis obiter surculis per foramina nervorum rhachitidi colli, & musculis vicinis.

Cervicalis.

In colli lateribus insignis apparet.

Nervus.

Recur-
rentes.

sextæ coniugationis Nervus, arteriæ Carotidi contiguus, qui surculis in vicinos quosdam musculos obiter distributis, dum ad ingulum accessit, in tres conspicuos finditur ramos, quorū unus per latera costarū excurrens, Costalis vocatur: alter ad ventriculū perreptans, Stomachicus. Sed reliquus, dexter quidem, axillarem arteriam amplectitur; & per eam reflexus, instar ductarii funis, qui per trochlearum orbiculos traicitur, sursum ascendit, in musculos laryngis, numerosos spargens ramulos: sinister ob axillaris arteriæ rectitudinem, ibi non reflectitur, sed magnæ arteriæ truncum circumplicat.

Hi nervi *παλινδερµόντες*, id est recurrentes, appellantur, & vocales, quod vocis præcipua sint organa. Illis enim interceptis, aut sectis, *ἄφρων* statim redditur animal.

DE MANVS ANATOME.

Trans-
itus à
corporis
trunco,
ad artus.

D. Perlustrato corporis Humani trunco, ad artus, veluti ramos ab arboris can-
dice propagatos, transeundum est; Manū
nimirum & pedes, pluribus constantes ossi-
bus, musculis ac vasis cute obductis. Sin-

*gylorum Anatomem ordine persequere,
ducto à manuum ossibus exordio.*

C. Manus nomen generaliter, aut Manus
diuisio.
propriè sumitur.

Manus generaliter dicta in tres di-
uiditur partes, supremam, mediam &
extremam, quæ Græcis ἀκρόχειρ, & ab-
solutè χεῖρ, nobis manus propriè dici-
tur, ὄργανον ἀπληθικόν, apprehendendi
instrumentum: cuius in vniuersum
tres sunt partes, carpus, metacar-
pium, & digiti.

DE OSSIBVS TOTIVS

Manus.

Fulciendæ manui substernuntur Ossa to-
tius Ma-
nus.
ossa, supernæ duo, omoplata & bra-
chium: mediæ item duo, cubitus &
radius: carpo, metacarpio & digitis
extremam manum constituentibus
plura.

Ὀμοπλάτη, quæ nobis scapula dici-
tur, cervicem habet, & in eius extre-
mo glenoïdem cauitatem, per quam
articulatur cum brachio: habet & spi-
nam à basi sursum ascendentem, cuius
extremum dicitur ἀκρόμιον, per quod Omo-
plata.
cum clauicula thoracé desuper clau-
dente articulatur: habet & acutam Acro-
mion.

Cora
coïdes.

apophysin, quam à rostri effigie κορυ-
κοειδῆν appellant.

Brachiū.

Βραχίον, humerus Celso dicitur. Eius
pars superior caput habet magnum,
quod in scapulæ cavitatem inseritur,
quæ superficiaria quidem est, ut id
in omnes partes expeditè moueretur,
sed cartilagine multa amplificatur ad
firmiorem articulationem.

Pars brachii inferior duas habet in-
signes apophyses, vnam externā quæ
radio articulatur, alteram internam
nulli ossi articulatam: quarum illa su-
perior est, hæc inferior. Ab utrôque
tuberculo, musculi ferè omnes carpi
& digitorum, extensores ab illo, fle-
xores ab hoc prodeunt. Inter vtrum-
que processum cavitatis eminet tro-
chleæ similis, per quam rotatur cubi-
tus, cum flectitur & extenditur.

Cubitus.

Cubitus Græcis πῆχυς, καὶ ὠλένη dici-
tur, Arabibus focile maius. Eius pars
superior per ginglymon cum brachio
articulatur. Vnde sinus ac processus
duo in acutum vergentes (qui κορυῶνες,
id est rostra, vocantur) ibi conspiciun-
tur. Posterior pars ὠλέκρανον à quibus-
dam dicitur. Inferior cubiti pars cum
carpo

carpo articulatur, tum per mediam cartilaginem, tum per acutam apophysin, quæ à columnæ figura *στυλοειδής* vocatur.

Radius Græcis *ῥαβδός*, ab Arabibus Radius. *Radius*.
focile minus appellatur. Eius pars superior cum externa brachii apophysi per diarthrosin articulatur: inferior per epiphysin cum carpi osse maximū digitum respiciente connectitur.

Carpus octo constat ossibus, ordine duplici distinctis, quæ vinculorum & cartilaginum interiectu connectuntur. *Carpus*.

Metacarpium, quatuor tantū ossibus constat oblongis & gracilibus, quæ inferiore parte cum carpo, superiore cum digitis per ginglymon connectuntur. Habent in utrisque extremis epiphyses. *Metacarpium*.

Tertia manus pars digitos complectitur.

Digitum numero quinque sunt: primus, quod robore & magnitudine polleat, Pollex dicitur; secundus Index, tertius Medius, quartus Medicus & Annularis, quintus Minimus & Auricularis appellatur. *Digitus*.
Digitum quin-

146 N. Ab. *Frambesary*
decim ossibus constant, triplici ordi-
ne dispositis. Hanc ossium in digitis
seriem Græci *φάλαγξ* vocant: quo
nomine militum agmen in acie desti-
gnant. Digitorum ossa per gingly-
men articulantur.

Ossa se-
samoi-
dea.

Inter digitorum articulationes,
ossicula sesami semen referencia repe-
riuntur innumera, ad articulationis
robur & stabilitatem constructa.

DE MUSCULIS TOTAM manum mouentibus.

D. *Manus ossa enarrauisti, quibus ve-
luti fundamentis reliqua partes innitun-
tur: recense doinceps musculos ossibus adna-
tos, manum undecunque mouentes, unde
orianatur, & ubi inferantur?*

Musculi
omopla-
tæ
4.
Trape-
sius.

C. Quatuor Omoplatæ musculi
sunt:

Trapezium cucullo monachali si-
milis, qui pro fibrarum varietate ip-
sam sursum & deorsum mouet, & re-
trorsum trahit. Ab occipite ferè toto,
omnibus ceruicis spinis, & octo supe-
rioribus metaphreni vertebris natus,
in totam Omoplatæ basim & spinam
inseritur.

Leua-
tor.

Leuator proprius, qui quadruplex

videtur, Omoplatam attollens, à prima, secunda, tertia, quartâque cervicis vertebra ortus, in omoplatæ angulum superiorem & spinam inferitur.

Rhomboïdes Trapezio subiectus, ex tribus spinis inferiorib⁹ cervicis, & tribus superioribus metaphreni ducens originem, in totam Omoplatæ basim extenditur, ipsam retrorsum trahens.

Rhomboïdes.

Serratus minor à costis quinque superioribus pronatus, in Coracoïdem inferitur, antrorsum scapulam mouens.

Serratus minor.

Brachium movetur sursum, deorsum, antrorsum, retrorsum, & in gyrum, octo musculorum operâ.

Musculi brachii moventes :

Id duo sursum movent, Deltoïdes, qui à clavi dimidia, & tota omoplatæ pina & acromio exortus, in mediam erè humeri partem inferitur : &

Sursum
2.
Deltoïdes.

Supraspinatus, qui à cavitate supra omoplatæ spinam enatus, in brachij cervicem implantatur.

Supraspinatus.

Duo item deorsum: Latissimus, qui à spinis ossis sacri, lumborum & nominem thoracis ortus, tendine mem-

Deorsum
Latissimus.

branofo in omoplatae angulum inferiore, & altero tendine robusto in anteriorem brachii partem iuxta cervicem inferitur: &

Rotundus
maior.

Rotundus maior, qui ex ima omoplatae costa, in brachii cervicem fertur.

Antro-
sum.

Pectoralis vnus, à clauicula, sterno & costis vicinis exortus, brachium trahit antrosum.

1.
Pectora-
lis.

Retro-
sum

Retrosum verò mouent tres in brachii cervicem anterioremque humerum inserti;

3.
Infra-
spina-
tus.

Infraspinatus, à cauitate infra spinam ortus:

Rotun-
dus mi-
nor.

Rotundus minor à ima omoplatae costa veniens: &

Subscapularis.

Subscapularis à scapulae summa parte tota prodiens.

Circularis autem brachii motus ab omnibus musculis vicissitudine quadam agentibus perficitur.

Cubiti

flexores

Musculi in brachio siti cubiti flectunt duo:

2
Biceps.

Biceps, cuius principium geminum vnum à Coracoide, alterum à labro cauitatis omoplatae per brachii fissuram descendens, tandem vnitum i

Radium intus inferitur: &

Brachiaëus, qui à media Brachij parte in Radium & magis in Cubitum intus fertur.

Brachiaëus.

Extendunt duo:

Extensor

Longus, qui à costa inferna omoplataë oritur; &

Longus.

Brevis à ceruice postica Brachij, priori connatus & subiectus; sic vt communi tendine lato, foris carnosso, intus nervoso, in Olecranium inferantur, vt communi opera cubitum extendant.

Brevis.

Radium mouent quatuor muscoli:

Pronatores duo; vnus Rotundus, qui ab apophysi interna Brachij oblique in Radium prope medium membranoso tendone cessat;

Radit pronatores

Alter Quadratus, ab imo Cubito, in inum Radium desinens; ac

Supinatores totidem: vnus longior, à Brachio inferno in Radium infernum inferitur: alter ab apophysi externa Brachij prope Olecranium in medium ferè Radium fertur.

Supinatores

Carpum mouent quatuor muscoli: Flexores duo, interni ambo, quorum alter à Brachij interna apophysi ortus,

Carpi flexores

Cubito ossi attensus in quartum os Carpi crasso suo tendine partim carneo, partim nervoso inseritur: alter supernus ab eodem tuberculo pronatus, in os metacarpii primum Indici subiectum desinit.

Extensor
2.

Carpi tensores totidem, externi ambo, supernus alter à Brachii externa apophysi ortus, Radio instratus, in bifidum desinit tendinem, quorum altero in Metacarpii os primum, altero in secundum inseritur.

Alter musculus inferior eodem enatus principio, tendine unico in Metacarpii os quartum, quod minimo digito subiicitur, desinit.

Palmaris.

Ad Carpi musculos Palmaris est referendus, qui ab apophysi externa Brachii ortus, omnibus ferè manus musculis interioribus superiectus, principio carnosio in angustum primum & longum tendinem protensus, in volam & palmam manus expanditur, cutique adhæret firmiter, atque mirum in modum apprehensioni auxiliatur.

Musculi
digitorum
flexores
2.

Digitum flectuntur, extenduntur, adducuntur & abducuntur.

Flectunt duo musculi digitos, Sublimis & profundus.

Sublimis ab interna Brachii apophysi enatus, priusquam ad Carpum perueniat, in quatuor finditur tendines: hi validissimo & transuerso ligamento, annuli instar, coeunt & arctati, in secundam digitorum quatuor articulationem inseruntur: Dum vero primum articulum perreptant, ei membranarum & villorum interiecta ita firmiter alligantur, ut eum moucant.

Sublimis.

Profundus priori substratus, ab eodem exortus tuberculo, in totidem nervosos tendines scinditur, qui primæ & secundæ digitorum quatuor articulationi membranosis ligamentis affixi, tandem in tertiam phalangem inseruntur, eamque soli flectunt. Ut autem Profundo huic musculo ad tertiam articulationem pateret accessus, natura mirabili artificio Sublimis tendines quatuor perforauit.

Profundus.

Anatomici quidam Digitorum Extensores constituunt plures, alii unicum, qui ab externo Brachii condylo prodiens, iuxta Carpum findi-

Extensoris.

tur in quatuor tendones, sub annulari vinculo transeuntes, & in secundam tertiâque articulationem desinentes.

**Adduc-
tores.**

Adducunt digitos perexigui musculi quatuor, à lumbricorum figura Lūbrici & Vermiculares dicti. Oriūtur à tendinibus Profundi musculi, initio carnosî & teretes, dein exili neruicōque tendine, secundum latera digitorum protensi, obliquè ad tertium internodium feruntur.

**Abdu-
tores.**

Abducunt digitos interossei sex in Metacarpij spatiis latitantes, tres interni & totidem externi, qui ad postremam articulationem, eâque externam delati, & cum Vermicularibus coeuntes, extensioni aliquantulum inferuiunt.

**Musculi
Pollicis.**

Pollex, quia toti manui solus æquipollet, peculiare habet musculos, flectentes, extendentes, adducentes & abducentes.

**Flexo-
res.**

Flectunt duo: alter à superiore Radii parte enatus, in ultimum articulum inferitur: alter ab osse Carpi Pollicis subiecto exortus, in medium Pollicem fertur.

Extendunt duo , ambo à Cubito
exorti: prior in tertium articulum uni-
co tendine inseritur : posterior bifido
tendine in varias pollicis partes desi-
nit.

Extens-
sores 2.

Adducunt muscoli tres , quorum
duo à Metacarpio exorti mōticulum
Veneris constituunt : tertius ab osse
Metacarpii, Indicem spectante, enas-
citur.

Addu-
tores

Abducunt Pollicem totidem mus-
culi, propriis earentes nominibus.

Abdu-
tores 3.

DE NERVIS PER TOTAM manum expansis.

*D. Enumeratis manuum ossibus atque
musculis , vasa, quae motum, alimoniam,
vitamque eis praebeant, aperienda. Ea trium
sunt generum, nervi, vena, arteria, quae si-
gillatim ostendas velim ?*

*C. Per manum sex paria nervorum
disseminantur.*

Primum par à quinto ceruicis spon-
dylo prodiens in Deltoïdem muscu-
lum, & cutim illi incumbentem, absu-
mitur.

Nervo-
rum Bra-
chii 1.
par.

Secundum à sexta vertebra scatu-
rlens , in Bicipitem musculum pri-
mum fertur , mox musculo Cubiti

longissimo furculum largitur: tandem ubi Cubiti flexum attigit, in duos scatur ramos; quorum minor per Radium, maior per Cubitum, membrana carnosa suffultus, in totam Cubiti cutim & manum absumitur.

Tertium, secundo permixtum, in Brachii muscolum, Bicipiti substratum, riuos diffundit: dein ubi ad Cubiti articulationem peruenit, cum quinto pari confunditur.

Quartum omnium crassissimum, sub eodem musculo cum Basilica profunda, & arteria interna, delapsum, postquam in musculos Cubitum extendentes, & cutim internam Brachii, externamque Cubiti furculos aliquot diffudit, tandem iuxta Cubiti articulum in duos scinditur ramos; quorum alter secundum Radii, alter secundum Cubiti longitudinem excurrit. Ille furculis quinque, Pollici duobus, Indici totidem, Medio unico fruticatur: Hic in Carpo cessat.

Quintum par inter musculos Cubitum extendentes & flectentes delatum, pone internam Brachii apophysin, præteruictum, tertioque pari per-

mistum, in digitos absumitur, Minimo neruulos duos, Medico duos, Medio vnum distribuens.

Sextum par inter cutem & membranam carnosam per internam Brachii apophysin delapsum, in Cubiti cutim definit.

DE VENIS ET ARTERIIS
totam Manum rigantibus.

D. Nervos delineasti, Venas & Arterias persequere.

C. Venæ duæ ab Axillari ramo scaturientes, per vniuersam manum sparguntur, quarum altera per interiorem, altera per exteriorem Brachii partem fertur. Illa vulgò Basilica vocatur, hæc Cephalica, quòd in affectibus capitis tundatur. Sed illa interna nuncupatur ab Hippocrate, quòd interiora; hæc externa, quòd exteriora Brachii perreptet.

Venæ
Brachii
a.

Basilica, quæ iussu Hippocratis in Pleuritide secatur, in Profundam & Subcutaneam diuiditur.

Basilica.

Profunda Axillari arteriæ & tertio nervorum pari attensa, ad medium Cubiti flexum fertur, in Radium & Cubitum ramos spargens.

profunda.

Subcu-
tanea.

Subcutanea per cutim excurrit; & dum ad Cubiti articulationem peruenit, in duos finditur ramos: quorum Alter ad internum cubitum delatus, cum Cephalicæ ramo vnitur, vnde communis vena enascitur, Mediana vulgò dicta, quæ profectò riuulus est ex Cephalicæ & Basilicæ coïtu, in Cubiti articulatione emergens.

Media-
na.

Alter Basilicæ subcutaneæ ramus per infernum Brachii latus descendit, ramulis in vicinam cutem & partes subiectas dimissis.

Cepha-
lica.

Cephalica inter Deltoïdem musculum & Pectoralis tendinem superficie tenus delapsa, dum ad Cubiti flexum peruenit, in duos dirimitur ramos: quorum Alter in interiorem Cubitum obliquè latus cum Basilicæ ramo coït, & Communem venam parit: Alter insignior per Radium ad eius ferè medium descendit, hinc obliquè ad Carpum excurrans, manum externam ferè totam irrigat, & conspicuo ramo inter paruum digitum & Annularem desinit. Venam hanc Arabes. Saluatellam vocant, quam in melancholicis affectibus, lie-

Salua-
tella.

nis obstructionibus, & quartanis febribus, felicissimè secant.

Arteria ab Axillari ramo similiter prodit, sed vnica est, Basilica dicta, Eius duo sunt rami, Profundus & Subcutaneus. Vtérque varios ex se diffundit riuos. Est autem Subcutanei furculus quidam in Carpo conspicuus; quò loci, pulsuum differentias admota manu explorare solemus.

Arteria
Brachij.

DE PEDIS ANATOME.

D. Perdocte Candidate, Manus Anatomem sic explanasti, vt omnes eius partes sigillatim ante oculos posuisse videaris, eadem methodo & industriâ Pedis Anatomem instituas ex apto.

Transitus à
consecratione
Manus
ad Pedis
consecrationem.
pedis dictionis.

C. Pedis nomen generaliter, aut propriè, sumitur, vt manus.

Pes generaliter dictus ab Ischio ad extremos vsque digitos protenditur. Eius tres sunt partes; superior, quæ Græcis *μυὸς* dicitur, nobis femur: media à genu ad extremum pedem protensa, Græcis *σκέλος*, nobis crus: & postrema, quæ Græcis *ἄκρην*, extremus pes, & absolutè *πὺς*, nobis Pes propriè dicitur, ὄργανον μεταβαλικόν, id est instrumentum gradiendi, tribus

Cruris
latia-
tio.

constans partibus, Tarso, Pedio, & Digitis. Alii tamen non Pedis, sed Cruris nomen usurpant duobus modis, generaliter & specialiter; Crus in genere sumentes pro toto progressui motus instrumento; specialiter autem pro tibia inter genu pedémque sita.

*DE OSSIBVS AD TOTIVS
Pedis articulationem pertinentibus.*

Osse-
modis.
superior
part.
Caput.

Femoris vnicum est os, omnium longissimum, quod supra Ischio, infra Tibiæ, per diarthrosin articulatur. Superiore in parte caput habet rotundum, ab epiphyysi efformatum, ceruici prælongæ ad interiora inclinatæ adnatum, quod Ischii cauitatem subit, & sub ceruice apophyses duas, vnam in parte posteriore, alteram in parte anteriore sitam, quarum illa magnus Trochanter, hæc parvus Trochanter dicitur, ἀπὸ τοῦ τροχαῖζεν, quod est δια-
τροχαῖν, quod femoris motus cursus-
que per musculos his apophysibus in-
sertos perficiatur. Inferiore verò parte habet insignia duo tuberacula, (κοτύλης Græci vocant,) quæ recipiuntur intra ossis Tibiæ acetabula,

Trochá-
teres
duo.

Inferior
part.

& cauitatem tuberculis interiacentem, in quam inferitur ligamentum cartilaginofum, commiffuræ genu. Cruris ſpecialiter ſumpti offa duo ſunt: Tibia, quæ Græcis *κνήμη*, Arabibus focile maius; & Fibula, quæ ab illis *ῥοήν*, ab his focile minus appellatur.

Tibiæ ſuperior pars cum femoris offe per ginglymon articulatur: Si quidem duos ſinus habet, tubercula femoris excipientes, & Proceſſum in medio, qui à femoris cauitate excipitur. In extremo Tibiæ, gibba prominet appendix, quæ malleolus internus dicitur.

Minus os Perone nuncupatum ſuperiore parte genu non attingit, inferiore proceſſum emittit, quem malleolum externum vocant.

Perone ſuo ſine per ſynarthroſin Tibiæ alligatur: in medio autē ambo à ſe inuicem penitùs abſcedunt, vt Cubitus atque Radius.

Femori & Tibiæ communem præſtat operam os rotundum, quod laxiorem vtriuſque articulum firmat, à Græcis *ῥοπή* appellatum, qui age-

nu incumbit. Vulgus rotulam & pæ-
tellam vocat.

Tarsi of-
sa.

Tarsi ossa septem sunt, primum ab-
imis Tibiæ & Perones processibus
comprehenditur, Græcis ἀστέγχιος dia-
citur, Latinis Talus, vulgò os balistæ.

Astraga-
lus.

Calca-
neum.

Secundum os huic substratum, à
Græcis πέλμα, à Latinis Calx & Cal-
caneum appellatur, omnium crassis-
simum est, in quod trium musculo-
rum tendines chordam efficientes in-
feruntur.

Ses-
phoides.

Tertium à scaphæ similitudine
σκαφοειδής, id est os naiculare.

Cuboi-
des.

Quartum à cubi formâ κυβοειδής vo-
catur.

Sphe-
noidea.

Tria reliqua nullis propriis nomi-
nibus à vetustioribus Anatomicis do-
nata sunt, à nobis tamen Sphenoidea,
id est cuneiformia, nuncupantur; quòd
cuneorum instar nominatis ossibus
stringendis firmandisque adiecta fuisse
videantur.

Pedii of-
sa.

Pedium inde inchoatur, quod non-
nulli Metatarsum, alii Plantam appel-
lant, ex quinque ossibus constructum.

Digito-
rum of-
sa.

Postea Pedis digiti sunt siti, ad eo-
rum, qui in manu sunt, similitudinē,

ternis ossium Phalangibus constituti omnes, excepto Pollice, qui duobus tantum ossibus constat.

Articulantur per ginglymon.

Ad articulorum robur, sesamoïdea habent ossa, manus sesamoïdeis numero & situ similia.

Ossa sesamoïdea.

DE MUSCULIS CRVS

totum mouentibus.

D. Apertè Pedis ossa indicasti, musculos deinceps ossibus insertos, Pedum undecimque mouentes ostende?

C. Femur flectunt duo muscoli, vnus ex omnibus transuersis lumborum apophysibus descendens supra commissuram posteriorem ossis ilium & pubis, in paruum Trochanterem anticè inseritur, quem possis duplicem statuere, *ἵκκος* vocant Hippocrates & Galenus. Huic incubant renes. Vnde fit vt calculosis *καὶ ἡν τὸ μὲν κατὰ τὴν*, stupor in crure è directo persentiat.

Musculi Femoris. Flexores

ἵκκος

Alter Iliacus dictus, ex tota cavitate interna ossis ilium egressus, supra partem anteriorem capitis Femoris in eundem Trochanterem crasso tendine inseritur.

Iliacus.

Fenfo-
res 1.

Extendunt Femur musculi tres natium authores, maior, medius, minimus, qui à coccyge, osse sacro, & superna ilium costa descēdentes, in magnum Trochanterem inseruntur.

Adducē-
te, Ab-
ducētes
& Circū-
agentes

Adducunt, abducunt & circumagunt crus intrò & foras musculi novem:

Triceps.

Triceps, qui tria capita habet, à commissura ossis pubis orta, & tres insertiones in os Femoris sub paruo Trochantere.

Quadri-
gemini
6.

Musculi sex quadrigemini, parui & propè transversi, qui ab Ischii tubere prosilientes in Trochanterem magnum inseruntur: &

Obtura-
tores 2.

Obturatores duo, sic dicti; quòd foramen inter os pubis & Ischii patens obturent: vnus externus, qui à toto foraminis externo ambitu natus, in cauitatem Trochanteris magni fertur: alter intern⁹, qui ab interno foraminis ambitu exortus, supra coxendicem extrorsū, trochleæ instar, reflectitur, & variis tendonibus auctus, tandem vnico in magnum Trochanterem inseritur.

Exter-
nus.

Inter-
nus.

Musculi
Tibiæ.

Tibiam flectunt quatuor musculi

Postici appellati, quorum tres à tubere Ischii nascuntur, interiores duo, vnus Semineruosus, alter Gracilis dicitur, Tertius Exterior; Quartus Biceps, cuius caput alterum à commissura ossis pubis, alterum ab exteriori Femoris parte nascitur, ac vtrûmque vnico tendine in posteriorem Tibiæ partem inseritur.

Flexores.

4.

Semi-
neruosus.
Gracilis.Exter-
nus.
Biceps.

Extendunt Tibiam totidem, Rectus à spina inferna ossis ilium ortus:

Extensio-
res 4.
Rectus.

Vasti duo, Externus à radice Trochanteris magni, & Internus à Trochantere paruo natus: atque

Vasti 2.
Exter-
nus.
Inter-
nus.

Femoralis, qui Femoris ossi affixus est, vt Brachiauis Brachio. Ab aliis Crureus nuncupatur, quòd Cruris nomen pro Femore generaliter vsurpetur.

Femora-
lis, aliàs
Cru-
reus.

Hi quatuor muscoli communem tendinem crassum & latum faciunt, quo patellam genu, totamque dearticulationem anteriorem contingunt.

Adducunt Tibiam intrò, musculi duo;

Addu-
ctores 2.

Longus, vulgò Sutorius dictus, qui à spina ossis ilium exortus, obliquè in

Longus.

Tibiam internam & anticam descendit: &

Popli-
teus.

Popliteus, qui ab inferiore & exte-
riore Femoris tuberculo natus, in in-
teriorem Tibiæ partem inseritur.

Abdu-
ctor uni-
vers.
Membra-
nolus.

Abducitur Tibia, musculi unius mi-
nisterio, qui Membranofus vocatur,
quod totus ferè talis sit, præterquam
in ortu. Carnosus quippè à spina ossis
ilium obliquè descendit, suo mem-
branoso tendine latissimo in Tibiæ
partem externam, ac omnes penè Fe-
moris musculos inuestit, ad extremum
vsque pedem excurrans.

Musculi
pedis.
Flexores
2
Tibiæ.

Pedem flectunt musculi duo:

Tibiæus tibiæ anticæ affixus, qui à
superna eius epiphysi ortus, tendine
unico, sed ad finem bifido, in maius os
Pedii, & ossa duo Sphenoidea inseri-
tur: &

Peroneus.

Peroneus biceps, vno capite à Pe-
rones epiphysi superna, altero à Pe-
rones medio natus, tendones geminos
mittit, quorum maior sub planta
obliquè delatus, in os Pedii è regione
Pollicis inseritur, minor in os Mini-
mi digiti fertur.

Extensor.
4.

Pedem extendunt musculi quatuor:

Gemelli duo, internus quidem ab interno Femoris capite, externus autem ab externo exorti. Gemelli
2.

Soleus omnium crassissimus, sub Gemellis situs, à Tibiæ & Perones commissura natus, qui tres in vnicum tendinem, crassissimum & validissimum Pternæ principio inferendum desinunt; & Soleus.

Plantaris Palmari respondens, omnium minimus & tenuissimus, qui egreditur carnosus ex cōdylo externo Tibiæ, & in gracilem tendinem desinit; quem transmittit inter Gemellos & Soleum ad plantam Pedis. Plantaris.

Digitos flectunt duo muscoli, Magnus qui profundo, & Minor qui Sublimi respondet. Musculi digitorum.
Flexores 2.

Ille à superna Tibiæ epiphyssi oritur, & sub planta in quatuor finditur tendines, qui Minorem perforantes, in tertiam quatuor digitorum articulationem inferuntur; Magnus;

Hic in planta Pedis media situs, à Pterna inferna ortus, quatuor perfectis tendinibus, in secundum digitorum quatuor articulum fertur. Minor.

Digitos quatuor extendit musculus Extensor.

Maior.

duplex : Vnus Maior, à summa & externa Tibia exortus, qui in Pedem sub annulo quinque definit tendinibus, ad omnes digitorum articulos pergentibus:

minor.

Alter Minor, sub Maiori latitans, à superiore Tarso carnosus prodiens, mox in quinque tendines definit, pluribus digitis insertos.

Addu-
tores

4.

Lum-
brici.Abdu-
tores 8.Interos-
sei.Musculi
Pollicis.

Flexor.

Adducunt digitos lumbrici quatuor, à Digitum flexoris Magni tendinibus enati.

Abducunt verò Interossei octo, à Pedii ossibus orti, & spacia Metatarsi opplentes.

Pollex peculiare habet musculos.

Flectitur vnico à superiore Fibula prodeunte.

Extensor.

Extenditur altero, à media Fibula enato, qui sæpè in duos tendines diuiditur.

Addu-
tor.

Adducitur vnus opera, ossi Pedii Maximo intus attensi.

Abdu-
tor.

Abducitur ab alio, qui à Calcis interna parte carnosus enatus principio in primum Pollicis os inseritur.

Est & peculiaris musculus minimi digiti abductor, à Calcis exortus, adeo

ut hi Abductores, Tenari & Hypotenari respondeant.

*DE NERVIS PER FEMUR,
Tibiam & Pedem productis.*

*D. Pedis ossibus atque musculis dilucidè
expositis, vasa nunc in aspectum profer,
qua motum, alimentum & vitam illis im-
perviunt, sumpto à nervis initio.*

C. Per totum Pedem nervi qua-
tuor insignes disseminantur, qui ex
tribus inferis paribus lumborum, &
quatuor superioribus ossis sacri nas-
cuntur.

pedis
totius
nervei
4.

Primus & summus sub peritonæo
ad parvum Trochanterem delapsus,
in Cruris musculos, cuiusque internam
& externam cutim, priusquam genu
attingat, absimitur.

1.

Secundus & inferior cum vena &
arteria Crurali per inguen in Crus
ascendit, ramumque insignem cum
vena Malleoli per internum Femur,
ad Pedem usque, demittit; cuti vicinæ
inter ea ramulos largitus: maior autem
ars cum vena & arteria in internos
Cruris musculos dispergitur.

2.

Tertius his inferior furculos mus-
culis penis & quibusdam cruris, nec-

3.

non cuti inguinali largitur, deinde in propinquos musculos supra Cruris medium definit.

4.

Quartus nervorum omnium crassissimus, siccissimus, validissimus, ex quatuor supernis Paribus ossis sacri ortus, inter os sacrum & ilium elapsus, ramulos vicinis partibus, ut cuti natium & cruris, necnon substratis musculis largitur: deinde in duos abit ramos, eorum minore secundum Peronem delapso, in Pedem superiorem digitis singulis binos dat furculos: maiore autem per Tibiam & pedem protenso, digitis singulis binos quoque dat ramos. Sed ambo hii rami musculorum capita & cutim tibiae & pedis obiter adeunt & texunt.

*DE VENIS ARTERIISQUE
uniuersum Pedem rigantibus.*

D. Demonstratis nervis, breui venarum & arteriarum demonstrationem ex pedi, ut Anatomico Examini finem imponam.

Trāitus
ad Venas
& Arterias.

C. Quemadmodum ascendenti Cauæ ramus Subclavius è thoracis cauitate exiliens, Axillaris dicitur, ab eoque Brachii & Manus venæ omnes deriuantur

deriuantur : ita descendens Cauz
ramus Iliacus, simul atque è Perito-
neo elabitur, & ad inguina crurâque
descendit, Cruralis appellationem
fortitur.

Ramus hic Cruralis plures ex se
promit surculos, per Femur, Tibiam
& extremum Pedem, numerosa ramo-
rum serie sparsos: Sex tamen maximè
conspicuis ramis fruticatur.

Rami
Cruralis
diuisio.

Sunt autem hæ omnes propagines,
Sapheïa, Ischias minor, Muscula,
Poplitea, Suralis, & Ischias maior.

Sapheïa Græcis dicta, quia semper
apparet & conspicua est, vulgò Sa-
phena, sub inguine nata, duplex est:
interior, qua bubonum fluxio fit, in
eius loci glandulas absumitur: exte-
rior per Cruris longitudinem inter
cutim & membranam carnosam de-
lata, sub genu in duos ramos scindi-
tur, vno ad Malleolum internum, al-
tero ad Malleolum externum descen-
dit, & in Pedis cutim tandem absu-
mitur.

Sapheï
na.

Ischias minor è regione Saphenæ
in anteriorem Ischii cutim, & eius
loci musculos, distribuitur.

Ischias
minor.

Muscu-
la,

Muscula in duos finditur ramos, minor in Tibiæ musculos Extensores, riuos diffundit: maior profundior, in omnes ferè Femoris musculos diuaticatur.

Poplitæ
968,

Poplitea ex ramis duobus Cruralis coëuntibus conflata, surculis aliquot in Cruris cutim posticam sparsis, per medium Poplitem delapsa, nunc in suræ cutim absumitur, nunc ad Calcem vsque descendit, nunc per externum Malleolum fertur.

Suralis.

Suralis in Suræ musculos & cutim Tibiæ internæ disseminata, circa Malleolum internum reflexa, latus internum Pedis, & cutim Pollicis, rarè alios digitos adit.

Ischias
maior.

Ischias maior portione maiore per Suræ musculos delata, absumitur in surculos decem, singulis scilicet digitis binos: minore autem inter Peronem & Calcem cæsante, interdum perforato medio ligamento in musculum, digitum pedis abducentem, & cutim spargitur.

Arteria
Crura-
lis.

Cruralis arteria iisdem ferè riuulis fruticatur, adeò vt vena comitem ferè semper habeat arteriam.

DECANI IUDICIUM
de Candidati merito.

*Eruditionis industriaeque tuæ specimen,
Candidate, Physiologico & Anatomico
examine nobis exhibuisti: si de cæteris
Medicinæ partibus Collegis meis tecum
disputaturus, ita solerter & acutè respon-
deris, Apollinari laurea te dignum iu-
dico.*



DISPUTATIO II.
DE REBUS NON
NATURALIBVS,
in quarum legitimo vſu
ὁ γινώσκων consistit.

DOCTOR II.

*Quæ &
quot
sint res
non na-
turales.*

EXpositis rebus naturalibus, ad res non
naturales tranſeundum est. *Quanam
sunt res non naturales?*

CANDIDATVS.

*Quæ naturalem hominis constitu-
tionem tuentur.*

D. Cur ſe dicuntur?

*C. Quia non ſunt de hominis na-
tura, nec contra illius naturam.*

D. Quot ſunt res non naturales.

*C. Sex ſunt numero, aër ambiens,
cibus & potus, ſomnus & vigilia, mo-
tus & quies, excretio & retentio, ac
animi pathēmata, in quarum legiti-
mo vſu ſanitatis tuendæ methodus,
ὁ γινώσκων Græcis dicta, conſiſtit.*

*D. Sûntne omnes ad humani corporis
conservationem necessariae?*

C. Aded necessariae sunt, vt sine sin-
gularum vſu, ne humana quidem vita
diu ſubſiſtere queat. Quia enim
perennis fit triplicis ſubſtantię noſtrę
ab innato calore diſſipatio; ſpirituosa
ab aëre, ſolida à cibo, humida à potu
neceſſariò inſtauranda. Somnus item
neceſſarius ad cibos probè conco-
quendos, ac exolutos ſpiritus reſar-
ciendos: vigilia ſubinde requiritur, ad
functiones animales edendas. Exerci-
tatio etiam neceſſaria ad natiuum ca-
lorem ſuſcitandum: Alterna requie
opuſeſt, ad membra labore fatigata
leuāda. Cūque natura totum quod
aſſumitur alimentum in noſtram ſub-
ſtantiā conuertere non poſſit, excre-
menta neceſſariò excernenda. Animi
inſuper Pathemata vitari nequeunt,
ratione obiecti boni vel mali: licet im-
moderatae animi paſſiones, quæ pecu-
liariter à nobis perturbationes appel-
lantur, foras ſint ablegandæ.

*Vt ſin-
gulae ad
corporis
tutelam
neceſſa-
riae.*

*D. Quibus conſtituitur ſanitatſ tuen-
da methodus?*

*Quibus
conſtit
ſanitatſ
tuendæ
metho-
dus.*

C. Conuenienti ſingularum rerum

non naturalium qualitate, quantitate, utendi modo & tempore.

D. Clarior erit Hygiastica methodus, per dichotomias hoc modo constituta: Hygieine est Medicina pars, quæ naturalem Hominis constitutionem conservat incolumem, substantia nostra defectum reparando, & hospites nobis infestos ejciendo. Substantia nostra defectus reparatur in introductione 1. aëris. 2. cibi & potus: & alternatione 1. somni & vigilia: 2. motus & quietis. Hospites nobis infesti ejciuntur a mandatione excrementorum corporis, & perturbationum animi. Perficitur methodus, primum cuiusque rei non naturalis qualitatem & quantitatem, dein utendi modum & tempus explanando.

DE AERE AMBIENTE.

Qualis aër ad bonam valetudinem tuendam eligendus?

Aëris
quali-
tas.

C. Qui nec crassus, nec densus, nec ob stagnum aut flumen vicinum nebulosus, sed tenuis & serenus: nec calidior, nec frigidior, nec siccior, nec humidior, sed temperatus: nec lacuum, paludum, cloacarum halitu, nec graui cadauerum expiratione infectus, nec fimo aliarumque rerum

inferiorum vel superiorum putredine inquinatus, sed purus: nec qui editis undique montibus in valle, cauóque loco inclusus, nullis perflatur ventis.

D. Quantum aëris ducere expedit?

C. Validi, quò vberius aëre libero fruuntur, eò melius se habent. Sed imbecillis, & iam recens à morbo conualescentibus, ex incluso aëre in liberum apertumque, transitus est periculosus.

Quantitas.

D. Quomodo igitur in aëris usu se gerere debent?

C. Sensim ac pedetentim liberiori aëri assuescere oportet.

Utendi modus.

D. Quando tutius aëri libero se exponere poterunt?

C. Serenis diebus, cum nec Solaribus radiis nimio perè excafactus, nec præter modum refrigeratus, nec ventorum impetu exagitatus fuerit.

Tempus.

DE CIBO ET POTU.

D. Qualis cibus ad sanitatem conservandam eligendus?

C. Cibus εύχυμος boni succi, εύπεπτος facilis concoctionis, & qui minimum excrementi habet, perpetuò eligendus est. Fugiendus verò ακόχυμος ma-

cibus qualis.

lo succo præditus, *Ναρεμνος* concoctus
difficilis ac excrementis abundans.

D. Quinam boni succi cibus?

C. Qui neque iusto calidior, neque
frigidior, neque siccior, neque humi-
dior, sed *εὐπαρετος* temperatus; neque
glutinosior, neque tenuior est, sed
μεσότης mediocris, boni succi habetur:
quia sanguinem gignit. temperaturæ
& consistentiæ laudabilis, ut qui nec
crassior, nec serosior existat.

D. Quantum cibi assumendum?

C. Tantum cibi ingerendum, quan-
tum dissipatæ corporis substantiæ re-
sarcientiæ sit satis. Quocirca qui cali-
do innato abundant, quique pluri-
mum exercentur, quia insignem sub-
stantiæ suæ iacturam faciunt, pluri-
mo egent alimento: qui verò parum
habent calidi innati, otioque fruun-
tur, minimo. Quò autem moderatior,
simpliciórque victus extiterit, eò na-
turæ familiarior. Utque sobrietas sa-
luberrima, sic cibi copia, varietásque,
ventriculo negotium faceffit.

D. Quis cibandi modus?

C. Cibus antequam transglutiat,ur,
accuratè dentibus masticari debet,

Quantitas.

cibandi
modus.

quò faciliùs in ventriculo concoqui possit. In cibis insuper assumendis is seruandus ordo, vt liquidi solidis, leues grauibus, *εὐπρεπὲς καὶ ἀσπρέπης*, ac lubrificantes astringentibus præmittantur.

D. Quando cibus est assumendus?

C. Assumendus cibus consuetâ horâ, priore confecto, & in aluum demisso, prægressa exercitatione, iamque illiciente appetitu; vt natura, quæ stato tempore suas functiones obit, illius concoctioni alacriùs incumbat.

Et tempus.

D. Qualis potus ad bonam valetudinem confert?

C. Inter omnia potus genera, vinum primas tenet. Sed rubellum, nonnumquam album, clarum, tenue; non dulce, non acerbum, sed maturum, lenè, minùs vehemēs eligendum: idque per æstatem dilutius, per hyemem meracius bibendum. Sed valdè calidis hominum temperamentis aqua vino est commodior. Optima verò est quæ limpidissima & leuissima, omnique tum odoris tum saporis vitio carens. Cereuisia ex aqua, hordeo & lupulo probè confecta, iis populis

Potus qualitas.

Hv.

qui Aquilonares regiones incolunt, potus est non ineptus; modò sit clara, tenuis, non recens, nec vetusta nimium. Pomaceum & pyraceum zytho præstantiora.

D. Controuersam questionem hîc discutendam tibi propono: Utrum malorum, an pyrorum salubrius vinum?

Cur py-
raceum
poma-
eco salu-
brius.

C. Id salubrius vinum est, quod è salubriori fructu exprimitur:

Sed pyra malis salubriora sunt;

Ergo vinum è pyris expressum, erit salubrius.

Censura
Cauilla-
toris,

D. Neotericus tamen Censor, nescio quis, è Senecione nomen sortitus, Frambesarium reprehendit, ratione & veterum Archiatrôn autoritate demonstrantem, roborando stomacho aptiorem, ac proinde corpori salubriorem esse, pyrorum quàm malorum; vinique è pyris, quàm è malis expressi usum.

Explo-
ditur à
Candi-
dato

C. Nouus ille doctor à vera senum doctrina desciscens, dum cupidè sibi famam obtrectatione alienæ scientiæ aucupatur, inscitiae suæ specimen exhibet. Quid sibi vult? Nonne ex Dioscoridis, Galeni, aliorumque Principum Medicorum decretis, fructus

sicciores humidioribus ἐξηρότεροι; quia
siccitas nullum facit excrementorum
prouentum, resistitque putredini; hu-
miditas verò excrementorum copiam
gignit, quæ morborum soboles exi-
sit: At pyra pomis sicciora sunt, ac
manifesta insuper adstrictione præ-
dita. Vnde ἐυσώμαχα, ac facultati con-
coctrici corroborandæ idonea esse
perhibentur: poma verò κακώμαχα,
quia ventriculum nimia humiditate
dissoluunt. Pyraceum igitur pomaceo
præstat, quia minùs humectat, magis-
que refrigerat, ac adstringendi vim
possidet à sua substantia terrestri pro-
fectam; necnon & occulta quadam
proprietas, vitio, à fungorum esu cō-
tracto auxiliatur. Nec est quod obii-
ciat, ex acerbis aut acidis pyris confe-
ctum pyraceum, nimio perè ventricu-
lum refrigerare, digestionem impedi-
re, diutius in hypochondriis remora-
ri, tardiùsque per vrinas & aluū per-
meare, quin & Colicos cruciatus
& lumbricos parere. Eadem enim
symptomata gignit pomaceum, ex
acerbis aut acidis malis paratum. Sed
hæc vt præcaueantur, vtrūque &

Oble-
tio Cē-
foris.

Respon-
sio Can-
didati.

maturis fructibus, iisque non aqua perfusis, sed synceris, concinnandum; nec alterutro utendum, nisi defæcato, limpido, & perfectam in dolio maturitatem adepto. Sic naturis impensè calidis pyraceum tutò potandum exhibebitur: ut minùs calidis pomaceù. Nec nisi falsò potest asserere poma pyris omnibus leuiora esse; cum præsertim pyra Certeola Gallis dicta, & alia id genus, in vase aqua pleno supernatent, non aliter atque poma, licet nonnulla magis terrestria fundum petant, non secùs ac cotonea, quæ nihilominus habentur *εὐσπομαχίτης*. Inde pyraceum pomaceo salubrius esse, contra Censorem concludo.

D. Perdocte Candidato, acerrimus Frambesarianæ doctrinæ vindex extitisti; & quæ in luculentum Scriptorem coniecta fuerant, ingeniosè in suum Authorem tela retorsisti. Satis iam de potus qualitate, ad quantitatem transeundum. Quænam potionis quantitas idonea?

Quanti-
tas.

C. Quæ assumpto cibo respondet. Cum solidiora & sicciora ingeruntur alimenta, liberalior: ubi liquidiora & humidiora, parcior potus conuenit.

At potio vini si largior æquo sumpta fuerit, corporis & animi vires conuellit, maturamque senectutem accelerat.

D. Quis bibendi modus?

C. Profusior bibendi modus in pastu improbatur, quia cibi fluctuationem in ventriculo parit. Nec parior laudatur, quia sitim non extinguit. Si frequentius bibatur, cibi concoctio impeditur. Omnis autem potio siue vini, siue cereuisiæ frigidior, vel ex aqua puteana, vel ex niue, quæ ad æstiuos vsque ardores reseruata fuerit, vel ex sale nitri effecta, maximè vitari debet, vt neruis omnibus nocētissima.

Bibendi
modus.

D. Quando in mensa bibendum esse iudicas?

C. Vt fames, edendi necessitatem arguit; sic ab esu sitis vrgens, tempestiuum esse potum testatur, ad supplendum humiditatis defectum. Ac licet nulla sitis adsit, vbi dimidium solidioris cibi iam assumptum fuerit, potus videtur necessarius, ad eum in ventriculo diluendum, & madefaciendum, quò faciliùs digeri & ad hepar deferri queat: propterea quòd potus,

Et tem-
pus.

vt monet Erasistratus, cibi vehiculum est. Sed ante cibum, & statim à pastu, & à balneo, & dum sudore perfunditur corpus, à potu temperandum est.

DE SOMNO ET VIGILIA.

D. Qualis somnus ad corporis incolumitatem esse debet?

Qualis
somens
esse de-
bet.

C. Placidus, profundus & mediocris. Nec enim laudabilis somnus, qui turbulentis agitur insomniis, quique aded levis, vt statim soluatur, ac plerumque interrumpatur. Peior etiã immodicus. Siquidem ne excrementa opportunè expellantur, sed iusto longius in corpore detinentur efficit, peritomatôn copiam parit, frigidius & humidius cerebrum reddit, capitis grauitatem accersit, mentis torporem, sensusque hebetudinem inducit.

D. Quamdiu dormire expedit?

Quantisper
dormi-
endum.

C. Quantisper sit dormiendum ex alimentorum perfecta concoctione æstimatur. Etsi autem omnium vna & eadem somni quantitas esse nequit, quòd nonnulli citius, alij tardiùs concoctionem perficiant: magna tamen ex parte, sex, septem, vel ad summum octo horarum spatio circūscribitur.

somni duratio. Ad somni tamen quantitatem limitatiùs definiendam, temperamentum, ætas, alimentum & labor antecedens, considerata. Longior quippè somnus conuenit biliosis, quàm pituitosis; senibus, quàm iunioribus; iis quibus liberalior, quàm quibus frugalior hesternafuit cœna; necnon & iis quibus improbus corporis aut animi præcessit labor, quàm quibus nullus.

D. Quanam est conueniens in somno capeffendo decubitus forma?

C. In dextrum latus imprimis fiat decubitus, vt cibus promptiùs in ventriculi fundum descendat; dein in sinistrum, vt iecore, ventriculo magis incumbente, adiuuetur concoctio.

Quæ sit conueniens in somno forma decubitus.

Qua perfecta, in latus dextrum rursus decumbendum, vt chylus faciliùs iecori distribuatur. Adde quòd ab vno in alterum latus per vices decubitus fatigationem non parum leuet. Supinus decubitus damnatur ab omnibus, quòd grauium morborum sit occasio. Pronus iis potissimum noxius qui oculorum defluxione laborant.

D. Quo tempore salubrior somnus?

Quod
aptius
somnia
tempus.

C. Tempus somni convenientissimum est nocturnum, duabus aut tribus à cœna horis. Quippè nox propter suam humiditatem ac tranquillitatem ad somnum est aptissima. Præterea satis temporis, quoad absoluta fiat ciborum concoctio, habet, ita ut somnum interrompere negotiorum gratia noctu non sit necesse. Diurnus contra nocentissimus, quod cerebrum nimia humiditate oppleat, quam potius vigiliis exiccantibus dissipare oportet.

D. Quanam vigiliae salubres?

Quæ vi-
gilie sa-
lubres, &
insalu-
bres.

C. Ut somnus mediocris confert, immodicus verò noxius; sic moderatæ vigiliæ profunt, immoderatæ autem obsunt. Quemadmodum enim somnus immodicus cerebrum plus æquo refrigerat & humectat: ita vigiliæ, ubi modum excedunt, cerebri temperaturam labefactant, sensus debilitant, virtutem deiiciunt, concoctionem impediunt, cruditatēque pariunt; quod per vigilias nativus calor cum sanguine & spiritu ad exteriora moveatur. Utque diurnus somnus intempestivus, ita diurnæ vigiliæ

tempestivæ. Quocirca Hippocratis præcepto πλὴν ἡμεῖς ἐγρηγορεῖν, interdum vigilare; καὶ πλὴν νύκτα καθεύδειν, ac nocturno dormire, expedit; quia per somnum nocturnum melius fit concoctio: interdum autem vigilando alimenti distributio & excrementorum expulsio commodius perficitur, præterquàm quòd facultas animalis ad suas functiones obeundas diei calore & lumine excitatur.

DE EXERCITATIONE.

D. Qualis exercitatio esse debet?

C. Nec lenior, nec vehementior, nec velocior, nec tardior, sed mediocris exercitatio esse debet. Pituitosis tamen valentius ac promptius, biliosis verò mitius ac moderatius exercitium confert. Æquale exercitium inæquali præfertur. Corporis exercitium, quod animum oblectat, longè salubrius.

D. Quandiu exercitatio est subeunda?

C. Exercitandum corpus, dum facis incalescat, & intumescat, & color floridus appareat, ac sudor cum calido vapore mistus cernatur, respiratio sit magna & facilis, ac quâdiu motus

Qualis
exercita-
tio esse
debeat.

Qualis
per exer-
citiū sit
subeun-
dum.

alacriter, æquabiliter, & cōtinuè editur. Simul ac aliquid horum immutatum fuerit, illicò desistendum, ne corpus diuturniori exercitio frigidius, aridius & gracilius tandem euadat. Perpetuò autem exercitium victui respondere debet. Quò enim quis liberaliori vel frugaliiori victu vitur, eò maiori vel minori eget exercitio.

D. Quinam est exercitationis modus?

Exerci-
tationis
modus.

C. Toties exercitatio requiritur, quoties corpus pascitur. Motus initio lentus, dein vehementior, ac tandem lenior fieri debet.

D. Quòdnam tempus exercitationi aptum?

Et tem-
pus.

C. Tempus exercitationi opportunum est, vbi perfecta fuerit cibi concoctio: Cùm autem exercitatio calorem natium suscitet, sine quo cibus perfectè concoqui nequit, ante pastum perpetuò adenda est. Adde quòd multa exercitium absumat peritommata, quæ prius expellenda sunt, quàm cibus ingeratur. Post pastum verò, exercitatio valdè noxia, quòd agitatio cibum è ventriculo protrudat, antequàm fuerit concoctus; ynde

magnus in venis cruditatum prouentus, ex quo plurimi oriuntur morbi. Non est etiam exercitatio ineunda, nisi euacuatis prius excrementis, quæ vel in vesica, vel in inferiore aluo continentur. Verendum namque est, ne quid ex iis in habitum corporis, vi caloris, qui per exercitationem accenditur, rapiatur.

DE QUIETE.

D. Quando quies requiritur?

C. Vbi ex multa motione corpus est defatigatum.

In omni quippe corporis motu (inquit Hippocrates aph. 48. lib. 2.) cum fatigari quispiam cœperit, quies confestim lassitudinis remedium est.

Id quod confirmat Ouidius 4. Epist.

Quod caret altera requie, durabile nō est,

*Hæc reparat vires, fessaque membra
lenat.*

Animo denique curis & studiis festo sua relaxatione ac remissione opus est, quam nisi concedas, non est cur diu vigorem eius conseruare possis, vt rectissimè idem dixerit Ouidius:

*Otia corpus alunt, animus quoque pas-
citur illis.*

quies
quæ sa-
lubris &
quæ in-
salubris.

Sed ut quies est salubris, ubi mediocris; ita insalubris, ubi immodica est. Corporis quippè & animi vigorem obtundit, cruditatèque parit. Ut enim per exercitium calor nativus augetur, adeoque ciborum concoctio fit expeditior; ita per otium extinguitur, & ciborum concoctio impeditur.

DE EXCREMENTIS.

D. *Quanam excrementa salubria?*

Quanam
excremen-
ta salu-
bria.

C. Excrementa singula, si modè ac tempestivè excernantur, salubria sunt. Si verò cohibeantur, vel moram in corpore diutius trahant, putrescunt, variæque morborum genera invehunt. Quamobrem ad tuendam valetudinem ea sunt artis præsidio maturè euacuanda.

D. *At euacuatio artificiosa sanis non convenit: quia, ex Hippocrate, sani, dum cathartici purgantur, citò exoluntur, Aphor. 2.*

An retē-
torum
excre-
mento-
rum e-
vacuatio
arte mo-
lienda.

C. Id intelligendum de valentibus, qui inculpato sunt corporis habitu, quique sibi vivunt, & ante cibum corpus & animum exercendi, & accuratam cibi benè concoquendi cu-

ram habent: sed qui legitimam victus rationem non seruant, vel propter intemperantiam, vel negotia, vel eorum, quæ fieri opus est, ignorantiam, quantumvis sani & valentes, à morbis tuti esse nequeunt, nisi aui per interualla ducendæ prouidentia, & potentioris etiam aliquâdo purgationis vsu, & administrata tempestiuè Phlebotomia, & opportuna medicamentorum potione, quæ concoquendi, attenuandi, abstergendique vi polleant, vt libro de euchymia Galenus scriptum reliquit.

D. Quid ad euacuationis quantitatem definiendam animaduertendum?

C. Virium ratio perpetuò habenda. Quælibet enim euacuatio, si modum excesserit, periculosa, quia vires prostermit.

*Euacuationis
quantitas*

D. Quis euacuandi modus?

C. Vbi plurima est superuacanea materia, parcè & paulatim, non semel & vniuersim, vacuanda est; ne corpus nimio perè debilitetur. Sati⁹ est igitur Phlebotomiam sæpiùs administrare, quàm nimiam sanguinis copiam semel extrahere. Clementer item cor-

Modus

pus per epicrasim repurgare tutius, quàm vehementius illi catharticũ semel exhibere. Sic sudorem, urinam & menses, iteratis potius medicamentis blandioribus, quàm vnico vehementiori, ciere præstat. Sic per interualla moderatus Veneris vsus ad secundam valetudinem tantò concupiscendus, quantò frequentior & immoderatio pertimescendus.

D. Quod tempus molienda vacuationi opportunius?

Et
tem-
pus.

C. Ex anni temporibus ver corpori per sanguinis missionem aut purgationem vacuando aptissimum, vt testatur Hippocrates. Aph. 47. lib. 9. quia tunc (inquit Philotheus) neque ingens viget æstus, qui corporis dialysim faciat; neque frigus, quod humorum concretionem afferat, sed potius bona temperies. Autumno item Galenus humorum superuacueorum euacuationem molitur, ad morborum inde oriundorum præcautionem. Excrementa, quæ sua qualitate noxia, vt alui fæces, vrina, sudor, mucus & sputum, quotidie vacuanda sunt: seu quæ quantitate

duntaxat peccant, ut somen & menses, retinenda quidem sunt, quousque copiâ suâ molestare incipiunt.

A primo somno moderata Venus, siue ad tuendam valetudinem, siue ad propagandam prolem utilior; quia seminis coctio tunc perfecta est, dissipatorumque spirituum iactura consequente somno refarcitur. Profluentibus mensibus concubitus prohibetur, ne fœtus gignatur elephanticus. Nec pleno, nec ieiuno ventriculo coïtus confert. Vernum tempus Veneri idoneum. Ætas item iuuenilis Veneri accommodata. Reliquæ enim semen aut prorsus nullum, aut infœcundum habent. Vbi menses subsistunt, eo tempore sunt arte prouocandi, quo fluere antea consueuerant, ut sit natura adiutrix. Nec grauidis mulieribus, nec nutricibus, nec iunioribus, nec vetulis vnquam procurandi sunt.

DE ANIMI PATHEMATIS.

D. Ex omnibus rebus non naturalibus ad prosperam valetudinem pertinentibus, tria tantum sunt medicata restant, quæ à Latinis animi perturbationes appellantur. Aperias velim quæ & quot sunt, ac salu-

maturis fructibus, iisque non aqua perfusis, sed synceris, concinnandum; nec alterutro utendum, nisi defæcato, limpido, & perfectam in dolio maturitatem adepto. Sic naturis impensè calidis pyraceum tutò potandum exhibebitur: ut minùs calidis pomaceū. Nec nisi falsò potest asserere poma pyris omnibus leuiora esse; cum præsertim pyra Certeola Gallis dicta, & alia id genus, in vase aqua pleno supernatent, non aliter atque poma, licet nonnulla magis terrestria fundum petant, non secùs ac cotonea, quæ nihilominus habentur *εὐσπομαχίτης*. Inde pyraceum pomaceo salubrius esse, contra Censorem concludo.

D. Perdocte Candidate, acerrimus Frambesarianæ doctrinæ vindex extitisti; & quæ in luculentum Scriptorem coniecta fuerant, ingeniosè in suum Authorem tela retorxisti. Satis iam de potus qualitate, ad quantitatem transeundum. Quænam potionis quantitas idonea?

Quantitas.

C. Quæ assumpto cibo respondet. Cum solidiora & sicciora ingeruntur alimenta, liberalior: ubi liquidiora & humidiora, parcius potus conuenit.

At potio vini si largior æquo sumpta fuerit, corporis & animi vires conuellit, maturamque senectutem accelerat.

D. Quis bibendi modus?

C. Profusior bibendi modus in Bibendi
modus. pastu improbatur, quia cibi fluctuationem in ventriculo parit. Nec parior laudatur, quia sitim non extinguit. Si frequentius bibatur, cibi concoctio impeditur. Omnis autem potio siue vini, siue cereuisiæ frigidior, vel ex aqua puteana, vel ex niue, quæ ad æstiuos vsque ardores reseruata fuerit, vel ex sale nitri effecta, maximè vitari debet, vt neruis omnibus nocētissima.

D. Quando in mensa bibendum esse iudicas?

C. Vt fames, edendi necessitatem Et tem-
pus. arguit; sic ab esu sitis vrgens, tempestiū esse potum testatur, ad supplendum humiditatis defectum. Ac licet nulla sitis adsit, vbi dimidium solidioris cibi iam assumptum fuerit, potus videtur necessarius, ad eum in ventriculo diluendum, & madefaciendum, quò facilius digeri & ad hepar deferri queat: propterea quòd potus,

vt monet Erasistratus, cibi vehiculum est. Sed ante cibum, & statim à pastu, & à balneo, & dum sudore perfunditur corpus, à potu temperandum est.

DE SOMNO ET VIGILIA.

D. Qualis somnus ad corporis incolumitatem esse debet?

Qualis
somens
esse de-
bet.

C. Placidus, profundus & mediocris. Nec enim laudabilis somnus, qui turbulentis agitur infomniis, quique aded levis, vt statim soluatur, ac plerumque interrumpatur. Peior etiā immodicus. Siquidem ne excrementa opportunè expellantur, sed iusto longius in corpore detinentur efficit, peritomatōn copiam parit, frigidius & humidius cerebrum reddit, capitis grauitatem accersit, mentis torporem, sensusque hebetudinem inducit.

D. Quamdiu dormire expedit?

Quantisper
dormiē-
dum.

C. Quantisper sit dormiendum ex alimentorum perfecta concoctione aestimatur. Etsi autem omnium vna & eadem somni quantitas esse nequit, quòd nonnulli citius, alij tardiùs concoctionem perficiant: magna tamen ex parte, sex, septem, vel ad summum octo horarum spatium circūscribitur.

somni duratio. Ad somni tamen quantitatem limitatiùs definiendam, temperamentum, ætas, alimentum & labor antecedens, consideranda. Longior quippè somnus conuenit biliosis, quàm pituitosis; senibus, quàm iunioribus; iis quibus liberalior, quàm quibus frugalior hesternæ fuit cœna; necnon & iis quibus improbus corporis aut animi præcessit labor, quàm quibus nullus.

D. Quænam est conueniens in somno capeffendo decubitus forma?

C. In dextrum latus imprimis fiat decubitus, vt cibus promptiùs in ventriculi fundum descendat; dein in sinistrum, vt iecore, ventriculo magis incumbente, adiuuetur concoctio.

Quæ sit conueniens in somno forma decubitus.

Qua perfecta, in latus dextrum rursus decumbendum, vt chylus faciliùs iecori distribuatur. Adde quòd ab vno in alterum latus per vices decubitus fatigationem non parum leuet. Supinus decubitus damnatur ab omnibus, quòd grauium morborum sit occasio. Pronus iis potissimum noxius qui oculorum defluxione laborant.

D. Quo tempore salubrior somnus?

Quod
aptius
somni
tempus.

C. Tempus somni convenientissimum est nocturnum, duabus aut tribus à cœna horis. Quippè nox propter suam humiditatem ac tranquillitatem ad somnum est aptissima. Præterea satis temporis, quoad absoluta fiat ciborum concoctio, habet, ita ut somnum interrompere negotiorum gratia noctu non sit necesse. Diurnus contra nocentissimus, quod cerebrum nimia humiditate oppleat, quam potius vigiliis exiccantibus dissipare oportet.

D. Quanam vigiliae salubres?

Quæ vi-
giliæ sa-
lubres, &
insalu-
bres.

C. Ut somnus mediocris confert, immodicus verò noxius; sic moderatæ vigiliæ profunt, immoderatæ autem obsunt. Quemadmodum enim somnus immodicus cerebrum plus æquo refrigerat & humectat: ita vigiliæ, ubi modum excedunt, cerebri temperaturam labefactant, sensus debilitant, virtutem deiiciunt, concoctionem impediunt, cruditatēque pariunt; quòd per vigiliās natiuus calor cum sanguine & spiritu ad exteriora moueatur. Vtque diurnus somnus intempestius, ita diurnæ vigiliæ

tempestivæ. Quocirca Hippocratis præcepto πρὸ ἡμετέρας ἐγρηγορεύειν, interdiu vigilare; καὶ πρὸ νύκτα καθεύδειν, ac noctu dormire, expedit; quia per somnura nocturnum melius fit concoctio: interdiu autem vigilando alimenti distributio & excrementorum expulsio commodius perficitur, præterquàm quòd facultas animalis ad suas functiones obeundas diei calore & lumine excitatur.

DE EXERCITATIONE.

D. Qualis exercitatio esse debet?

C. Nec lenior, nec vehementior, nec velocior, nec tardior, sed mediocris exercitatio esse debet. Pituitosis tamen valentius ac promptius, biliosis verò mitius ac moderatius exercitium confert. Æquale exercitium inæquali præfertur. Corporis exercitium, quod animum oblectat, longè salubrius.

Qualis exercitatio esse debet.

D. Quandiu exercitatio est subeunda?

C. Exercitandum corpus, dum factis incalescat, & intumescat, & color floridus appareat, ac sudor cum calido vapore mistus cernatur, respiratio sit magna & facilis, ac quâdiu motus

Quâdiu per exercitium sit subeundum.

alacriter, æquabiliter, & cōtinuè editur. Simul ac aliquid horum immutatum fuerit, illicò desistendum, ne corpus diuturniori exercitio frigidius, aridius & gracilius tandem euadat. Perpetuò autem exercitium victui respondere debet. Quò enim quis liberaliori vel frugaliiori victu utitur, eò maiori vel minori eget exercitio.

D. Quinam est exercitationis modus?

Exerci-
tationis
modus.

C. Toties exercitatio requiritur, quoties corpus pascitur. Motus initio lentus, dein vehementior, ac tandem lenior fieri debet.

D. Quòdnam tempus exercitationi aptum?

Et tem-
pus.

C. Tempus exercitationi opportunum est, vbi perfecta fuerit cibi concoctio: Cùm autem exercitatio calorem natium suscitet, sine quo cibus perfectè concoqui nequit, ante pastum perpetuò adeunda est. Adde quòd multa exercitium absumat peritommata, quæ prius expellenda sunt, quàm cibus ingeratur. Post pastum verò, exercitatio valdè noxia, quòd agitatio cibum è ventriculo protrudat, antequàm fuerit concoctus; ynde

magnus in venis cruditatum prouentus, ex quo plurimi oriuntur morbi. Non est etiam exercitatio ineunda, nisi euacuatis prius excrementis, quæ vel in vesica, vel in inferiore aluo continentur. Verendum namque est, ne quid ex iis in habitum corporis, vi caloris, qui per exercitationem accenditur, rapiatur.

DE QUIETE.

D. Quando quies requiritur?

C. Vbi ex multa motione corpus est defatigatum.

In omni quippe corporis motu quies quæ salubris & quæ insalubris, (inquit Hippocrates aph. 48. lib. 2.) cum fatigari quispiam cœperit, quies confestim lassitudinis remedium est.

Id quod confirmat Ouidius 4. Epist.

Quod caret altera requie, durabile non est,

Hæc reparat vires, fessaque membra leuat.

Animo denique curis & studiis fessæ sua relaxatione ac remissione opus est, quam nisi concedas, non est cur diu vigorem eius conseruare possis, vt rectissimè idem dixerit Ouidius:

Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis,

Sed ut quies est salubris, ubi mediocris; ita insalubris, ubi immodica est. Corporis quippè & animi vigorem obtundit, cruditatèque parit. Ut enim per exercitium calor nativus augetur, adeoque ciborum concoctio fit expeditior; ita per otium extinguitur, & ciborum concoctio impeditur.

DE EXCREMENTIS.

D. *Quanam excrementa salubria?*

Quanam
excremen-
ta salu-
bria.

C. Excrementa singula, si modè ac tempestivè excernantur, salubria sunt. Si verò cohibeantur, vel moram in corpore diutius trahant, putrescunt, variæque morborum genera invehunt. Quamobrem ad tuendam valetudinem ea sunt artis præsidio maturè euacuanda.

D. *At euacuatio artificiosa sanis non convenit: quia, ex Hippocrate, sani, dum cathartici purgantur, citò exoluntur, Aphor. 2.*

An retē-
torum
excre-
mento-
rum e-
vacuatio
arte mo-
lienda.

C. Id intelligendum de valentibus, qui inculpato sunt corporis habitu, quique sibi viuunt, & ante cibum corpus & animum exercendi, & accuratam cibi benè concoquendi cu-

ram habent: sed qui legitimam victus rationem non seruant, vel propter intemperantiam, vel negotia, vel eorum, quæ fieri opus est, ignorantiam, quantumvis sani & valentes, à morbis tuti esse nequeunt, nisi alui per intervalla ducendæ prouidentia, & potentioris etiam aliquândo purgationis usu, & administrata tempestiuè Phlebotomia, & opportuna medicamentorum potione, quæ concoquendi, attenuandi, abstergendique vi polleant, vt libro de euchymia Galenus scriptum reliquit.

D. Quid ad euacuationis quantitatem definiendam animaduertendum?

C. Virium ratio perpetuò habenda. Euacuationis
quantitas
Quælibet enim euacuatio, si modum excesserit, periculosa, quia vires prostermit.

D. Quis euacuandi modus?

C. Vbi plurima est superuacanea Modus
materia, parcè & paulatim, non semel & vniuersim, vacuanda est; ne corpus nimio perè debilitetur. Sati⁹ est igitur Phlebotomiam sæpiùs administrare, quàm nimiam sanguinis copiam semel extrahere. Clementer item cor-

pus per epicrasim repurgare tutius, quàm vehementius illi catharticū semel exhibere. Sic sudorem, urinam & menses, iteratis potius medicamentis blandioribus, quàm vnico vehementiori, ciere praestat. Sic per interualla moderatus Veneris vsus ad secundam valetudinem tantò concupiscendus, quantò frequentior & immoderatio pertimescendus.

D. Quod tempus molienda vacuationi opportunius?

Et tempus.

C. Ex anni temporibus ver corpori per sanguinis missionem aut purgationem vacuando aptissimum, vt testatur Hippocrates. Aph. 47. lib. 9. quia tunc (inquit Philotheus) neque ingens viget aestus qui corporis dialysim faciat; neque frigus, quod humorum concretionem afferat, sed potius bona temperies. Autumno item Galenus humorum superuacueorum euacuationem molitur, ad morborum inde oriundorum praecauentionem. Excrementa, quae sua qualitate noxia, vt alui faeces, vrina, sudor, mucus & sputum, quotidie vacuanda sunt: seu quae quantitate

duntaxat peccant, vt fomen & menses, retinenda quidem sunt, quoúsque copiâ suâ moleſtare incipiunt.

A primo ſomno moderata Venus, ſiue ad tuendam valetudinem, ſiue ad propagandam prolem vtilior; quia ſeminis coctio tunc perfecta eſt, diſſipatorúmque ſpirituum iaſtura conſequenti ſomno refarcitur. Profluentibus menſibus concubitus prohibetur, ne fœtus gignatur elephanticus. Nec pleno, nec ieiuino ventriculo coitus confert. Venum tempus Veneri idoneum. *Ætas* item iuuenilis Veneri accommodata. Reliquæ enim ſemen aut prorsus nullum, aut infœcundum habent. Vbi menſes ſubſiſtunt, eo tempore ſunt arte prouocandi, quo fluere antea conſueuerant, vt ſit natura adiutrix. Nec grauidis mulieribus, nec nutricibus, nec iunioribus, nec vetulis vnquam procurandi ſunt.

DE ANIMI PATHEMATIS.

D. Ex omnibus rebus non naturalibus ad proſperam valetudinem pertinentibus, tria tantum ſuperius adſignata reſtant, quæ à Latinis animi perturbationes appellantur. Aperias velim quæ & quot ſunt, ac ſalu-

Animi
pathemata
quæ &
quot
sunt.

briane, an insalubria.

C. Pathemata sunt concitati & auerfi à recta ratione animi motus, qui corpus alterant, propter insignes naturæ caloris cum spiritu & sanguine intrò vel foras impulsiones. Quatuor sunt præcipua: duo ex objecti boni opinione orta, lætitia & cupiditas; ac totidem ex objecti mali apprehensione, tristitia & timor. Ira & verecundia adduntur, sed illa flagrans est vindictæ desiderium: itaque ad cupiditatem, ut hæc ad timorem referri potest.

quæ salubria &
quæ insalubria.

Cur exitialis
mœror
vehemens.

Priora duo Pathematôn genera, si moderata fuerint, salubria sunt, alioquin exitialia. Præ gaudio quippè immodico multos pusillanimes expirasse, variis authorum monumentis proditum est. At reliqua omnia sunt insalubria. Præ mœrore si quidem vehementi & repentino, mortui non pauci; quòd scilicet debilis animula, sub valido affectu oppressa, confestim extincta & suffocata sit; eò quòd vniuersus sanguis ad principium confluxerit, delatúsque fuerit. Hac ratione Plinius P. Rutilium
nuntiata

nuntiata fratris in consulatus petitione repulsa, illicò expirasse, memoriæ prodidit. Sic 16. die Augusti, anno 1619. apud Turones nobilis iuuenis Montelerius, Meussia cohortis subpræfectus, ob immensum mœrorem, in vico colloquens, repentè è viuis excessit. Dissecto cadauere sana viscera reperta sunt omnia, pericardium duntaxat non aqua modò, sed & copioso sanguine concreto, repletum animaduertimus, qui prægressa exercitatione vehementiori, ab ingenti mœstitia constricto corde, per alterutram eius auriculam illuc irrepserat, ac vitæ principium subitò suffocauerat, vnde repentina mors. Per timorem etiam spiritus & sanguis intrò & ad scatebram suam reducitur contrahiturque, quo fit vt partes algeant, corpusque palle scat, tremor incidat, vox interrumpatur, & vires denique omnes conuellantur. Contrà, in ira concitior est caloris motus, qui in

Recens
historia
nobilis
iuuenis
præ mœ-
rore ve-
hementi
& repen-
tino mor-
tuo

Ira.

Vere-
cundia.

redditur. In verecundia utrúmque patitur, imprimis quippè calor ad interna confugit, dein sese foras diffundit. Cùm igitur tanta sit perturbatio-
num animi vis, debent à Medico, quibuscúmque artibus possunt, arceri ac corrigi.



DISPUTATIO III.

DE REBUS PRÆTER
NATURAM, IN QUARVM
cognitione παθολογία versatur.

DOCTOR III.

HÆtenus de rebus naturalibus & non naturalibus, supersunt res præter naturam. Quanam sunt res præternaturam?

Quæ & quot
sint res
præter
naturā.

CANDIDATUS.

Quæ naturalem corporis humani constitutionem destruunt. Affectus à nobis appellantur, à Græcis διαθέσεις, nonnumquam πάθη: unde affectuum præter naturam doctrina παθολογία dicitur.

D. Quot sunt affectus præter naturam?

C. Tres, in orbus, causa, & symptoma. Siquidem ἀπασα διάθεσις σώματος ἐξισχυμένη τῷ καὶ φύσιν, ἢ τοι νόσημα ὅτιν, ἢ αἰτία νοσήματος, ἢ σύμπτωμα; omnis cor-

poris affectus à naturali constitutione
recedens, aut morbus est, aut morbi
causa, aut symptoma. Authore Gal.
cap. 1. l. de diff. sympt.

D. Quomodo inter se distinguuntur?

Qui dif.
tinguā-
tur.

C. ἡ τὴν ἐνέργειαν ἐμποδίζουσα διάθεσις,
ὀνομάζεται νόσος, εἴτι ἐπεταὶ τῇσδε, συμπτω-
μα. τὸ δ' ἐργαζόμενον αὐτῷ, αἴτιον. Affe-
ctus qui actionem impedit, morbus
appellatur; hunc si quid sequitur,
symptoma; quod illum facit, causa,
ait Gal. c. 1. l. 2. meth. med.

DE MORBIS.

D. Quid est morbus?

Quid
morbus.

C. ἡ νόσος, διάθεσις ὅτι παρὰ φύσιν, ὑπ'
ἥς ἐνέργεια βλάπτεται πρὸς τὸς. Morbus est
affectus præter naturam, à quo pri-
mùm actio læditur. Authore Gal. c. 1. l.
de sympt. diff.

D. Contrà sic disjuncto. Morbus omnis
non est διάθεσις: Ergo malè definitur à
Galeno morbus per διάθεσιν.

Obie-
ctio 1.

C. Nego antecedens.

D. Probo. Vt plurimum morbus est
ἕξις, habitus: Sed διάθεσις, dispositio, non
est ἕξις, habitus: imò opponitur habitui ab
Aristotele in Categ. quia habitus est
qualitas permanens, quæ à subiecto facile

amoveri non potest: dispositio verò, qualitas quæ facillimè amoveri potest.

C. *Vox διαθεσις, id est affectus, à Galeno sumitur, non specialiore illo significato, quo pro dispositione, id est præparatione ad habitum ab Aristotele usurpatur; sed generaliore, quod dispositionem & habitum comprehendit. Morbi enim quidam sunt ἀπιοὶ, qui facilè adsunt & absunt, alii ἐκπιοὶ, qui difficillimè depelluntur.* Solutio.

D. *Hoc insuper argumento morbum primò actionem non ledere demonstro: Facultas ab actione differt, tanquam causa ab effectu: Sed morbus facultatem primò ledit: Ergo actio primùm à morbo non leditur.* Obiectio 2.

C. *Id falsum in morbo organico, quia usus instrumenti impediri potest, nulla facultate læsa. Obstruatur vena aut nervus, impediatur distributio, integris facultatibus.* Responsio.

D. *Saltem in morbo similiari facultas priùs leditur, quàm functio.*

C. *Respondeo: Medicum æstimare omnia & diiudicare sensu. Atqui facultatem læsam esse non percipimus, nisi actione læsa.*

Obiectio

2.

D. Præterea, non omnem morbum actionem ledere sic probo: Vultus est morbus; Sed partis vulnerata functiones integre manent, quia sanguinem trahit, retinet, assimilât, denique abscissam carnis portionem instaurat: Ergo non omnis morbus actionem ledit.

Respon-
sio.

C. Respondeo hæc fieri à parte sana, quæ proximè subest vulnere.

D. Quotuplex est morbus?

Quotu-
plex sit
morbus

C. Triplex, similis, organicus, & communis.

D. Quinam est morbus similis?

Qui si-
milis.

C. Intemperies, quæ partis similis actionem primò ledit.

D. Quotuplex est intemperies?

Quotu-
plex sit
intem-
peries.

C. Intemperies est simplex, vel composita. Simplex est calida, frigida, humida, sicca: composita, calida & humida; calida & sicca; frigida & humida, frigida & sicca: eaque nuda, vel cum materia.

D. Quinam est morbus organicus?

Qui &
quotu-
plex sit
morbus
organi-
cus.

*C. Structuræ ametria, quæ instru-
menti usum primò pervertit.*

D. Quotuplex est?

C. Quadruplex, in conformatione, in magnitudine, in numero, & in situ.

D. Quinam est conformationis morbus?

C. Conformationis morbus est, Qui con-
forma-
tionis
morbis. cum partis figura naturalis deprauatur; aut meatus, vel cavitās, præter modum dilatatur, aut coarctatur, vel obstruitur, aut asperitas læuigatur, vel læuitas exasperatur.

D. Quinam magnitudinis morbus?

C. Magnitudinis morbus est, cum Qui ma-
gnitudi-
nis. pars aliqua supra convenientem naturæ modū increuit, aut infrā substitit.

D. Quinam numeri morbus?

C. Numeri morbus est, cum pars Qui na-
meri. aliqua deest, aut superabundat.

D. Quinam morbus in situ?

C. In situ morbus est, si pars à sua Qui
morbis
in situ. sede recesserit, ut omenti vel intestini in scrotum prolapsus.

D. Quinam est morbus communis?

C. Solutio continui, quæ utriusque Qui &
quatu-
plex sit
morbis
commu-
nis. partis functionibus peræquè incommodat.

D. Quotuplex est solutio continuitatis?

C. Quadruplex, vulnus, vlcus, fractura & luxatio, quæ in situ morbus etiam dici potest.

D. Cur tumorem præter naturam hic prætermittis?

Quid tu-
mor præ-
ter natu-
ram.

C. Quia tumor præter naturam, ex intemperie, mala conformatione & solutione continui, compositus perhibetur morbus, qui à Græcis *ἀμίσγµα*, à Latinis abscessus appellatur.

D. Quotuplex abscessus significatio?

Quotu-
plex abs-
cessus si-
gnifica-
tio.

C. Duplex, vna generalis, altera specialis.

Abscessus quippè nomen generaliter pro omni præter naturam tumore sumitur: specialiter verò pro *Phlegmone* ad suppurationem perducta: ac sæpè pro tumore in quo extranea quædam materia melli, vel pulti, aut seuo similis, Kysti conclusa deprehenditur, vnde meliceris, atheroma, vel steatoma, Græcè nuncupatur.

D. Vbinam hæ abscessus species sunt?

C. In externis partibus corporis.

D. Illic profectò fieri consueverunt. Sed nouam illarum sedem, ante hunc diem in Scholis Medicorum inauditam, non ita pridem animaduertimus.

Recens
historia
abscessus
multipli-
cis in ce-
rebro re-
pecti.

Illustrissimus Montis-perzati Marchio, vir acerrimo ingenio, subsistente jamdiu alui profluvio, cui ab ineunte adolescentia obnoxius fuerat, nec non & hamorrhoidibus quæ statim temporibus diu profluxerant,

ab annis 8. suppressis, quadragesimo nono
 etatis anno, mense Iunio, anno à Christo
 nato 1619. contumaci cephalæa primum
 apud Turones correptus est, cuius consecta-
 ria fuit $\pi\alpha\sigma\phi\epsilon\gamma\omicron\upsilon\mu$. Licet autem quam-
 plurima remedia ex arte præscripta sint à
 celeberrimis Turonensibus Medicis, DD.
 Falezco & Totoloco: irrita nihilominus
 fuerunt omnia. Quamobrem ad Pressi-
 gniacum longè ab aula Regia ductus
 est. *Vicium D.* Gallo facultatis Medicæ
Pictaviensis Decano, D. Mauresio Ducis
Mayennensis Medico, ac D. Forello
Castello-realdo Poliatro, ad illum curan-
dum accersitus sum. Sed quoniam perui-
cacior morbus, etiam valentioribus auxilijs
καὶ λόγῳ usurpatis cedere haud potuit, D.
laborans 13. die Augusti lethargicus tan-
dem obiit.

Dissecto cadavere nobis præsentibus sub
 anteriore ventriculo dextro, cerebri portio
 labefactata conspicua fuit, in qua abscessus
 varia ac multiplices formæ reperta sunt,
 quarum Kystes strobili magnitudinem
 æquabant, una steatomatis, altera athero-
 matis, reliquæ meliceridōni speciem refe-
 rebant.

Raram illam observationem à nobis

factam tibi obiter narrandam duxi. Ad
generalem abscissus doctrinā reuertamur.

Quotuplex est tumor præter naturam?

Quotu-
plex tu-
mor præ-
ter natu-
ram.

C. Quadruplex, phlegmone, ery-
sipelas, œdema, & scirrhus.

D. Quid est phlegmone?

Quid
phleg-
mone.

C. Est tumor præter naturam à
sanguine extra venas exiliente, par-
tem distendente, cum calore, rubore,
dolore, pulsu & renixu.

D. Quid est erysipelas?

Quid e-
rysipe-
las.

Est inflammatio valde ardens circa
cutim maximè consistens, nonnun-
quam & subiectæ carnis aliquid oc-
cupans, à bilioso feruidoque sangui-
ne, qui præ tenuitate insignem non
infert tumorem, sed longè latèque
hūc illūc dispergitur.

D. Quid est œdema?

Quid œ-
dema

C. Est tumor frigidus, laxis, mollis,
albicans, doloris expers, prementis
digiti vestigium relinquēs, ab humore
pituitoso ortus.

D. Quid est scirrhus?

Quid
scirrhus.

C. Est tumor durus & renitens,
doloris expers, cum sensu aut exiguo
aut procul nullo, ab humore melan-
cholico genitus.

D. Quid est vulnus?

C. Est solutio continuitatis recens *Quid vulnus.*
in partibus mollibus, ictu aliquo, aut
morsu vel casu, extrinsecus infligta.

D. Quid est vlcus?

C. Est solutio continuitatis in par- *Quid vl-*
tibus mollibus ab erosione excitata. *cus.*

D. Quid est fractura?

C. Est soluta ossis vnitas, à causa ex- *Quid*
terna contundente, collidente & *fractura.*
rumpente.

D. Quid est luxatio?

C. Est articuli è proprio situ in *Quid*
alienum prolapsus, cum motus vo- *luxatio.*
luntarij læsione.

DE CAUSIS MORBIFICIS.

D. Quid causa nomine hîc intelligitur?

C. Diathesis contra naturam, quæ *Quid &*
morbû facit, cuius doctrina αἰτιολογία *quatu-*
dicitur. *plex sit*

D. Causa morbi, ut plurimum substan- *causa*
tia est, ut humor quispiam, vel flatus, *morbifica*
aliûdque præter naturam, ut calculus. At *ca.*
diathesis est qualitas. Ergo morbi causa
male definitur per diathesim.

C. Vox diathesis, secus à Galeno
atque ab Aristotele usurpatur, nempe
pro omni eo, quod naturam corporis

temperaturā & structuram destruere,
ac actiones lādere potest, siue sub-
stantia sit, siue qualitas.

Quæ &
quotu-
plex sit
causa in-
terna.

D. Quotuplex est causa morbifica?

C. Duplex, interna & externa.

D. Quanam est causa interna?

C. Quæ intra corpus consistit.

D. Quotuplex est?

*C. Duplex, antecedens, & conti-
nens.*

D. Quanam est causa antecedens?

Quæ &
quotu-
plex cau-
sa ante-
cedens.

C. Quæ morbum fouet, αἰτιολογία.

Græcis dicta.

D. Quotuplex est?

C. Duplex, plethora & cacochymia.

Quid &
quotu-
plex ple-
thora.

D. Quid est plethora?

*C. Πληθὺς ἐστὶν ὅσῃ ἀπαίτων τῶν χυμῶν
ὁμοτίμως αὐξηθέντων, ἢ τῷ αἵματος μόνου
πλεονεξία.*

Plenitudo est humorum omnium
æqualiter adauctorum, siue san-
guinis solius redundantia. *Ex Gal. c.*
3. l. 2. de compos. medic. κτ' τόπαις.

D. Quotuplex est plethora?

Quæ
plethora
ad vires.

*C. Duplex, vna πρὸς τὴν δύναμιν, ad
vires; altera πρὸς ἀγλείαν, ad vasa; &
multis κτ' τὸ ἔγχυμα vocata.*

D. Quanam est plethora ad vires?

C. Ea est, in qua sanguinis, tametsi nec qualitate, nec copiâ, symmetriam excessit, vires tamen quauis alia ex causâ imbecilles premit.

D. *Quanam est plethora ad vasa?*

C. Quæ iam supra naturæ symmetriam est. Quæ ipsa aut lenis est, cùm venarum cavitatem solùm replet, ac proinde mediocritatem paulùm excedit; aut tensiva, cùm iam vasorum tunicas præ copia distendit ac propè diuellit.

D. *Quomodo differunt plethora ad vasa & ad vires?*

C. Cùm in plethora corpus nihilominus ingrauescit, & vires omnes æquales persistunt, sola est vasorum plenitudo. At si corpus, artusque ingrauescunt, & motus pigrior euadit, somnus grauis, profundus & interturbatus, & laborans per insomnia se grauitè premi, aut onus gestare, aut loco moueri non posse putat, virium est grauans plenitudo.

D. *Quanam sunt plethora signa?*

C. Antecedentia quidem sunt causæ sanguinis vbertatem procreantes, quales sunt corporis *expansio*, ætas

Quæ ad vasa.

Qui differant plethora ad vasa & ad vires.

Notæ plenitudinis antecedentes.

ἐπακμαστική, tempus vernum, regio temperata, liberalior victus euchymus, benèque temperatus, ac consueta sanguinis vacuatio suppressa: consequentia verò sunt accidentia, quæ copiosum in corpore sanguinem contineri, dominarique demonstrant; qualia sunt faciei color rubicundus, venarum tumor, tensio vasorum, tensiva lassitudo spontanea, plenior corporis moles, habitusve mediocriter carnosus, animi mores hilares & iucundi, morum simplicitas & stupiditas, capitis grauitas, somnus profundus, pulsus magnus, fortis & plenus, respiratio difficilior, sanguinis prompta reiectio, &c.

D. Quid cacochymia?

Quid & quotu-
plex ca-
cochy-
mia.

C. Κακοχυμία ἐστὶν ἢ ξανθοῦς ἢ μελάνος χολῆς, ἢ τῆς φλέγματος πλεονεξία.

Cacochymia est flauæ vel atræ bilis, vel pituitæ redundantia. *Auth. Gal. c. 6. l. 13. meth. med.* Vnde triplex cacochymia, biliosa, melancholica, & pituitosa.

D. Quibus signis dignoscitur cacochymia biliosa?

Signa ca-
cochy.

C. Dignoscitur primum ex causis

bilis copiam exaggerantibus; quales sunt temperies calida & sicca, ætas constans & florida, tempus æstivum, sicca cæli constitutio, regio calida & sicca, prægressa victus ratio calidior & siccior; deinde signis flauæ bilis immoderatus in corpore exuperâti, qualia sunt faciei color pallidus, flauus aut citrinus, vel nigellus, corporis habitus siccus, macer & gracilis, atque hirsutus, pilus flauus vel nigellus, venarum amplitudo, calor tactu acer & mordax, ~~et~~ sensus acuti, veloces & expediti, ingenium acre & solers, somnus levis & inquietus, vigiliæ perpetuæ, insomnia belli, furoris, ignis plena, pulsus velox, frequens & durus, oris amaror, inappetentia, sitis inexpleta, vomitio deiectioneque biliosa, aluus assidue sicca, vrina flaua, flammea & pauci sedimenti, &c.

D. Quibus signis dignoscitur cacochymia melancholica?

C. Dignoscitur primum ex causis melancholiam in corpore largiorem congerentibus, cuius generis sunt naturalis temperies frigida & sicca, cum lienis imbecillitate; vel calida quidem

miæ biliosæ
ante e-
dentia.
Conse-
quentia.

Signis
cacochy-
miæ
antece-
dentia.
Conse-
quentia.

à principio, *ἐν μετὰ τὴν ὥσπερ* autem frigida, ætas inclinans, tempus autumnale, victus crassior, vitæ conditio tristis: deinde ex signis melancholiæ in corpore dominantis, qualia sunt faciei color fuscus, aut nigricans, corporis habitus siccus & macilentus, aspectus fixus, horridus ac mæstus, metus & tristitia, somnus turbulentus, pulsus parvus, tardus, rarus & subdurus, &c.

D. Quibus signis dignoscitur cacochymia pituitosa?

Signa
cacochy-
miæ pi-
tuitosæ
antecedentia.
Conse-
quentia.

C. Dignoscitur primum à causis pituitæ prouentum facientibus, cuiusmodi sunt temperamentum frigidum & humidum, ætas senilis, hybernium tempus, constitutio cæli humida, victus plenior intèpestiuè sumptus, largior aquæ potus, vita sedentaria, somnus longior: tum ab indiciis pituitæ dominantis in corpore conspicuis; qualia sunt faciei color albicans, plumbeus aut liuidus, facies tumida, totius corporis moles ampla & obesa, venæ & arteriæ exiles & angustæ, pilus albus, animi mores, omnesque corporis motus tardi, sensus obtusi, mens hebes, somnus profundus at-

que grauis, aquarum, pluuiæ, niuis
aut submerſionis plena inſomnia, ca-
pitis grauitas, pulſus paruus, tardus,
rarus, mollis, tarda concoctio, ructus
acidus, &c.

D. Quanam eſt cauſa continens?

C. Eſt quæ proximè morbum facit. Quæ
cauſa
conti-
nens.
Græcis *ἑπικτητικὴ*, Latinis etiam con-
iuncta dicitur.

*D. At nullam eſſe coniunctam cauſam
ſicprobo :* *ἑπικτητικὸν αἴτιον ὅστιν τὸ παρόντος,* Oble-
tio 1.
παρεſτὶ καὶ τὸ νόσημα καὶ ἐξαρμολύει, λύται.
Cauſa continens eſt, qua præſente, adeſt
& morbus ; & quâ ſublata, ſoluitur,
Authore Gal. lib. defin. med. & libro
introductorio.

*Sed qualibet morbi cauſa ſublata, nequa-
quam tollitur morbus: Ergo nulla eſt cauſa
continens.*

C. Nego minorem.

*D. Probo minorem. Si ſublata morbi
cauſa qualibet, tolleretur morbus, nullis
opus eſſet remedijs adcurandum morbum:
Sed præter remedia, quæ cauſæ morbiſicæ
ſummuenda accommodata ſunt, alia re-
quiruntur ad ſummuendam morbum: vt
ad intemperiei curationē, præter *κενωτικά*,
quæ imprimis ſunt præſcribenda ad eua-*

cuationem humoris intemperiem commit-
tentis, requiruntur & ἀλλοιωτικά, ad in-
temperiem corrigendam; calefacientia vi-
delicet ad intemperiem frigidam, refri-
gerantia ad temperiem calidam. Ergo
sublata morbi causa, non tollitur morbus.

Solutio. C. Respondeo: Morbos, quibus con-
iuncta causa est, omnes, ea sublata,
solui; nec vlla deinceps curatione
propria egere: sed morbos, quorum
nulla est alia interior causa, quam
plethora & cacochymia, vt febres
essentiales, vtrâque sublata, propria
ad perficiendam curationem postulare
remedia.

Obiectio C. Sic argumentor. Si aliqua esset cau-
sa coniuncta, illa potissimum in phlegmone
esset conspicua. Nam humor inhaerens, im-
pactusque parti inflammatae, esset phleg-
mones coniuncta causa: sed humor inhae-
rens impactusque parti laboranti, non est
causa coniuncta: Ergo nulla est causa con-
iuncta in morbis.

C. Nego minorem.

D. Probo minorem. Morbus & morbi
causa differunt: Sed humor ille, ipsa est
phlegmone; Ergo non est coniuncta phleg-
mones causa.

C. Nego minorem.

D. Probo minorem. Cui convenit definitio, ei convenit & definitum: sed humoris parti inflammata impacto optimè quadrat phlegmones definitio: Ergo est phlegmone.

C. Nego minorem.

D. Probo minorem. Phlegmone est intemperies calida, partem, cui insidet, inflammans, tumefaciens atque distendens, ita ut illius functionem primò & per se ladat: Sed humor ille, qui parti inflammata impactus est, fernet, distendit, gravat, adeoque phlegmone est, functionemque primò & per se, nullòque alio intervenientu ladi.

C. Respondeo: Humorem parti inflammatae impactum, substantiam esse; phlegmonem verò accidens, ac proinde toto genere differre; tantum abest ut eadem utriusque sit definitio.

Respon-
sio.

D. Quanam est causa externa?

C. Quæ extrinsecus advenit, & vehementer corpus alterat; Græcis αἰτιὰ ταρακτική, Latinis præincipiens, & euidens, vulgò primitiva dicitur: Est autem totuplex euidens morbi causa, quotuplex est res non naturalis. Aër quippe morbum facit, ubi est intemperatus, aut impurus. Et alimen-

Quæ sit
causa ex-
terna.
Et quo-
tuplex.

tum, si excedat aut deficiat, aut si prauum sit, aut præposterè sumptum. Item motus & quies, necnon somnus & vigilia, cùm est immoderatio alteruter. Cùm etiã retinentur quæ excernenda sunt, & excernuntur quæ retinenda, morbum pariunt: quemadmodum & animi pathemata, si sint immoderata.

DE SYMPTOMATIS.

D. Quid est symptoma?

Quid symptoma, generaliter sumptum. Propriè dictum, cur epigenema appellatum. Vnde symptomatis nomen deducum.

C. Symptomatis nomen latè sumptum significat τὰ ὀπίωρ αἰ συμπίπιν τῷ ζῳῳ παρὰ φύσιν, quicquid animanti præter naturam accidit, *Authore Galeno cap. 2. lib. de sympt. diff.*

Sic pro omni præter naturam affectu generatim vsurpatur. Sed symptoma propriè definitur affectus contra naturam, qui morbum sequitur, vt umbra corpus. Hinc est, quod id ipsum nonnulli Græci Medici, non symptoma, sed ὀπίσθημα, hoc est succedens, appellare maluerunt: quam σύμπτωμα quoque nomen illi pulchrè quadrat, quod ei à verbo συμπίπτω, quod simul cado denotat, est impositum; nulla alia de causa,

quàm quòd simul cū morbo eueniat.

D. Ex te scire velim, an omne symptoma morbum sequatur?

C. Cū aliquod symptoma proximè ab alio symptomate, vel à causā prouenire possit, constat non omne symptoma morbum sequi, sed aliquod symptoma posse citra morbum oriri. Dantur enim actiones læsæ, vbi nullus adest morbus. Adeò vt præter symptoma morbi, quod proximè morbum, velut vmbra corpus, sequitur, alia duo symptomatum genera existant, symptoma causæ, & symptoma symptomatis.

An omne symptoma morbum sequatur.

Symptoma morbi.

D. Quid vocas symptoma causæ?

C. Symptoma causæ voco, cū actio lēditur tantū facultate frustrata ob errorem externum, vt dum ventriculo benè à natura constituto, nec vllō laborante morbo, chyli cōctio impeditur, ob nimiam cibi copiam, prauitatem aut similem causam: aut dum prauus sanguinis generatur, non ob hepatis, sed ob chyli, ex quo confici debet, vitium.

Symptoma causæ.

D. Quid symptoma symptomatis?

Symptoma symptomatis.

C. Quod aliud symptoma præ-

cedens proximè sequitur, nullo alio interueniente affectu præternaturam.

D. Quot sunt summa symptomatum genera?

Summa
sympto-
matum
genera.

C. Tria, ἐνεργιῶν βλάβαι, actionum læsiones, ἐκκρινόμενα καὶ ἀπεχόμενα τῷ ἰσθμῷ φύσιν ἐξιστάμενα, excreta & retenta, à naturæ modo recedentia, καὶ αἰσθητὰ τῷ σώματος διαδόσεις περὶ φύσιν, ac sensibiles corporis affectus præternaturam.

D. Quotuplex est actionum læsarum causa?

Quotu-
plex ac-
tionum
læsarum
causa.

C. Duplex à Galeno statuitur, c. 1. l. 3. de sympt. causis. τὰ μὲν ἐνὸς τοῦ σώματος ἰσθμοῦ ἀποτυχίας εἰσὶ, inquit, τὸ μὲν ἔπρεον ἢ δυνάμει αὐτῇ πεπονθεῖα, τὸ δὲ ἔπρεον ἔξωθεν πρὸς πλημμέλειαν. Duo prima sunt frustratæ actionis genera, alterum à facultate ipsa læsa ortum, alterum ob errorem externum. Actio siquidem læditur, dum facultas in agendo, sine suo frustratur ob morbum aliquem, vel ob delictum externum.

D. Quid per facultatem læsam hîc intelligendum?

Actio
lædi læsa

C. Læsa facultate actio lædi di-

citur, cùm organum ægrotat, ac præter naturam afficitur, partisque constitutio naturalis læditur, quæ facultatis proximum est instrumentum; & quâ vitiatâ, anima actiones suas exercere nequit.

facultate
quid.

D. Quid intelligendum per actionem læsam ob errorem externum?

C. Si organum omnibus modis sese rectè habeat, ac benè sit constitutum: nihilominus ob aliam, quæ extra partis constitutionem sit, causam, facultas in agendo frustratur: atque, ut finem suum assequi non possit, impediatur, actio lædi ob errorem externum dicitur.

Actio
lædi ob
errorem
externum
quid.

D. Quotplex est actionum læsarum differentia?

Læsarum actionum differentia ex integrarum numero colligenda. Vel enim animalium, vel vitalium, vel naturalium læsiones existunt.

Quot-
plex ac-
tionum
læsarum
differen-
tia.

D. Quot modis harum unaquaque læditur.

C. Omnis actio animalis, vitalis, & naturalis, bifariam læditur; quia, aut non fit, aut malè. Et malè rursus bifariam, aut diminutè, aut depravatè.

Quod
modis
actio læ-
datur.

Vnde triplex actionis cuiusque noxa.

D. *Quanā sunt functionū animalīū noxæ?*

Noxæ
functio-
num a-
nimalium
princi-
pum.

Sensiliū.

C. Principum functionum noxæ sunt, imaginationis, ratiocinationis & memoriz abolitio, debilitas & depravatio: inter quas *ἀνοία* amentia, *μωρία* fatuitas, & *τρεφεσ* *ῥῶν* delirium, insigniores habentur. Sensilium actionum communes noxæ sunt, *ἀσθησία* sensus priuatio, & *δυσσθησία* sentiendi difficultas, quæ omnem vitiosum sensum designat. *Ἀγρυπία* & veteranus somnus, interioris sensus noxæ perhibentur. Particulares verò exterioris cuiusque sensus noxæ sunt, in oculis quidem cecitas, visus hebetudo, & deprauata visio. In auribus surditas, auditus grauitas, & deprauata auditio. In cæteris, tametsi proprijs nominibus carcant, eadem nihilominus est proportio. Tactus in sua functione præter reliquos sensus, proprium symptoma possidet, dolorem. Motricum actionum læsiones sunt *ἀκίνησία* immobilitas, & *δυσκίνησία* difficultas motus: qui imbecillus quidem est, vel deprauatus; utpote tremulus, aut conuulsiuus aut palpitans.

Necnon

Necnon & ἀφωρία priuatio vocis,
 δυσφωρία vocis difficultas, & χαχοφωρία
 vox deprauata.

*D. Quenam sunt functionum vitalium
 noxæ?*

C. Inter vitalium functionum no- Noxæ
functio-
num vita-
lium.
 xas recensentur ἀσπυξία, abolitio pul-
 sus, & χαχοσπυξία, vitiosus pulsus. Nec-
 non & ἀπνυα, spirandi priuatio, ac
 δύσπνυα, spirandi difficultas.

*D. Quanam sunt functionum natura-
 lium noxæ?*

C. Appetentiæ læsiones sunt ἀσφε- Noxæ
functio-
num na-
turalium.
 ξία, abolita appetentia, appetentia
 canina, & appetitus deprauatus.

Concoctionis noxæ sunt ἀνψία cru-
 ditas, βραδυψία tarda concoctio, &
 δύσψία difficilis cōcoctio. Totidem
 & in retentione & in expulsionē con-
 sistunt, sed quibus propriæ appella-
 tiones non suppetunt. Sic actionem
 quamlibet trifariam lædi contingit;
 quòd vel minimè, vel remissè, vel de-
 prauatè edatur.

*D. Cur functionum noxas, excretorum
 & retentorum ametria sequitur?*

C. Quia excretorum ametria fit & Cur a-
ctionum
læsiōē,
excreto-
rum & re-
tentorum
ametria
sequatur.
 ἀποκριτικὸς ἀμείστος κυνέδων, expultrice

immodicè mota : & retentorum
ametria, ἡ καθεκτικὴς ἀμείσως ἐνεργείας,
retentrice immodicè agente.

D. Quid est excrementorum ἀμείσια?

Quid &
quoru-
plex ex-
cretio ēto-
rum ame-
tria.

C. Vitium quod excrementa à na-
turæ modo recedentia contraxerunt.

D. Quotiplex est?

C. Triplex, in substantia, in quanti-
tate, & in qualitate. Siquidem τὰ ἐκ-
κρινόμενα τῷ σώματι, ἢ κατεχόμενα παρὰ φύ-
σιν, ἢ τῶν ὑσίων ὁλκῶν, ἢ τῶν ποσότησιν, ἢ
τῶν ποιότησιν, ἐξιστάμενα τῷ κατὰ φύσιν, quæ ē
corpore excernuntur, vel in eo præter
naturam detinentur, vel tota substan-
tia, vel quantitate, vel qualitate, à na-
turæ modo recedunt, authore Gal. 6.
de sympt. diff.

D. Quid substantia vitium appellas?

Quid in-
telligitur
substan-
tiæ vitio.

C. Cùm quod excernitur toto ge-
nere præter naturam est, vt calculus,
vt arenula, vt lūbricus: aut cùm non id
quod excernitur, sed ipsa illius excre-
tio præter naturam existit, vt sanguis
ē naribus, ex auribus, ex ore, ē vesica,
vel aluo profluens.

D. Quid quantitatis vitium vocas?

Quid
quantita-
tis vitio.

C. Cùm iustus naturæ modus in ex-
cretis minimè teneretur, sed ea vel

abundantiùs vel parciùs profluunt.

D. Quòdnam est qualitatis vitium?

C. In excrementis vitium qualitatis inest, cum eorum color à naturæ modo recedit; vt si niger, liuidus aut viridis existat: aut cum graueolentia ferit: aut sapor amarus, falsus, acidusve subest: aut lentor vel acrimonia, & crassities vel tenuitas, aliàve qualitas, præter naturam inesse deprehenditur.

Quid
qualitatis
vitio.

D. Cur excretorum ametriæ, retentorum ametria adiungitur?

C. Quia excrementa non minùs à naturæ modo desciscunt, nec minus vitium contrahunt, vbi excernenda retinentur, quàm cum retinenda excernuntur.

Curretō-
rum
nedum
excreto-
rum ame-
tria dica-
tur.

D. Quanam symptomata ad retentorum ametriam referuntur?

C. Mensium & hæmorrhoidôn suppressio, alui astrictio, ἰσχυρία, δυσχρεία, σπασμεία, sudoris, aliorumque excrementorum retentiō, quorum salutatis euacuatio est.

Quæ ad
retento-
rum ame-
triã sym-
ptomata
pertineant.

D. Cur sensibus obuios corporis affectus præter naturam: post excrementorum ametriam collocas?

Cur sen-
sibiles
corporis
affectus
excremen-
torum
ametriam
sequatur.

C. Quia excrementitiorum ferè

humorum vitio contrahuntur.

D. Quot sunt symptomata ἐν ταῖς αἰσθητικαῖς διαθέσεσι συνιστάμενα, in sensibilibus corporis affectibus consistencia?

Quotuplicia
sunt sympto-
mata in sensi-
bilibus
corporis
affecti-
bus.

C. Tot esse perhibentur, quot sunt sensus, quibus percipi solent. Alia quippe ὁρατὰ, visibilia sunt, alia ἀκουστὰ, audibilia; alia ὀσφραγνὰ, odorabilia; alia γευστὰ, gustabilia; alia ἀπτά, tangibilia: quia visu, auditu, odoratu, gustu & tactu apprehenduntur.

D. Quanam sunt ὁρατὰ διαθέσεις πλεονεχούσιν, visibiles corporis affectiones præter naturam?

Qui sunt
visibiles
corporis
affectus.

C. Fædi colores, qui efflorescunt ex subiectorum humorum idea; qualis flauus est in ictero, pallidus in leucophlegmatia, niger in elephantiasi.

Necnon figura & moles, omnesque aspectabiles corporis qualitates mutatae.

D. Quæ ἀκουστὰ, auscultabiles?

Qui audi-
biles.

C. Soni præter naturam, quales sunt auriū tiinitus; pulmonum fauciumque stertores, dentium stridores, ventriculi rugitus, intestinorum crepitus. Necnō & clāgores & tremulæ voces.

D. Quæ ὀσφρητὰς, olfactiles?

C. Tetri odores, quos axillæ, aures, nares, os, pedes, aut corpus vniuersum expirat. Qui odorabiles.

D. Quæ γευστὰς, gustatiles?

C. Ingrati sapor, qui palatum & linguam inficiunt: cuiusmodi sunt oris amaror à bile flaua, sapor acidus à melancholia, & falsus à pituita. Qui gustatiles.

D. Quæ ἀπαι, tactiles?

C. Primæ qualitates, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas, & quæ ab his nascuntur, mollities, durities, scabrities, laxitas, rugositas, & alia id genus vitia, quæ in cute tactu percipiuntur. Qui tangibiles.

DE SIGNIS.

D. Hæc tria sunt summa symptomatum genera, unde potissimum sumuntur morborum signa, quorum doctrina ἐν μέρει dicitur. Quid est signum?

C. Quicquid sensibus nostris obuium, aliud quippiam latens & occultum comitatur, id illius est signum. Sic symptoma quia conspicuum, interioris occultique morbi è quo fluxit, expressum est signum: quemadmodum & causa euidens, ut Quid signum.

vitiosus cibus, morbi quem procreavit index est.

D. Quot sunt signorum genera?

Quotup-
plicia si-
gna.

C. Tria perhibentur summa signorum genera: salubria, quæ sanam: insalubria, quæ morbosam; & neutra, quæ neutram corporis constitutionem indicant.

D. Quotuplicia sunt signa insalubria?

Quotup-
plicia in-
salubria.
Quæ dia-
gnostica.
Quæ pro-
gnostica.
Quæ an-
amnisti-
ca.

C. Duplicia: diagnostica, quæ præsentem ostendunt morbi constitutionem; & prognostica, quæ futuram prævident.

A nonnullis adduntur Anamnistica, quæ præteritorum commemoratione præsentem & futurum morbi statum patefaciunt.

D. Quotuplicia sunt signa diagnostica?

Quotup-
plicia
diagnostica.

C. Triplicia, alia quippe partem affectam, alia causam, alia speciem morbi demonstrant: quæ si propria & inseparabilia sint, *παθολογικὰ* dicuntur; quemadmodum communia & separabilia accidentia *συμπεριπεπυγμένα*, affidencia nuncupantur.

Quæ ad
prognosi-
m ne-
cessaria.

D. Quæ ad Prognosim consequendam expendenda signa?

C. Præter Pathognomonica signa,

quæ morbi idæam detegunt, ἐπιγενόμενα superuenientia, quæ morbi magnitudinem iudicant; ac ἐμφανόμενα, insuper apparentia, quæ motum & morem ostendunt, accuratè consideranda.

D. *Cur pathognomonica, quæ specifica morbi diagnostica signa sunt, inter prognostica recensentur?*

C. Quia ex morbi specie præsagia sæpè ducuntur. Quidam enim morbi in sua specie insanabiles sunt, vt carcinoma: alii verò sanabiles, vt febris tertiana: nonnulli breues, vt ephemera: alii longi, vt hectica & quartana. Adde quòd pathognomonica symptomata valde aucta, morbi magnitudinem significant, ac proinde periculum portendant. Vt si punctorius lateris dolor ad iugulum aut hypochondrium vsque extendatur, ac magna fuerit spirandi difficultas, acutissima febris, vehemensque tussis, periculosa pleuritis iudicatur.

D. *Quid vocas epigenomena?*

C. Symptomata per causæ propagationem superuenientia, quæ morbum adauctum indicant, cuiusmodi

Cur pathognomonica inter prognostica recensentur.

Quid epigenomena.

sunt in pleuritide phrenitis, diarrhœa, orthopnœa, faciei & oculorum rubor, maculæ per thoracem erumpentes, dorsi & scapularum rubor.

D. Quid vocas epiphenomena?

Quid epi-
pheno-
mena.

C. Quæ præter signa pathognomonica & epigenomena, velut foras exeuntia, manifestò se produnt. Talia sunt coctionis & cruditatis signa, quæ crîsim bonam vel malam, citiùs vel tardiùs futuram arguunt.

D. Quid est crîsis?

Quid sit
crîsis.

C. Κρίσις ὅστις ὁ ἐξ ὑπὸ σποῦ ἐν νόσῳ μεταβολὴ πρὸς ὑγίαν ἢ θάνατον. Crîsis est repentina in morbo mutatio ad salutem, vel ad mortem, *auctore Galeno, c. 1. l. 1. de diebus decretoriis, cap. 7. l. 3. de Crîsibus. & com. in Aph. 13. & 23. sect. 2.* Quo fit ut crîsis bona sit vel mala, ac utrâque perfecta vel imperfecta.

D. Quid crîsis dictio denotat?

Quid crî-
sis dictio
denotat.

C. Crîsis nomen à Græco verbo κρίνω deductum est, quod iudico, certo, secerno, excerno & soluo, significat. Vnde κρίσις idem sonat quod iudiciû, sæpè pro naturæ cum morbo certamine sumitur, quâdòque pro noxiorum humorum secretionē & excretionē

vsurpatur, ac nōnumquam pro morbi solutione quouis modo facta. Sic ab *Hippocrate lib. de Præceptionibus, xpius*, definitur ἀπὸ λύσεως νόσου, solutio morbi.

D. Quæ crisis perfectè bona?

C. Quæ pepasmi signis die indice apparentibus præmonstrata, sine periculosis symptomatis die critico perficitur, cum manifesta excretionē, pro morbi specie & ægrotantis natura.

quæ crisis perfectè bona.

D. Quæ imperfectè bona?

C. Quæ non omninò morbum tollit, sed facit ut alacrius æger morbum ferat.

quæ imperfectè bona.

D. Quæ crisis perfectè mala?

C. Quæ mortem accelerat.

quæ perfectè mala.

D. Quæ imperfectè mala?

C. Quæ ægrum in deteriore statu præcipitat.

quæ imperfectè mala.

D. Quomodo signa critica diuiduntur?

C. Signorum criticorum alia crisin præcedunt, alia comitantur, alia consequuntur.

Criticorum signorum diuisio.

D. Quotuplicia sunt antecedentia crisis signa?

C. Quæ crisin præcedunt signa duorum sunt generum, quædam tempus & diem crisis indicant, alia spe-

quotuplicia sunt antecedentia crisis signa.

ciem crisis futuræ prænuntiant;

D. Quanam sunt signa tempus & diem crisis indicantia?

Signa tē-
pus & diē
crisis in-
dicantia.

C. Coctionis & cruditatis signa, quæ in excrementis apparent vniuersalibus, vrina & deiectione. Siquidem? an celerior vel tardior sperari debeat crisis, imò quo die iudicandus sit morbus, certò demonstrant. Nam si quarto die vrina appareat cocta, utpote si hypostasim habeat albam, læuem & æqualem, crisin septimo die futuram ostendit; quia ἡ τέταρτη ἐπίδηλος, septenorum quartus est index, ex Hippocratis dogmate.

D. Quid præterea indicant coctionis & cruditatis signa?

C. Vt cruditatis signa non modò diuturnitatem, sed mortem aliquando portendunt: sic coctionis signa non tantùm morbi breuitatem, sed etiam securitatem pollicentur.

D. Estne id perpetuum?

Quid ad
perfectā
coctionē
requira-
tur.

C. Maximè, modò coctio continua sit & constans. Optima quippe est vrina (inquit Hippocrates Prognosi 26. sect. 2.) cùm sedimentum fuerit album, læue & æquale per totum

tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Quod si intermiserit, & aliquando quidem pura. i. cruda meiatur, nonnunquam subsideat quid album ac læue, diuturnior fit morbus, & minus securus. Autoritas ratione confirmatur. Continuitas coctionis, naturæ validam vim, & caloris coquentis imperium denotat: at si interrupta sit coctio, ut manè coctionis signa appareant, vesperi delitescant, nunc crudæ, nunc coctæ fundantur vrinæ, nulla ex ea coctione crisis securitas sperari potest; quia pari contentione certant natura & morbus, vnde manet victoria anceps: inchoat coctionem natura, sed debilior perficere nequit; aut fortasse humoris efferi tanta est malignitas, ut coctionem admittere non possit. Hinc *Συμπτωια*.

D. Nonne sunt & alia tempus & diem crises indicantia signa?

Pieter coctionis & cruditatis notas, observandus morbi motus, ad crisis tempus, diemque præfagiendum. Qui enim celeriter & vehementer mouentur, ij celeriter iudicantur. Extrême peracuti primo quaterna-

Quid præter coctionis tempus crisis indicet.

rio, peracuti primo septenario, acuti simpliciter decimo quarto die, acuti *ἐν μεταπώσεως* ex decidentia, ad quadragesimum usque diem prorogari possunt.

Motus insuper morbi indicat paritatem, an impari die crisis contingere debeat. Nam cum in vigore tantum & exacerbatione morbi fiant crises, nunquam in principio, nec in declinatione: si paribus diebus exacerbetur morbus, pari die speranda erit crisis; si imparibus, impari, *ex Hipp. sect. 3. l. 3. Epid.*

D. Quanam instantis crisis signa sunt?

Signa
quæ iam
instantem
crisim in-
dicant.

C. Crisim proximè solent præcedere ingens capitis dolor, iactatio, anxietas, sitis inexhausta, pulsus inæqualitas, spirandi difficultas, & alia id genus, quæ ἡ *δυσφορία* nomine designavit Hippocrates, *aph. 13. sect. 2. Οκόντισιν ἢ χρίσις γίνεται, κατέρισιν ἢ νύξ δυσφορίας αὐτὴ τὴν προέξουσαν.* Quib⁹ crisis fit, iis nox gravis ante accessionem.

D. A signis quæ tempus, ad ea quæ speciem crisis prænuntiant, transeundum. Declara imprimis quodplex sit crisis?

C. Duplex omnino crisis species, excretio & abscessus. Omnis quippe humoris ab una parte in aliam translatio, fit κατ' ἐξουὴν, per effluxum: κατ' ἀπόθεσιν, per decubitum.

Signa
que crisis
speciem
pronun-
tiant.

D. *Quanam sunt excretionis differentia?*

C. Hæmorrhagia, sudor, diarrhœa, vomitus, & σπύρρα, urinæ profluuiū.

D. *Quotuplicia sunt crisis per excretionem, vel abscessum futura, signa?*

C. Duplicia. Nonnulla quippè vniuersalia sunt, alia cuiusque speciei propria.

D. *Vnde vniuersalia petuntur?*

C. Ex morbi motu, parte affecta & ægrotantis ætate.

D. *Qualia ex morbi motu critica præsigna?*

C. Acuti morbi per excretionem, diuturni per abscessum ferè iudicantur; quia acutorum natura in celeri & vehementi motu consistit, vt diuturnorum in tardo.

Vt vni-
uersalia
petantur
ex morbi
motu.

D. *At diuturni morbi sæpè excretionē indicantur. Sic 3. Epid. Nicodemus 24. die per urinas, Anaxion 34. per sudores, ac Cleonactides 80. perfectè indicatus est.*

C. Respondeo chronicos morbos per excretionem nonnunquam solui, ratione acutarum exacerbationum quæ superueniunt.

D. *Qualia ex affecta parte critica prasagia?*

Ex affecta
parte.

C. Si hepatis conuexa, inflammatione obsideantur, expectanda erit crisis, aut per hæmorrhagiam è nare dextra καὶ ἰκτὴρ, aut per sudorem, aut urinæ profluuium: si caua afficiantur, alui fluxu aut vomitu potius soluetur morbus. Capitis inflammationes prorupto è naribus sanguine sæpè iudicantur. Eò enim desinunt extrema vasorum. Mesenterij verò & ventriculi phlegmones, vomitus & alui fluxus superuenientes sanant.

D. *Qualia ex agrotantis ætate critica prasagia?*

Ex agrotantis
ætate.

C. Iuuenibus febre ardente correptis hæmorrhagiæ vt plurimum contingunt, senibus verò alui profluvia, teste Hippocrate lib. 1. Epid. Rationem adfert Galenus, quia iuuenum humores biliosi sunt, tenuissimi & acerrimi, propterea que αἰμαρροῦνται; senū verò pi-

tuitosi, ac *κατάρπονται*.

D. Hæc sunt uniuersalia crisis futura signa: nunc ad ea quæ cuiusque speciei propria sint, veniamus. Recense imprimis hæmorrhagia critica iamiam futura signa?

C. Si acutè febricitanti rubore suffundatur facies, ingens capitis collique dolor adsit, temporum arteriæ vehementiùs pulsent, hebescat visus, ac marmaruges ante oculos obuersionem, hypochondrium distendatur cum spirandi difficultate, profluuium sanguinis è naribus expectare oportet.

Signa futuræ hæmorrhagiæ.

D. Cuiusque signi rationem expone?

C. Dum in procinctu est hæmorrhagia, rubet facies: quia transfertur sanguis ab inferioribus partibus ad superiores, qui mox per nares exitum sibi parat. Dolent caput & collum, ob eandem humoris morbifici translationem, qui membranosas partes exquisitissimi sensus diuellens distendensque, doloris sensum parit. Pulsant arteriæ extraordinario motu, propter earum compressionem, quæ à particulari venarum repletionem fit. Caligant oculi, quia copiosus & cras-

Singulorum signorum causæ.

sus ad superiora elatus spiritus, meatus obstruit; aded vt spiritui animali prohibeatur aditus. Minutula quædam corpuscula maculis marmorum similia in aëre apparent, licet intra corneam sint & crystalloïdem, ex humoris sursum trāslati vaporibus. Distenditur hypochondrium, id est intumescit hepar, ob sanguinis motum, qui in suo fonte; & venarum radicibus, moueri incipit. Difficilis redditur spiratio, quia dum ad superiores partes viam affectat sanguis, diaphragma princeps liberæ respirationis organum premit.

D. Sūntne & alia instantis hæmorrhagiæ signa?

Alia hæmorrhagiæ signa.

G. Præter ea quæ recensentur ab Hippocrate, addit Galenus aurium tinnitum; narium titillationem, ac mendacia rubrarum rerum visa, imaginationi obuersantia. Sic libro de Prænotione, iuueni cuidam acutè febricitanti, subito è lecto exilienti, prædixit erupturum è naribus sanguinem; quod rogatus qua de causa exiliret, cum nihil adesset metueundum, responderit rubrum serpentem ex te-

gula irrepentem se vidisse , ideóque aufugisse, ne aberrans super ipsum delaberetur.

D. Quanam sudoris critici praesagia?

C. Sudoris critici iamiam futuri signa duo sunt apud Hippocratem, urinae suppressio & rigor.

Sudoris
critici si-
gna.

D. Cur urina suppressio, sudoris est praenuntia?

C. quia urinae & sudoris eadem est materia, serum nempe eorum, qui in venis continentur, humorum. Unde facta serosi humoris in uniuersum corporis habitum translatione, supprimitur urina.

Signorū
causae.

D. Quae rigoris causa?

C. Serii acrimonia panniculum nervosum (vulgus carnosum vocat impropiè) exquisitissimi sensus velligans.

D. Sūntne & alia sudoris futuri signa?

C. Recentiores addunt pulsus mollem, fluctuantem, & undosum, praesentionem calidi vaporis è corpore exhalantis, ac insomnium calentis balnei.

Alia sudoris
futuri signa.

D. Quenā sunt diarrhoea instantis signa?

Signa
diarrhoeæ
instantis.

C. Ructus, rugitus, crepitus & inflatio ventris, aluinam deiectionem portendunt, autore Hippocrate. Hæc quippe noxium humorem à toto corpore in mesenterij venas, & ab his in intestina translatum arguunt. Urina insuper tenuis & alba apparet, translata ad aluum copiosissima bile. Quandoque etiam supprimitur.

D. *Quenam sunt imminentis vomitus signa?*

Signa im-
minentis
vomitus.

C. Hæc sunt ab Hippocrate prodita, ἄσθ, iactatio cum nausea: καψιδις, morsus stomachi, à pravo humore in ventriculo stabulante: πύαξις, sputatio frequens, exudante à ventriculo in os humore; ac τὸ ὀφθαλμικόν, tenebricosa visio, ob humidum vaporem ab impuro ventriculo exhalantem.

Alij addunt linguæ amarorem, ac labri inferioris palpitationem.

D. *Quenam sunt perirrhia futura signa?*

Signa
perir-
rhia.

C. Nulla tradidit Hippocrates, sed ex aliarum excretionum priuatione colligenda esse monet Galenus. Si enim hæmorrhagiæ, sudoris, aluinæ deiectionis, ac vomitus nulla signa

eluceant, præcesserint autem & co-
 ctionis & perturbationis criticæ si-
 gna; rationi consentaneum est, per
 vrinæ profluvium, morbum iudica-
 tum iri: maximè verò si gravitas in
 hypochondrio, & ardor in extremo
 pudendi, persentiantur, ac toto mor-
 bi decursu copiosas & crassas eger-
 minxerit vrinas.

*D. Excretionis cuiusque signa enar-
 rasti, tunc quibus notis abscessus futurus
 indicari possit, aperi?*

C. In longis morbis ob humores Signa
crisis per
abscessum
futuræ. crassos, quos per excretionem foras
 trudere natura nequit, expectandus
 abscessus, hyemali potissimum tem-
 pore; Item si excretio inchoata qui-
 dem fuerit, sed non omnino perfecta;
 ac si vrinæ tenues & crudæ toto mor-
 bi decursu cum salutaribus signis ap-
 paruerint.

*D. Hactenus & quando & quæ sit fu-
 tura crisis aperuisti, facta deinceps criseos
 & bona & mala notas persequere?*

C. An facta crisis bona vel mala sit;
 ex signis & comitantibus & conse-
 quentibus dignoscimus.

D. Quid vocas signa comitantia?

Signa
crisim co-
mitantia.

C. Quæ vnà cum ipsa crisi appa-
rent, adeò vt excretio aut abscessus
contingens, sitne boni vel mali omni-
nis, quasi digito indicent.

D. *Quanam bona excretionis condi-
tiones?*

Signa
laudabilis
excretio-
nis.

C. In salutari excretionem; quatuor
requiruntur, qualitas conueniēs, quā-
titas sufficiens, tempus opportunum,
& excernendi modus naturæ fami-
liaris.

D. *Quanam qualitas requiritur?*

C. Qualitas laudabilis erit, si &
peccans & coctus humor excernatur.
Succi verò minimè noxi euacuatio
noxia. Humoris etiam crudi excretio
praua.

D. *Quæ quantitas?*

C. Moderata esse debet. Vt enim
immodica excretio periculosa, quia
πῶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, omne ni-
mum est naturæ inimicum, ex Hip-
pocrate: sic πῶν κρίσεων ἔστιν σμικρὸν εἶναι
παρασκή, eorum quæ critica sunt nihil
conuenit esse paucum, ex Galeno:
quia quod paucum excernitur, copio-
siores vel malignos humores à natura
regi non posse, aut summam naturæ

Fatiscientis exolutionem denuntiat. Quocirca damnantur ab Hippocrate sudatiunculae, substillae sanguinis, & exigui vomitus. Totus quippe humor noxius, non eius portiuncula vacuari debet; quia quae relinquuntur in morbis à crisi, recidivas facere consueverunt, ut docet Hippocrates.

D. Quod tempus?

C. Dies criticus. Quaecumque enim excernuntur diebus non criticis suspecta sunt.

D. Qui excernendi modus?

C. Excretio fieri confertim debet, non sensim, & διὰ τῶν συμφορῶντων ᾠείων, per loca conferentia, non per nobiliores partes, nec ἀνάπαλιν, è diuerso: sed καὶ ἴξιν, καὶ καὶ ἐνθυωείαν, secundum rectitudinem, è directo, & per patentes ductus.

Hinc liene affecto, sanguinem è dextra nare fluere; hepate verò, è sinistra, malum. Arguit enim excretio, quae fit è directo, validam naturae contentionem; ut quae è diuerso fit, humoris malignitatem, obsessae partis imbecillitatem, meatuumque obstructionem.

Quanam legitimi abscessus conditiones?

Signa le-
gitimi
abscessus.

C. In legitimo abscessu tria spectanda monet Hippocrates *lib. 6. Epid.* *ὅππῃ, καὶ ὅθεν, καὶ διατὶ*, quò, vnde, & propter quid, Quò, partem denotat in quam decumbit, quæ debet esse inferior, ignobilior, remota ab affecta parte, totius materiæ morbificæ capax, alioqui periculum refluxus. Vnde, significat à qua parte oriatur, dextrane, an sinistra, quia decubitus κατὰ τὸ ἱκίον, secundum rectitudinē fieri debet. Propter quid causam designat, ob quam oboritur abscessus, id est, num fiat cocto à natura morbo, aut eadem irritata. Nam si crudo morbo superueniat, prauus erit.

D. Supersunt consequentia signa, ex quibus securam aut infidam crisin percipimus. Vnde sumuntur?

Signa crisin
consequētia.

C. Ex qualitatē corporis, actionibus & excrementis.

B. Quid in qualitate spectandum?

Vt sumantur
ex qualitate
corporis.

C. Qualitas corporis cernitur in colore & mole. Si benè colorata sit facies, salutaris fuit excretio; sin color liuidus, citrinus, niger, symptomatīca. Si repentē detumescat facies, quæ

prius intumuerat, perfecta est crisis; si turgidula remaneat, periculum est relapsus.

D. Quid in actionibus?

C. An actiones naturales, vitales & Ex actionibus; animales, benè vel malè edantur. Si benè ingerat, digerat, egerat, fida est crisis. Sin nausea, cibi fastidium, ructus acidi aut nidorulenti, sitis, hypochondriorum tensio remanserint, metuendus est relapsus.

Si æqualis & remissior sit pulsus, respiratio facilis, calorque temperatus, tuta est crisis: si verò frequens sit pulsus, calorque tactum feriat, remansit *ἑμπύρευμα*, quod superesse cuiusdam visceris intemperiem arguit, à qua nova humoris generatio fieri potest, vnde relapsus periculum subest.

Si mens tranquilla, sensus integerrimi, somnus placidus, nec turbulentus, ac bellè decumbat in alterutrum latus, bona fuit crisis; sin minùs, mala.

D. Quid in excrementis?

C. Si deiectiones sint coloratæ & Et excrementis. figuratæ, ac urinæ sanorū similes, salutare crisin testantur: Si tenues appareant, aut rubræ, relapsum minantur.

D. Antecedentia, comitantia & consequentia crisis signa patefecisti, nunc dierum criticorum differentias ex te audire cupio.

Dierum
criticorum
differen-
tia.

C. Dierum criticorum tres statuuntur differentiae, alii sunt verè critici, principes dicuntur, alii indices: alii intercalares, qui inter principes, & indices intercidunt.

D. Quinam sunt dies verè critici?

Dies cri-
tici prin-
cipes, qui
& quot
sint,

C. Qui perfectè, fidè, manifestè & sine periculo iudicant.

D. Quot sunt dies critici principes?

C. Tres, septimus, decimus quartus, & vigesimus. Septimus peracutorum morborum terminus est: decimus quartus acutorum simpliciter: vigesimus verò acutorum, qui tardi fuerunt ab initio, aut quorum continuatum non fuit acumen.

D. Quanam est dierum criticorum causa?

quæ die-
rum cri-
ticorum
causa sit
materialis,
efficiens.
vniuersalis,

C. Dierum criticorum causa duplex, vna materialis, efficiens altera. Materialis, humor est noxius, qualitate, aut quantitate peccans. Efficiens verò duplex, vna vniuersalis & remotissima; cælum, cuius vires ferè om-

nes

nes Luna inferior excipit, easque nobis communicat: altera particularis & proxima, nempe natura: quæ licet ἀταίστευτος, καὶ μαθητός, consilii & rationis sit expers; motus tamen edit certos & constanti ordine definitos. Itaque ad perficiendas crises septimum, decimumquartum, ac vigesimum diem elegit.

particularis.

D. Sed cur vigesimus dies est potius criticus, quàm vigesimus primus, cum septenarii omnes perfectè sint critici?

C. Respondeo: vigesimum diem finem esse tertiæ septimanæ; quia ex tribus septimanis sola prima integra numeranda est, secunda cum tertia copulatur: adeò ut quartus decimus dies, finis sit secundæ, & principiū tertiæ.

Cur vigesimus dies sit potius criticus quàm vigesimus primus.

D. Cur priore septenario posterior uterque copulatus uno die brevior?

C. Id duabus ex causis accidit: una quòd naturalis motus, cuius generis est criticus, in principio tardior, in fine celerior existat: altera, quòd materia morifica superiori septenario attenuata & mitificata consequentibus, longè faciliùs ac citiùs à natura extrudatur.

D. Nonne vigesimus primus aliquando criticus?

Cur vi-
gesimus
primus
aliquando
criticus.

C. Maximè. Cùm enim crassior ac contumacior morbi materia tardiùs à natura deuincitur, ad vigesimum primum diem prorogatur crisis. Tum singuli septenarii sunt æquales. Vnde *Hippocrates primo Epid.* circuituum, inquit, qui iudicantur diebus imparibus primus est tertius, quintus, septimus, nonus, vndecimus, decimus quartus, decimus septimus, vigesimus primus. *Et Aphor. 36. sect. 4.* Sudores febricitantibus boni, qui manare cœperint die tertio, quinto, septimo, nono, vndecimo, decimoquarto, decimo septimo, vigesimo primo. Quocirca licet vigesimo principatum decernendi tribuamus, non tamen vigesimum primum à decretoriis diebus omninò excludimus.

D. Quinam sunt dies indices?

Dies in-
dices qui
& quot
sint.

C. Qui crisin septenario die futuram indicant.

D. Quot enumerantur?

C. Tres, quartus, vndecimus ac decimus septimus, quibus iudicandi ius non denegatur; decernunt enim ali-

quando, sed imperfectiùs; propterea
ἐπίσται, indices potiùs dicuntur, quàm
iudices: *θεωρεταί*, contemplabiles vo-
cantur etiam ab Hippocrate, quòd co-
rum observatio ad criseōn præsenti-
tionem Medico sit necessaria. Quar-
tus quippe septimi est index, vndeci-
mus quarti decimi, ac decimus septi-
mus vigesimi.

D. Estne id perpetuum?

C. Maximè, si nihil externum, aut
internum occurrat, quod ordinarium
naturæ motum interturbet: vt si neque
Medicus quid peccauerit, neque
eger, neque ministrorum quisquam,
neque error vllus extrinsecus admis-
sus sit, nec quicquam intrinsecus spō-
ne superuenerit, quod designauit Hip-
ocrates in Coacis prænotationibus,
requiens, *ἢ λοιπῶν καὶ λόγον ἔχόντων*, si
cætera conuenienter sint constituta.
Ieri enim potest ob externam, aut in-
ternam aliquam causam, vt quartus
optimus semper non indicet, nec
vndecimus quartum decimum, nec
decimus septimus vigesimum.

D. Quinam sunt dies intercedentes?

C. Qui naturam pruritant, & ante

Dies in-
tercala-
res, qui &
quot
sint.

tempus excernere cogunt, quales in prima septimana tertius & quintus, in secunda nonus & decimus tertius, in tertia decimus nonus. Hic ea prerogatiua decernunt, quia impares sunt, ac acuti morbi; cum imparibus exacerbentur diebus, imparibus iudicari solent. Sed quæ diebus intercalaribus contingunt crises, ferè omnes imperfectæ sunt, atque periculosæ: quia maligna humoris morbifici qualitate iritatur adeò natura, vt cruda & cocta simul excernat, & cum noxiis laudabiles etiam humores expellat.

D. Quomodo reliqui dies appellantur?

Cur reliqui dies, vacui appellantur.

C. Interiecti dies, vt sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextus decimus, octauus decimus, vacui appellantur, quòd nec iudicent, nec inducant, nec prouocent. Licet enim excretionibus illis diebus nonnunquam contingant, omnes tamen à morbi malignitate fiunt, non à natura auvincente, aut iritata: ac proinde symptomatice sunt, non criticæ.

Sextus dies omnium est pessimus crudelis, infidus, septimo omnino contrarius. Quocirca hic Regi clementi

ſimo aſſimilatur; quia multos ab interitu vindicat : ille verò Tyrannus à Galeno nuncupatur; quia ægros ferè omnes ad exitium præcipitat, aut ſaltem in magnum vitæ diſcrimen adducit.

Vacui dies à Doctis quibuſdam Medicinales dicuntur, quòd illis cathartica tutò exhibere poſſit Medicus; cùm diebus criticis non audeat, ne actionem naturæ perturbet.

Cur dies
vacui
Medicinales di-
ci.

DE PULSIBVS.

D. Quoniam omnia, quæ hætenùs reſenſiſti, morborum ſigna, cùm diagnòſtica, tum Prognòſtica, à pulſibus & urinis potiſſimum ducuntur, unde Medicus ad agrum curandum accerſitus, priuſquàm curationem aggrediatur, pulſum protinùs contrectat, mox urinam diligenter inſpicit, ad morbi diagnòſim & prognòſim conſequendam; animus mihi eſt explorare, num artis Sphygmica peritus, & in Ou-roſcopia verſatus ſis. Imprimis ex te qua-ro quid ſit *σφυμὸς*, Pulſus?

Mens Au-
thoris.

C. Pulſus eſt motus cordis & artèriarum, ex diaſtole, ſyſtole, & intermedia quiete, conſtans à facultate vitali, ad natium calorem moderan-

Quid Pul-
ſus?

Diaſtole.

dum editus. Diaſtole eſt, quâ arteria ſe dilatat; vt aëre tracto inſitum calorem temperet, ac ſpiritui pabulum ſubmi-

Syltole.

niſtret. Syltole, qua in ſe ipſâ confidet, ſeque ſummittit; vt ſpiritus fuliginem exuſtione comparatam expellat. Inter utrâque media quies intercedit, eâque gemina: vna ſupera, quæ diaſtolen: altera infera, quæ ſyltolen terminat.

D. Quot ſimplices ſunt Pulſuum differentia?

C. Duplices. Aliæ enim abſolutæ, aliæ comparatæ, quæ vulgò reſpectivæ vocantur.

D. Quot ſunt abſoluta pulſuum differentia?

Abſolutæ
Pulſuum
differentia.

C. Quoniam Pulſus, motus localis eſt, ad quem quinque requiruntur, mouens, mobile, ſpatium in quo fit motus, & tempus tam motus, quàm quietis; quinae ſtatuuntur abſolutæ Pulſuum differentia.

7.
à mouen-
te:

A Pulſifica facultate, valida vel languida, Pulſus dicitur *σφοδρὸς*; vehemens; aut *ἀμυδρὸς*, imbecillus, languidusve; vel *σικκινγρος*, moderatus.

vnde
Pulſus
vehemēs,

Vehemēs, cùm vehementer tactum

ferit. Imbecillus, cum remissè. Moderatus, cum mediocriter.

Imbecillus, Moderatus.

Ab arteriæ qualitate, Pulsus dicitur σκληρὸς, durus: vel μαλακὸς, mollis: aut σύμμετρος, mediocris.

2.
à mobili.
vnde
Pulsus
durus,
Mollis.
Medio-
cris.

Durus, cum siccior, & in modum corii rigidior, arteria occurrit, ut in febre Hectica; aut valde comprimitur, ut in pleuritide. Mollis, quando arteria tenera, laxaque percipitur. Mediocris, qui inter durum, mollè, que medi-
us est.

A spatio distentę arterię, seu ex diastoles quantitate, pulsus dicitur μέγας magnus, vel μικρὸς parvus, aut σύμμετρος moderatus.

3.
A spatio
in quo fit
motus.

Magnus pulsus, quando arteria in omnes dimensiones distenditur. Sic magnus pulsus, longus, latus & altus simul est. Parvus verò brevis, strictus & humilis. Mediocris, amborum me-
dius.

vnde
Pulsus
magnus,
Parvus,
Medio-
cris.

A tempore pulsationis, Pulsus dicitur ταχὺς, velox siue celer: vel βραδὺς, tardus: aut σύμμετρος, moderatus.

4.
A tempo-
re motus.
à quo
Pulsus
velox,
tardus,
modera-
tus.

Velox qui brevi tempore arteriam distendit. Tardus qui tardo. Moderatus qui mediocri.

A tempore
quietis.
à quo.

A tempore verò quietis, quæ est utriusque motui contrario interiecta, pulsus dicitur *πυκνός*, frequens seu creber: vel *ἀραιός*, rarus: aut *συνμετρός*, mediocris.

Pulsus
frequens,

rarus,

mediocris.

Frequens, qui sæpè & breui quietis interuallo arteriam distendit, tactumque ferit. Rarus qui ex longioribus interuallis. Mediocris qui inter frequentem & rarum medius.

D. Absoluta Pulsuum differentia, simplicisne reperiuntur, an composita?

Vt simplices
pulsus
sæpius
coniuncti
percipiuntur.

C. Simples pulsus per se considerati, sæpius coniuncti percipiuntur. Plerumque enim accidit, ut pulsus vehemens, mollis, magnus & velox simul sit: Pulsusque imbecillus, parvus, creber, & nonnumquam durus reperiatur. Sed qui simplices differentias probè perspectas habet, facile etiam compositas inueniet.

D. Hactenus absolutas pulsuum differentias recensuisti, comparata supersunt, quæ & quot sint expone?

Comparata
Pulsuum
differentia.

C. Præter absolutas Pulsuum differentias, tres sunt comparatæ, quæ proportionem, æqualitatem & ordinem respiciunt.

Pulsus respectu proportionis, quæ A pro-
portione,
vnde pul-
sus.
ῥυθμος.
ἄρρυθμος.
ῥυθμὸς, i. concentus Græcis dicitur, alius est εὐρυθμος consonus, qui rhythmum servat proprium: alius ἄρρυθμος absonus, dissonusve, id est παράρρυθμος: vel ἐτερόρρυθμος, qui alienum rhythmum mutuatur: vel ἔκρυθμος, qui nullum rhythmum refert.

Pulsus æqualitatis respectu, alius est Ab æqua-
litate, vnde Pulsus.
ἰσάματος æqualis; alius ἀνώματος, inæqualis.

Æqualis, qui sui semper similis, parrem retinet in vehementia, magnitudine, celeritate, ac cæteris differentiis constantiam. Æqualis.

Inæqualis, qui æqualitatem non servat in vehementia, magnitudine, celeritate, alijsque differentiis. Inæqualis.

Ordinis respectu, Pulsus alius est Ab ordi-
ne, vnde Pulsus
ordinatus, inor-
dinatus.
τεταμένος ordinatus, alius ἀτακτος inordinatus. Pulsibus æqualibus semper ordo adiunctus est: inæquales verò alij sunt ordinati, in quibus certa & definita series inæqualitatis servatur: alij inordinati, qui nullam prorsus circuitus in magnitudine, celeritate, frequentia, aut vehementia, formam retinent.

*D. Quid est rhythmus?**Quid
Rhyth-
mus.**C. Rhythmus est proportio quæ spectatur in comparatione diastoles cum systole, penes tempus motus & quietis.**D. Vnde rhythmici nomen deductum est?**Vnde no-
men de-
ducitur.**C. Rhythmici nomen, quod symphoniam certa dimensione constantem significat, à Musicis ad Medicorum scholam translatum est: quia pulsus utrôque motu, ac gemina quiete, quendam veluti concentum obseruat.**D. Quotuplex est Rhythmus?**Quotup-
plex
Rhyth-
mus.**C. Ut proportio par vel impar esse potest, ita Rhythmus alius est æqualis, quo tempus distentionis respondet tempori contractionis; alius inæqualis, cum alterum ab altero superatur. Æqualitas Rhythmici varia est, pro temperamenti, sexus, ætatis, temporis & regionis diuersitate.**D. Quid vocas proprium Pulsus Rhythmum?**Quid
proprius
Rhyth-
mus.**C. Proprius Rhythmus est, cuius æqualitas naturæ, sexui, ætati, tempori & regioni consentanea est. Sic pulsus celer bilioso homini, floridæ ætatis, æstate, in calida regione est.*

analogus : Pituitosa verò mulieri, vetula, hyeme, in frigida regione anomalus.

D. Quotuplex est anomalia?

C. Anomalia duplex est, vna singularis, altera systematica. Illa in vna pulsatione, hæc in pluribus pulsationibus spectatur. Illa rursus vel in vna parte arteriæ, vel in diuersis, ac vno digito, vel multis digitis arteriam contingentibus, percipitur.

Quotuplex inæqualitas.

D. Recense singulas anomalie differentias in vna pulsatione perceptibiles?

C. Inæqualitas in vna pulsatione, & in vna parte arteriæ triplex obseruatur, 1. cùm systole celerior est, quàm diastole, vt in febribus putridis: vel contrà, vt in ardentibus. 2. cùm motus, licet continuus, initio tamen celerior est, in fine tardior, vt pulsus impar citatus, qui Græcis ἀιστομαχὴς, dicitur: vel, cùm diastole interciditur quiete, & post eam velocior pulsus euadit. Hic ἀσπαστός intercisus est, & proprio nomine ἀσπαστός caprizans dicitur. Vnicus pulsus est, non geminus, licet in vna diastole, quasi duplex, ictus sentiatur. Nomen sortitur à sal-

In vna pulsatione, & vna parte arteriæ. Pulsus dissonus. Impar-citatus.

Caprizans.

tu caprarum, quæ cum aliquem adoriuntur, inter salendum quasi sublimēs hærent, & antequam motum perficiant, quiescere videntur, sed mox maiore impetu & celeritate motum absoluunt. 3. cum frequentior percipitur, veluti *διποτος*, pulsus bis feriens, qui repetit tanquam malleus ab incude resiliens, post absolutam diastolen, antequam systole absoluta sit; à percussu geminato sic dictus.

Dicrosus.

In diuersis arteriæ partibus.

Ratione situs.

Pulsus vibratus.

Conuulsus.

Ratione motus.

In diuersis partibus arteriæ inæqualitas obseruatur, vel ratione situs, vel ratione motus. In situ quidem, cum arteria ipsa, à propria sede traducitur, vt in pulsu vibrato, in quo arteriæ quædam partes sursum, aliæ deorsum eodem tempore feruntur, instar iaculorum valida manu emissorum: & in pulsu conuulsuo, in quo vtrinque ab extremis retrahi, tendi & conuelli videtur arteria, instar chordæ tensæ. Conuulsuo pulsui tremulus & palpitans sunt finitimi. In motu pulsus inæqualis dicitur, cum multis digitis arteriam contingentibus dissimilis occurrit, quod duobus modis accidit. Prior est, cum motu cōtinuo existen-

te, inæqualitas quædam in celeritate, duritie & magnitudine, digitis omnibus æquè tangentibus percipitur, cuius generis sunt, pulsus *ἰσχυρὸς*, serratus, qui serræ modo ferit digitos, partibus aliis arteriæ magis distentis, aliis minùs: & *κυματώδης*, vndosus, quo arteriæ partes vicissim, vndarum instar sese attollentium, distenduntur. Qui si parvus, frequens & languidus fiat, *οὐλοηκίζων*, vermiculans dicitur, quia tùm vermium reptatui similis est. Ac si tandem omnium minimus euadat, frequentissimus & languidissimus, vt vix deprehendatur, *μυρμηκίζων*, formicans appellatur, quia formicarũ gressui similis videtur. Posterior est, cùm motus interciditur, adeò vt arteria parte vnâ feriat digitum aliquem, alterâ minimè. Vnde *διακόπλων*, intercisus aliqua ex parte dicitur.

Pulsus serratus.

Vndosus.

Vermiculans.

Formicans.

Interruptus.

D. Singularem in vna pulsatione inæqualitatem enarrasti, perstringe systematicam, in pluribus pulsationibus magnitudine imparibus consistentem?

Inæqualitas in pluribus pulsationibus magnitudine imparibus.

C. Anomalia συστηματικὴ collectitia, quæ in cōgerie multarum pulsationum inter se collatarum reperitur,

Pulsus æ-
qualiter
inæqua-
les.
Myrrhus.

duplex est, prout pulsus inæquales
sunt æqualiter, aut inæqualiter. Æ-
qualiter inminuuntur, si primo pulsu
secundus paulò sit minor, tertius se-
cundo, quartus tertio, & pari modo
reliqui, à murinæ caudæ sensum gra-
cilescientis similitudine *μύρεσι*. Græcis
dicti, Latinis decurtati.

Deficiēs.
Recipro-
cus.

Qui bifariam diuiduntur. Alii enim
diminui non cessant, donec deficient:
alii denuò resurgunt, & ad pristinam
redeunt magnitudinem. Illi *μύνεσι*
nuncupantur *ἐκλείπωντες* deficientes,
hi verò *πελινδρεμῶντες* reciproci.

Pulsus
inæquali-
ter inæ-
quales.
Inter-
mittens.

Pulsus inæquales sæpè agris inæ-
qualiter, nullâ seruâtâ proportionē
contingunt: quales sunt *διαλείπων*, in-
termittens, cuius inæqualitas in ra-
ritate consistit, quia vna vel altera
deest pulsatio; & *περιμπίπων*, coinci-
dens, qui in frequentia inæqualitatem
habet: quia inter duas pulsationes ter-
tia præter spem intercurrit, veluti su-
peruacanea.

Coinci-
dens.

DE CAUSIS PULSVVM.

Contine-
res Pul-
suum cau-
sa.

D. A Pulsuum differentiis, ad causas
transeamus. Quot sunt Pulsuum cause?

C. Tres statuuntur. continentes

pulsuum causæ, facultas, instrumen-
tum, & vsus. Siquidem facultas vita-
lis è corde profecta, est efficiens pulsus
causa princeps: Arteria est instrumen-
talis, quæ mouetur à facultate pro-
pter vsuum & mouendi necessitatem.
Vsus est finis principem ad mouen-
dum impellens, tribus de causis vr-
gens, præ spiritus penuriâ, caloris exu-
perantiâ, & fuliginis copiâ. Vnde tri-
plex vsus existit admodum necessa-
rius, reparatio spiritus vitalis, cõtem-
peratio caloris natiui, & excretio fuli-
ginis. At facultas vel robusta, vel im-
becilla est: instrumentum vel molle,
vel durum, aut mediocre: vsus alius
auctus, alius imminutus, alius mode-
ratus.

Præter continentes, aliæ internæ Alterat-
trices
Pulsuum
causæ.
pulsuum alteratrices causæ. Externæ,
vt æstas, hyems, & quæcûmque ex-
trinsecûs calore & frigore corpus al-
terant; vt aër, cibus, potus, motus,
quies, somnus, balneum, animique
perturbationes. Internæ, vt plethora,
cacochymia, morbus, symptoma, &
si qua id genus in corpore continen-
tur pulsus immutantia. Pulsus natura;

lis & moderatus, à natura sua & mediocritate non recedit, nisi ab alterutra causa violèta, externa vel interna, primùm alteretur. Cor secundum naturam constitutum pulsu symmetrico insitum sibi calorem, spiritusque mediocritatem tuetur: ac præter naturam affectû, diuerso pulsu quicquid molestum infensumque est excutere, aut etiam quicquid-deest, instaurare contendit.

D. Vehementis & languidi pulsus causas expone?

Causæ
quæ Pul-
sum ve-
hementē
& lāgui-
dum effi-
ciunt.

C. Quemadmodum vehemens Pulsus editur ab ijs omnibus quæ facultatem roborant, vt à bona cordis temperie & symmetria, legitimæque diætæ, quæ in recto armorum naturalium vsu consistit: ita languidus ab ijs, quæ eandem frangunt & debilitant, cuiusmodi sunt inedia, labor, cura, tristitia, dolor, vacuatio omnis immodica.

D. Cedo duri, mollisque pulsus causas?

Causæ
Pulsus
duri &
mollis.

C. Pulsus durus ab arteriæ siccitate, vel constrictione, vel tensione, prouenit. Siccitas fit ab immoderato vini meracioris vsu, à febre ardente, hecti-

ce, quartana, aliisque morbis à melancholia. Constrictio à frigore, quod aëris, balnei, aut frigidaë potionis vis intulit. Tensio à conuulsione, ab inflammatione, vel à scirrho jecoris, aut lienis. Mollem pulsum efficiunt contrariæ causæ, quæ arteriam humectant, emolliunt, relaxant; cuiusmodi sunt cibi humectantes, balneum frequens aquæ dulcis, somnus multus, otiosa vita, mollis & delicata, morbi à pituita, vt lethargus, anasarca.

D. Magni & parui Pulsus causas aperi?

C. Magnus Pulsus provenit à facultate forti, instrumento molli & usu aucto: paruus à facultatis debilitate, instrumenti duritie & usu remisso.

Causæ
Pulsus
magni &
parui.

D. Velocis & tardi, crebrique ac rari causas enarra?

C. Velocem Pulsum efficit, atque etiam crebrum, fuliginis copia, vel calor auctus, aut dissipatus spiritus. Proinde à causis omnibus naturalibus, non naturalibus, & contra naturam, vt calidiore temperamento, iuuentute, feruida cæli constitutione, vehem-

Velocis
& crebris

Tardi &
sari.

mentiori exercitatione, iracundia, calidiori cibo & potu, febre, & calida qualibet intemperie, celerior Pulsus editur, cum facultas est robusta & usus postulat. Quod si maior sit necessitas, & imbecilla facultas, accedit crebritas in subsidium. At Pulsum efficiunt tardum & rarum contrariæ causæ, temperamentum frigidius, senectus, hyems, metus, tristitia, intemperies frigida.

Usus enim paucus, aut nullus, facultas debilis. Quocirca cum facultas est robusta, vehemens Pulsus editur. Quod si obsequatur arteria, & sese in dimensiones omnes extendi, à robusta facultate patiat, fiet quoque magnus. Verum urgente necessitate, ut in febribus putridis copia fuliginis per systolen expurganda, in ardentibus per diastolen æstus conterperandus, fiet Pulsus velox & concitatus: tandemque vel oppressa vel debilitata facultate, aucto tamen usu fiet creber. Contrario modo contrarij pulsus sese consequuntur. Primum enim facultate imbecilla, fit pulsus rarus, deinde tardus, tum

paruus, postremò languidus.

D. *Æqualis & inæqualis Pulsus causas exprome?*

C. Pulsus æqualis editur à potente facultate, instrumēto apto, & vſu moderato: Inæqualis verò à facultate invalida, utpote oppressa, languente vel exoluta; ab instrumento læso, ineptove; & abvſu aucto, vel imminuto. Opprimitur facultas à cibo copiosiore, plethora, insigni cachochymia. Languet atrophia, morbo. Exoluitur immodica vacuatione, dissipatisque spiritibus immoderata agrypnia, improbo labore, anxifera cura, excruciante dolore. Instrumentum ineptum redditur, vel propter sanguinis plenitudinem in venis vel arteriis contenta; vel propter obstructionem à crassis & lentis humoribus illic impactis; vel propter compressionem à phlegmone, aliòve præter naturam tumore id obsidente; aut alia causa adstringente, liberum spiritus transitum impediēte. Dum enim aucto vſu vrgente, facultas multitudine humorum onerata, aut obstructione impedita, aut compressione oblecta, aut per se lan-

Causæ
Pulsus
æqualis
& inæqualis.

mentiori exercitatione, iracundia, calidiori cibo & potu, febre, & calida qualibet intemperie, celerior Pulsus editur, cum facultas est robusta & usus postulat. Quod si maior sit necessitas, & imbecilla facultas, accedit crebritas in subsidium. At Pulsum efficiunt tardum & rarum contrariæ causæ, temperamentum frigidius, senectus, hyems, metus, tristitia, intemperies frigida.

Tardi &
sari.

Usus enim paucus, aut nullus, facultas debilis. Quocirca cum facultas est robusta, vehemens Pulsus editur. Quod si obsequatur arteria, & sese in dimensiones omnes extendi, à robusta facultate patiat, fiet quoque magnus. Verum urgente necessitate, ut in febribus putridis copia fuliginis per systolen expurganda, in ardentibus per diastolen astus conterperandus, fiet Pulsus velox & concitatus: tandemque vel oppressa vel debilitata facultate, aucto tamen usu fiet creber. Contrario modo contrarij pulsus sese consequuntur. Primum enim facultate imbecilla, fit pulsus rarus, deinde tardus, tum

parvus, postremò languidus.

D. *Æqualis & inæqualis Pulsus causas exprome?*

C. Pulsus æqualis editur à potente facultate, instrumēto apto, & vsu moderato: Inæqualis verò à facultate invalida, utpote oppressa, languente vel exoluta; ab instrumento læso, ineptòve; & ab vsu aucto, vel imminuto. Opprimitur facultas à cibo copiosiore, plethora, insigni cachochymia. Languet atrophia, morbo. Exoluitur immodica vacuatione, dissipatísque spiritibus immoderata agrypnia, improbo labore, anxifera cura, excruciente dolore. Instrumentum ineptum redditur, vel propter sanguinis plenitudinem in venis vel arteriis contenta; vel propter obstructionem à crassis & lentis humoribus illic impactis; vel propter compressionem à phlegmone, aliòve præter naturam tumore id obsidente; aut alia causa adstringente, liberum spiritus transitum impediēte. Dum enim aucto vsu urgente, facultas multitudine humorum onerata, aut obstructione impedita, aut compressione oblecta, aut per se la-

Causa
Pulsus
æqualis
& inæqualis.

guida, nihilominus quæ suum instrumentum sæpè durius vel mollius vitiant, vehementibus, magis, celeribus, ac crebris motibus propellere studet, variam inæqualitatem nasci est necesse.

D. Ista generales inæqualitatis Pulsuum causa, per speciales anomalias primum singularis, dein collectitias differentias distinguenda sunt. Ordiamur ab inæqualitatis varietate, quæ uno digito, in una parte arteria percipitur: posthac ad eam progressuri, quæ pluribus digitis, in diversis arteria partibus, deprehenditur. Quanam est rhythmiconsoni & dissoni causa?

Rhythmiconsoni
& dissoni
causæ

C. Pulsus est $\epsilon\upsilon\rho\upsilon\theta\mu\omicron\varsigma$, in quo contractio æquè celer est, ac distensio: $\alpha\upsilon\theta\mu\omicron\varsigma$, in quo contractionis & distensionis est inæqualis celeritas. Vtriusque causa ab usu solo dependet. Cum enim arteria diastole frigidum humorem attrahat, systole verò fuliginosa excrementa expellat; luce meridiana clarius, ubi par est systoles & diastoles necessitas, æqualem quoque rhythmum futurum: ubi verò alterius necessitas magis urget, contractionem distensione, vel distensionem contractione

futuram celeriore.

D. Quenam est imparis citati Pulsus causa?

C. Pulsus αἰσθητός prodit à facultate non exoluta, sed onerata, quæ id quod molestum est expellere conatur.

Pulsus
imparis
citati
causa.

D. Quenam est caprizantis Pulsus causa?

C. Causa caprizantis Pulsus est vis robusta, quæ tamen humorum copiam grauat, vel obstructione arteriæ impeditur, quominus continuum motum possit conficere. Ideò cogitur paulisper consistere in ipso motu, sed recollectis viribus motum celeriore & vehementiorem edit, ut superet obstaculum.

Pulsus
caprizan-
tis causa.

D. Quæ dicroti causa?

C. Pulsus dicrotus fit à facultate valida, duro instrumento & usu virgente. Vbi quippè facultas ob caloris excessum, arteriam multum distendere contendit, neque ob instrumenti duritiem, voti compos euadit, duplici motu id studet assequi, quod vnico non potuerat.

Pulsus
dicroti
causa.

D. Quenam sunt inequalitatis in diuersis arteria partibus, causa?

Inæqua-
litas in
diuersis
arteriæ
partibus
causæ.

C. Inæqualitatis singularis in diuersis arteriæ partibus causæ sunt, vel facultas imbecilla, vel copia humorum, vel extrema instrumentorum mollities, vnum ex ijs, vel plura. Facultas enim imbecilla ex corde in arterias deriuata, non potest parifirmitate totum vas attollere, sed propinquiorem scaturienti fonti, i. cordi, partem magis & citius attollit ac vehementius; remotiorem autem tardius & minus & debilius: donec vis quæ in priore parte erat, permeet etiam ad posteriorem; quæ aucta robore ex minore in maiorem, ex tardiore in celeriore, ex debiliore in fortiorem motum profilit. Copia autem humorum impedit facultatem, remorando, detinendo, dirimendo & scindendo continuum eius progressum. Non enim sinunt æqualem esse motum Pulsus humores, ac eo potissimum loco quo affluunt. Quapropter fit, vt in quibusdam partibus motus maior, celerior & vehementior: in quibusdam minor, tardior, languidior: in quibusdam etiam minimus, vt sensu percipi nequeat, ac veluti quie-

te interruptus appareat. Instrumen-
tum, autem supra modum molle, quod
facilicet arteriarum tum multa humi-
ditate sint imbutæ, non potest æquali-
ter omnibus partibus dilatari, propter
ea quod flaccidum corpus ineptum
sit ad motum æqualem. Partes enim
proximæ cordi proximæ attolluntur, aliæ
verò interim flectuntur, non attol-
luntur.

*D. Istæ generales inæqualitatis Pulsuum
in diversis arteriæ partibus perceptibilium
causæ, per speciales differentias enucleandæ
sunt, ducto ab ea exordio, quæ in situ cerni-
tur. Quanam sunt vibrati & convulsiui
Pulsus causæ?*

C. Vibratus Pulsus fit, cum potens
facultas, urgente necessitate, loco ma-
ximæ distensionis, nunc hanc, nunc
aliam partem arteriæ duræ, in acu-
men flectit, sursumque ei aculatur, ut
in magnis inflammationibus, & tena-
cissimis obstructionibus.

Vibrati
Pulsus
causæ.

Convulsiui Pulsus causa est neruo-
rum convulsio. Nam dum nervi con-
trahuntur, arteriæ etiam contrahun-
tur. Magna enim est nervorum & ar-
teriarum societas, non solum quod si.

Causæ
pulsus
convulsi-
ui.

bras arteriæ à nervis accipiant. *scilicet* etiam quoddam singuli ramuli arteriæ vel & nervorum inuicem sint coniuncti. Ferè enim cuilibet arteriæ infra à latius nervus adhæret.

Tremuli.

Palpitantes.

Pulsus tremulus facultatis imbecillitatem, arteriæ mollitiem, aut corpalpitationem, sequitur. Palpitans autem Pulsus causa est flatuosa. Si quidem Palpitation non fit, nisi à flatu in membris occluso, qui exitum quaerit, & agitat secum continentia membræ; tandiu, donec vel resoluatur; vel violenter explosus in cognatum sibi aërem expiret.

D. Persequamur inaequalitatis differentiam, quæ in motu spectatur. Quibus ex causis fit serratus Pulsus?

Causæ Pulsus serratis.

C. Serrati Pulsus causæ sunt facultas onerata, durum instrumentum & usus auctus. Hic enim distensionem postulat, sed arteria ob duritiem extensione & inflammatione natam, ægrè distenditur, præsertim ab affecta facultate.

Quæ undosi, vermiculantis & formicantis Pulsus causa sunt?

Undosi.

C. Pulsus undosus à copia humorum,

rum, instrumenti mollitie & grauata facultate nascitur. Tres igitur ad eius generationem causæ concurrunt, facultas imbecilla, quæ pari firmitate totam arteriam attollere non potest, copia humorum quæ facultatem remoratur, & instrumenti mollities ob humiditatem: vnde fit vt æqualiter distendi non possit, sed partes eius aliquæ attollantur, aliæ flectantur. Vndosus dissoluta magis virtute, in vermiculantem sæpius degenerat: & vermiculans fatiscentibus viribus in formicantem, qui acutis atque malignis febribus non raro contingit.

Vermi-
culatis.Formi-
cantis.

D. Superest anomalia systematica causa. Quotuplex est?

C. Collectitiæ inæqualitatis, quæ in multis pulsationibus spectatur, causa duplex: facultas inualida, & ineptum instrumentum. Facultas autem inualida est, cum opprimitur plenitudine aut impuritate humorum, vel dissoluitur intemperie, morbi vehementia vel diuturnitate, vacuationibus immodicis, dolore, inedia, & animi affectibus. Instrumentum verò ineptum est, cum impeditur répletionem, obstru-

Causæ
inæquali-
tatis sy-
stemati-
cæ.

Etione, aut compressione.

D. Quæ ex causa Myurus oritur Pulsus?

*Causa
Pulsus
Myuri.*

C. Myurus pulsus causam habet imbecillam facultatem, quæ remotioribus partibus à corde parcius affunditur, propioribus vberius. Quapropter propiores cordi magis distenduntur, remotiores minus: & quanto partes longius distant à principio, tanto minores motus edent.

D. Quanam est intermittentis & deficientis Pulsus effectrix causa?

*Intermittentis.
Deficientis.*

C. Ut modica virium solutio pulsum languidum, parvum, tardum, rarum; ita maior intermittentem, maximam deficientem, & tandem ad omni-
omnimodam pulsus priuationem efficit.

D. Quæ deficientis reciproci causa est?

Reciproci.

C. Recurrens pulsus fit ab invalescente facultate, quo premebatur onere liberata.

D. Quæ ex causa Pulsus intercidens enascitur?

Intercidentis.

C. Pulsus intercurrentis fit à facultate robusta, sed onerata, quæ nihilominus quicquid molestum est

extutere nititur.

D. Unde oritur tanta illa Pulsus inaequalitas, quae in malignis febribus animaduertitur: ut qui nunc languidus est, mox vehemens appareat: & qui parvus, mox magnus: qui celer, ilico tardus: & qui creber, statim rarus?

C. Id accidit, cum facultatis substantia non ipsa per se consumitur, sed vel obstructione, vel tumore praeter naturam, vel humorum copia & influxu quasi pressa & obruta succumbit; & cum perniciofa aura laceffitur, ac acerrimè validior reluctatur.

Continua inaequalitas.

*DE SIGNIS MORBORVM,
qua petuntur à Pulsibus.*

D. Qua morbi signa petuntur à Pulsu?

C. Diagnostica febris signa, omniumque morborum prognostica, ex pulsu potissimum sumuntur. Febris quippe primaria est, vel symptomatrica. Primaria verò, continua, vel intermittens. Huius accessiones, & accessionum quatuor tempora, pulsus mutatione cognoscuntur. Continua febris exacerbationes & remissiones pulsus quoque fideliter indicat. Febris symptomatrica simul cum prima-

Quae morbi signa ducuntur à Pulsu.

riis morbis augetur & minuitur. Vt igitur febris, quæ magnis morbis superuenire solet, incrementum & declinatio discernantur, accurata Pulsus observatio confert. Itaque febres tam primarias quàm symptomáticas, atque ex accidenti magnos omnes morbos Pulsus demonstrat. Vires autem ægri pulsus certò prodit, quarum comparatione cum morbo facta, de futuro euentu tutò pronuntiatur. Nam si morbus augeatur, & vires minuantur, mortis periculum imminet. Si verò morbus minuatur, & vires augeantur, spes recuperandæ sanitatis affulget. Cum morbus non minuitur, sed vires constant, quæ longitudinem & magnitudinem morbi perferre possunt, non est deplorata salus. In hac viri cum morbo collatione, seu comparatione, prognosis tota vertitur. Vtrumque verò pulsu designatur. Itaque tam diagnostica, quàm prognostica morborum signa petuntur à pulsu: certiora tamen sunt Prognostica, quia virium fidelis nuntius est pulsus.

D. Qua generatim tetigisti morborum

ex Pulsibus signa cum diagnostica, tum
Prognostica, minutius per species expli-
canda sunt. Quid vehemens & languidus
Pulsus significant?

C. Effectus est index suæ causæ. Quid ve-
hemens
& debilis
Pulsus si-
gnificant.
pulsus vehemens fit à robusta, langui-
dus à languida facultate. Ergo pulsus
vehemens, vitalis facultatis robur in-
dicat; & quò vehementior est, eò ma-
iores vires significat; ac sanis vitæ
longitudinem, ægrotis securitatem
pollicetur. Si tamen naturæ limites
excedat vehementia, non vigorem
virtutis, sed iritationem annuntiat.
Languidus contrà, debilitatem facul-
tatis arguit; & quantò est languidior,
tantò maiorem virium defectum esse
attestatur. Debilis autem facultas est,
ex spirituum dissipatione, vel quòd
opprimatur humorum copia.

D. Quid Pulsus durus & mollis signi-
ficant?

C. pulsus mollis humidum corporis Quid
Pulsus
durus &
mollis.
habitum indicat, qualis est in hydro-
pici. Durus contrà, vel siccitatem à
febre ardente & maligna, vel hectica,
aut quartana profectam, vel adstri-
ctionem ex frigore, vel tensionem à

conuulsione, vel tumore præter naturam, aut repletione vasorum ortam, præ se fert.

D. Quid Pulsus magnus & paruus significant?

Quid magnus.

C. Magnus Pulsus morbum calidum significat. Nam propter auctum calorem arteria se quoquouersum pandit. Vbi ex robore facultatis proficiscitur, magnus est simul & vehemens. Si ex mollitie instrumenti, magnus & mollis existit. Si ex aucto calore duntaxat, caret vehementia & mollitudine.

Paruus.

Paruus verò pulsus, si à facultatis imbecillitate prodit, erit paruus simul & languidus: Si ab instrumento duro, erit paruus simul & durus. Si neutrum adsit, nec durities, nec languor, caloris imminutionem significat.

D. Quid celer & tardus significant?

Quid celer.

C. Celer in sanis sine magnitudine, significat exercitia immoderata, vel thermas, vel quampiam aliam nimis calefacientem causam, quæ vires attriuit. In ægrotantibus verò morbum calidum, qui iam vires labefactauit. Itaque perpetuus est febris comes.

Tardus pulsus imbecillam esse facultatem, si simul est languidus, significat. Simul durus est, si instrumentum durum fuerit. Vsum verò diminutum, si tardus duntaxat fuerit, indicat.

D. Quid frequens & rarus significant?

C. Frequens pulsus vsum magis augmentum, vel facultatem imbecillam, vel instrumentum durum, distensionem prorsus ineptum commōstrat. Si à solo aucto vsum provenit pulsus, neque languidus, neque durus est, magnoque ac celeri superuenit; tunc magna in ægrotante coopore caliditas, quæ omnem in pulsu mediocritatem evertit, significatur. Si à debili facultate profisciscatur, imbecillitas ipsa pulsu percipitur; sicut & arteriæ durities, ob quam frequens editur, quod magnus fieri nequeat. Adiungiturque ferè omnibus parvis pulsibus frequentia, cum natura id quod deest magnitudini, primò celeritate, dein frequentia compensare soleat. Rarus pulsus imminutum vsum arguit, ac frigidum morbum præ se fert. Perpetuò in malis sunt languidi pulsus, parvi, tardi, rari,

Quid frequens.

Rarus.

eoque peiores, quò languidiores, minores, tardiores, rariores. Instante morte solent esse languidissimi, minimi, tardissimi, rarissimi.

D. Quid equalitas indicat in Pulsibus?

Quid equalitas in Pulsibus significat.

C. Facultatem esse robustam, organum aptum, & vsum moderatum.

D. Quid inaequalitas singularis portendit?

Quid inaequalitas singularis portendat.

C. Inaequalitas singularis periculiosior est, quàm systematica: cum causa quæ singulos pulsus vitiat, grauior sit, quàm quæ inter plures vnum aut alterum.

D. Quid inaequalitas rhythmici significat?

Quid inaequalitas rhythmici.

C. Pulsus arhythmus fuliginis copiam, vel caloris exuperantiã indicat: Vtrâque febrem, illa putrem, hæc ardentem designat. Hinc inaequalitas rhythmici, propria perhibetur putridæ febris nota.

D. Quid Pulsus impar portendit?

Quid Pulsus impar citatus.

C. Impar citatus minus periculum portendit, quàm intermittens in vna pulsatione. Indicat enim naturam à causis insalubribus impediri, sed cum

illis nihilominus decertare prodit.
Inter putridæ febris signa recensetur.

D. Quid Pulsus intermittens præfagit?

C. Pulsus in vna pulsatione intermittens perniciosior est, quàm in pluribus : quoniam natura non solum quarto aut quinto quoque pulsu, sed in singulis sic impeditur, ut ne vnum quidem pulsum integrum perficere possit : ob idque mortem portendit, si intermissio à languida facultate proveniat. Sed si vitio tantum instrumenti inæqualitas contingat, licet facultatem impediri significet, non aded tamen periculosa est, ut in caprizante pulsu accidit, ubi motus quiete solum interpolatur, & in duas quasi partes diuiditur.

Quid singularis intermittens designet.

D. Quid Pulsus caprizans & dicrotus significant?

C. Ambo inæqualem cordis interperiem, aut fumosorum excrementorum copiam, non omnibus cordis partibus æquabiliter insidere ostendunt.

Quid Pulsus caprizans & dicrotus.

D. Quid Pulsus vibratus & convulsivus significant?

Quid Pulsus vibratus & convulsivus.

C. Vibratus Pulsus ostendit naturæ

Inæqua-
litas in
diuersis
arteriæ
partibus
causæ.

C. Inæqualitatis singularis in diuersis arteriæ partibus causæ sunt, vel facultas imbecilla, vel copia humorum, vel extrema instrumentorum mollities, vnum ex ijs, vel plura. Facultas enim imbecilla ex corde in arterias deriuata, non potest pari firmitate totum vas attollere, sed propinquiorem scaturienti fonti, i. cordi, partem magis & citiùs attollit ac vehementiùs; remotiorem autem tardiùs & minùs & debiliùs: donec vis quæ in priore parte erat, permeet etiam ad posteriorem; quæ aucta robore ex minore in maiorem, ex tardiore in celeriore, ex debiliore in fortiorem motum profilit. Copia autem humorum impedit facultatem, remorando, detinendo, dirimendo & scindendo continuum eius progressum. Non enim sinunt æqualem esse motum Pulsus humores, ac eo potissimum loco quo affluunt. Quapropter fit, vt in quibusdam partibus motus maior, celerior & vehementior: in quibusdam minor, tardior, languidior: in quibusdam etiam minimus, vt sensu percipi nequeat, ac veluti quie-

te interruptus appareat. Instrumen-
tum, autem supra modū molle, quod
faci-
licā arteriarum tū multa humi-
gē-
tate sint imbuta, non potest æquali-
ter omnibus partib⁹ dilatari, propter
eā quod flaccidum corpus ineptum
fit ad motum æqualem. Partes enim
m-
ius cordi proximæ attolluntur, aliæ
verò interim flectuntur, non attol-
luntur.

*D. Istæ generales inæqualitatis Pulsuum
in diuersis arteriæ partibus perceptibilium
causæ, per speciales differentias enucleandæ
sunt, ducto ab ea exordio, quæ in situ cerni-
tur. Quanam sunt vibrati & conuulsiui
Pulsus causæ?*

C. Vibratus Pulsus fit, cū potens Vibrati
Pulsus
causæ.
facultas, vrgente necessitate, loco ma-
ximæ distensionis, nunc hanc, nunc
aliā partem arteriæ duræ, in acu-
men flectit, sursūque eiāculatur, vt
in magnis inflammationibus, & tena-
cissimis obstructionibus.

Conuulsiui Pulsus causā est neruo-
rum conuulsio. Nam dum nerui con-
trahuntur, arteriæ etiā contrahun-
tur. Magna enim est neruorum & ar-
teriarum societas, non solū quod fi- Causæ
pulsus
conuulsi-
ui.

bras arteriæ à nervis accipiant. Ferè etiam quoddam singuli ramuli arteriæ & nervorum inuicem sint coniuncti. Ferè enim cuilibet arteriæ infra ad latus nervus adhæret.

Tremuli.

Palpitantis.

Pulsus tremulus facultatis imbecillitatem, arteriæ molliem, aut cor palpitationem, sequitur. Palpitans autem Pulsus causa est flatuosa. Si quidem Palpitation non fit, nisi à flatu in membris occluso, qui exitum quaerit, & agitat secum continentia membra; tandiu, donec vel resoluatur; vel violenter explosus in cognatum sibi aërem expiret.

D. Persequamur inaequalitatis differentiam, quæ in motu spectatur. Quibus ex causis fit serratus Pulsus?

Causæ Pulsus serrati.

C. Serrati Pulsus causæ sunt facultas onerata, durum instrumentum & usus auctus. Hic enim distensionem postulat, sed arteria ob duritiem extensione & inflammatione natam, ægrè distenditur, præsertim ab affecta facultate.

Quæ undosi, vermiculantis & formicantis Pulsus causa sunt?

Undosi.

C. Pulsus undosus à copia humorum,

rum, instrumenti mollitie & grauata facultate nascitur. Tres igitur ad eius generationem causæ concurrunt, facultas imbecilla, quæ pari firmitate totam arteriam attollere non potest, copia humorum quæ facultatem remoratur, & instrumenti mollities ob humiditatem: vnde fit vt æqualiter distendi non possit, sed partes eius aliquæ attollantur, aliæ flectantur. Vndosus dissoluta magis virtute, in vermiculantem sæpius degenerat: & vermiculans fatiscentibus viribus in formicantem, qui acutis atque malignis febribus non raro contingit.

Vermi-
culatis.Formi-
cantis.

D. Superest anomalia systematica causa. Quotuplex est?

C. Collectitiæ inæqualitatis, quæ in multis pulsationibus spectatur, causa duplex: facultas inualida, & ineptum instrumentum. Facultas autem inualida est, cum opprimitur plenitudine aut impuritate humorum, vel dissoluitur intemperie, morbi vehementia vel diuturnitate, vacuationibus immodicis, dolore, inedia, & animi affectibus. Instrumentum verò ineptum est, cum impeditur répletionem, obstru-

Causæ
inæquali-
tatis sy-
stemati-
cæ.

266 *N. Ab. Frambesarij*
Etione, aut compressione.

D. Quæ ex causa Myurus oritur Pulsus?

Causa
Pulsus
Myuri.

C. Myurus pulsus causam habet imbecillam facultatem, quæ remotioribus partibus à corde parcius affunditur, propioribus vberius. Quapropter propiores cordi magis distenduntur, remotiores minus: & quanto partes longius distant à principio, tanto minores motus edent.

D. Quenam est intermittentis & deficientis Pulsus effectrix causa?

Intermittentis.
Deficientis.

C. Vt modica virium solutio pulsum languidum, paruum, tardum, rarum; ita maior intermittentem, maxima deficientem, & tandem ad op^{er}is, omnimodam pulsus priuationem efficit.

D. Quæ deficientis reciproci causa est?

Reciproci.

C. Recurrens pulsus fit ab inualecente facultate, quo premebatur onere liberata.

D. Quæ ex causa Pulsus intercidens nascitur?

Intercidentis.

C. Pulsus intercurrentis fit à facultate robusta, sed onerata, quæ nihilominus quicquid molestum est

excutere nititur.

D. *Vnde oritur tanta illa Pulsus inaequalitas, quae in malignis febribus animadueritur: ut qui nunc languidus est, mox vehemens appareat: & qui parvus, mox magnus: qui celer, ilicò tardus: & qui creber, statim rarus?*

C. Id accidit, cùm facultatis substantia non ipsa per se consumitur, sed vel obstructione, vel tumore præternaturam, vel humorum copia & influxa quasi pressa & obruta succumbit; & cùm perniciofa aura laceffitur, ac acerrimè validior reluctatur.

Cōtinua inaequalitas.

*DE SIGNIS MORBORVM,
qua petuntur à Pulsibus.*

D. *Qua morbi signa petuntur à Pulsu?*

C. Diagnostica febris signa, omniumque morborum prognostica, ex pulsu potissimùm sumuntur. Febris quippè primaria est, vel symptomatrica. Primaria verò, continua, vel intermittens. Huius accessiones, & accessionum quatuor tempora, pulsus mutatione cognoscuntur. Continua febris exacerbationes & remissiones pulsus quoque fideliter indicat. Febris symptomatrica simul cum prima-

Quæ morbi signa ducuntur à Pulsu.

riis morbis augetur & minuitur. Ut igitur febris, quæ magnis morbis superuenire solet, incrementum & declinatio discernantur, accurata Pulsus observatio confert. Itaque febres tam primarias quam symptomáticas, atque ex accidenti magnos omnes morbos Pulsus demonstrat. Vires autem ægri pulsus certò prodit, quarum comparatione cum morbo facta, de futuro euentu tutò pronuntiatur. Nam si morbus augeatur, & vires minuantur, mortis periculum imminet. Si verò morbus minuatur, & vires augeantur, spes recuperandæ sanitatis affulget. Cum morbus non minuitur, sed vires constant, quæ longitudinem & magnitudinem morbi perferre possunt, non est deplorata salus. In hac viri cum morbo collatione, seu cõparatione, prognosis tota vertitur. Vtrúmque verò pulsu designatur. Itaque tam diagnostica, quam prognostica morborum signa petuntur à pulsu: certiora tamen sunt Prognostica, quia virium fidelis nuntius est pulsus.

D. Qua generatim tetigisti morborum

ex Pulsibus signa cum diagnostica, tum Prognostica, minutius per species explicanda sunt. Quid vehemens & languidus Pulsus significant?

C. Effectus est index suæ causæ. Quid vehemens & debilis Pulsus significant. pulsus vehemens fit à robusta, languidus à languida facultate. Ergo pulsus vehemens, vitalis facultatis robur indicat; & quò vehementior est, eò maiores vires significat; ac sanis vitæ longitudinem, ægrotis securitatem pollicetur. Si tamen naturæ limites excedat vehementia, non vigorem virtutis, sed iritationem annuntiat. Languidus contrà, debilitatem facultatis arguit; & quantò est languidior, tantò maiorem virium defectum esse attestatur. Debilis autem facultas est, ex spirituum dissipatione, vel quòd opprimatur humorum copia.

D. Quid Pulsus durus & mollis significant?

C. pulsus mollis humidum corporis habitum indicat, qualis est in hydro-picis. Durus contrà, vel siccitatem à Quid Pulsus durus & mollis. febre ardente & maligna, vel hectica, aut quartana profectam, vel adstrictionem ex frigore, vel tensionem à

conuulsione, vel tumore præter naturam, aut repletione vasorum ortam, præ se fert.

D. *Quid Pulsus magnus & paruus significant?*

Quid magnus.

C. Magnus Pulsus morbum calidum significat. Nam propter auctum calorem arteria se quoquouersum pandit. Vbi ex robore facultatis proficiscitur, magnus est simul & vehemens. Si ex mollitie instrumenti, magnus & mollis existit. Si ex aucto calore duntaxat, caret vehementia & mollitudine.

Paruus.

Paruus verò pulsus, si à facultatis imbecillitate prodit, erit paruus simul & languidus: Si ab instrumento duro, erit paruus simul & durus. Si neutrum adsit, nec durities, nec languor, caloris imminutionem significat.

D. *Quid celer & tardus significant?*

Quid celer.

C. Celer in sanis sine magnitudine, significat exercitia immoderata, vel thermas, vel quampiam aliam nimis calefacientem causam, quæ vires attriuit. In ægrotantibus verò morbum calidum, qui iam vires labefactauit. Itaque perpetuus est febris comes.

Tardus pulsus imbecillam esse facultatem, si simul est languidus, significat. Simul durus est, si instrumentum durum fuerit. Vsum verò diminutum, si tardus duntaxat fuerit, indicat.

D. Quid frequens & rarus significant?

C. Frequens pulsus vsum magis autum, vel facultatem imbecillam, vel instrumentum durum, distensionem prorsus ineptum commōstrat. Si à solo aucto vsum provenit pulsus, neque languidus, neque durus est, magnoque ac celeri superuenit; tunc magna in ægrotante coopore caliditas, quæ omnem in pulsu mediocritatem evertit, significatur. Si à debili facultate proficiscatur, imbecillitas ipsa pulsu percipitur; sicut & arteriæ durities, ob quam frequens editur, quod magnus fieri nequeat. Adiungiturque ferè omnibus parvis pulsibus frequentia, cum natura id quod deest magnitudini, primò celeritate, dein frequentia compensare soleat. Rarus pulsus imminutum vsum arguit, ac frigidum morbum præ se fert. Perpetuò in malis sunt languidi pulsus, parvi, tardi, rari.

eoque peiores, quò languidiores, minores, tardiores, rariores. Instante morte solent esse languidissimi, minimi, tardissimi, rarissimi.

D. Quid equalitas indicat in Pulsibus?

Quid equalitas in Pulsibus significat.

C. Facultatem esse robustam, organum aptum, & vsum moderatum.

D. Quid inaequalitas singularis portendit?

Quid inaequalitas singularis portendat.

C. Inaequalitas singularis periculiosior est, quàm systematica: cum causa quæ singulos pulsus vitiat, grauior sit, quàm quæ inter plures vnum aut alterum.

D. Quid inaequalitas rhythmī significat?

Quid inaequalitas rhythmī.

C. Pulsus arhythmus fuliginis copiam, vel caloris exuperantiā indicat: Vtrāque febrem, illa putrem, hæc ardentem designat. Hinc inaequalitas rhythmī, propria perhibetur putridæ febris nota.

D. Quid Pulsus impar portendit?

Quid Pulsus impar citatus.

C. Impar citatus minus periculum portendit, quàm intermittens in vna pulsatione. Indicat enim naturam à causis insalubribus impediri, sed cum

illis nihilominus decertare prodit.
Inter putridæ febris signa recensetur.

D. Quid Pulsus intermittens præfagit?

C. Pulsus in vna pulsatione intermittens perniciosior est, quàm in pluribus : quoniam natura non solum quarto aut quinto quoque pulsu, sed in singulis sic impeditur, ut ne vnum quidem pulsum integrum perficere possit : ob idque mortem portendit, si intermissio à languida facultate proveniat. Sed si vitio tantum instrumenti inæqualitas contingat, licet facultatem impediri significet, non adeò tamen periculosa est, ut in caprizante pulsu accidit, ubi motus quiete solum interpolatur, & in duas quasi partes diuiditur.

Quid singularis intermittens designet.

D. Quid Pulsus caprizans & dicrotus significant?

C. Ambo inæqualem cordis interperiem, aut fumosorum excrementorum copiam, non omnibus cordis partibus æquabiliter insidere ostendunt.

Quid Pulsus caprizans & dicrotus.

D. Quid Pulsus vibratus & convulsus significant?

Quid Pulsus vibratus & convulsus.

C. Vibratus Pulsus ostendit naturæ

certamen cum morbo, magnamque phlegmonem, yel tenacissimam obstructionem, portendit.

Conuulsius verò pulsus, conuulsionem à siccitate indicat, quæ solet esse lethalis.

D. Quid Pulsus tremulus & palpitans?

Quid tremulus & palpitans.

C. pulsus tremens facultatem imbecillam, arteriamque mollem renuntiat: interdum syncopes, & postea mortis, omen est.

Palpitans in pituitosa febre laborantibus, sine periculo apparet.

D. Quid Pulsus serratus significat?

Quid serratus.

C. Pulsus serratus internam partium nervosarum inflammationem indicat; à qua, nisi valida sit facultas, æger non facile euadit.

D. Quid undosus, vermiculans ac formicans significant?

Quid undosus.

Pulsus undosus arterias humore madentes indicat, humidósque morbos, ut febres pituitosas, hydropes in quibus nullo scirrho induruerunt viscera, ac interdum virtutem non mediocriter validam, propterea à criticum sudorem significat. plerumque facultatem oneratam testatur. Malum au-

tem signum est. cum in vermiculante mutatur. Vermiculans quippè facultatem vitalem ex nimia aliqua vacuatione, paulatim labascere denuntiat.

Quid vermiculans.

Formicans vermiculante perniciosior, eandem iam collapsam. In febribus lentis, quæ diuturnitate temporis exhauserunt vires, certus est mortis nuntius.

Quid formicans.

D. Quid inæqualitas systematica portendit?

C. Inæqualitas collectitia æqualiter facta, periculosior est quam inæqualitas inæqualiter facta; cum illa ab imbecillitate facultatis, hæc instrumenti vitio, sæpius accidat.

Quid inæqualitas systematica portendat.

D. Quid Myurus Pulsus designat?

C. Facultatis imbecillitatem in extenuato corpore ostendit, & cor ipsum eatenus debile, ut vim & actionem, ab se iam nequeat ad extremas usque corporis partes æquabiliter protendere. Hic igitur perniciosus est, atque ruinam minatur; si deficient, nec reciprocus sit. Asphyxia siquidè omnium symptomatum est horrendissimum, & certum præsentis mortis signum, modò à momentaneis causis

Quid Myurus designet.

non enascatur. periculosior enim est intermittente; quia maiorem imbecillitatem arguit, nihil mouere posse, quàm per interualla tantum mouere posse. Sed pulsus reciprocus in bonis habetur, quia resurgentis facultatis est index.

D. Quid intermittens systematicus portendit?

Quid in-
termittens
systema-
ticus
portendat.

C. Si ab instrumenti vitio fiat intermissio, magnitudinem & vehemētiam pulsus vix planè amittit; minùs proinde periculosus: sed si à facultatis debilitate proveniat, languidus erit, & idcirco periculosus. Intermissio quò diuturnior, eò periculosior. Diuturna censetur, quæ tempus excedit duorum pulsuum. Iuuenibus periculosissima pulsuum intermissio, minùs pueris, minimè senibus: Interdum tamen neque iuuenibus ipsis exitialis est, cum vel integra valetudine, ex arteriarum obstructione, aut diuturno quouis affectu, ut ex asthmate familiaris existit: perseverans illa diutius inopinatam repentinamque mortem minatur, ipsiusque cordis vitalem calorem repente extinctum iri.

D. Quid intercidens Pulsus denotat?

C. Intercurrens Pulsus omnium ex systematica classe securissimus est. Quid intercidens Pulsus significet. Licet enim oneratam virtutem indicet, validam tamen adhuc esse, integram & cum causa morbi pugnantem significat, proinde victoriam promittit.

D. Quid ordo indicat in Pulsibus?

C. Ordo fixam & permanentem causam significat. Ataxia verò, id est ordinis perturbatio, variantē. Itaque Quid ordo indicet in Pulsibus. in bonis semper ordo optandus est. In malis præstat nullum servari ordinem. Ut pulsus intermittens semper est malus. Peior tamen si intermittas cum ordine, quàm si sine ordine.

ARTIS SPHYGMICÆ

Praxis.

D. Perdocte Candidate, simul ac Apollinarem lauream adeptus eris, ad Praxim Medicam te conferre speras, cuius initium à Pulsu tactu ducitur. Explices opto, ad quem usum ars Sphygmica fuerit instituta?

C. Ars Sphygmica, sapientissime Ad quem usum ars Sphygmica sit instituta. Præceptor, cum ad naturæ dynamin perscrutandam, tum ad morbi dia-

gnosin & prognosin comparandam est instituta. Cuius notitia Medico apprimè necessaria videtur, quòd eius exercitatio quotidie subeunda sit in facienda Medicina.

D. Cedo mihi subiectum circa quod Ars Sphygmica exercetur?

Circa
quod
subiectū
exercetur.

C. Circa corpus sanum & ægrum, & quod indifferenter se habet, nec planè sanum, necdum ægrum, sed neutrum.

Monet Galenus, quòd faciliùs quisque intelligat qui præter naturam sit pulsus, vt naturalem priùs obseruet.

D. Qua methodo Sphygmica artem circa corpus sanum exercebis?

Quomodo
circa
corpus
sanum
exercenda sit.

C. Quoniam Pulsus naturalis, est motus *συνεπής*, moderatus; & *εὐρυθμὸς*, consonus: considerabo primùm symmetriam in qualitate, tum ratione mouentis facultatis, tum ratione mobilis organi; & in quantitate distensionis: deinde rhythmī analogiam in tempore motus & quietis adnotabo.

D. Quid considerabis in qualitate & quantitate Pulsus?

Quid considerandum
in qualitate Pulsus.

C. Penes qualitatem primùm ratione mouentis facultatis animad-

uertam, si nec languidus, nec ultra modum vehemens, sed moderatus sit pulsus: ac ratione mobilis arteriæ, si nec durus, nec mollis, sed intervtrūm-que medium teneat.

Mox quantitatem distensionis retexam, si nec parvus, nec enormiter magnus, sed modum seruet.

In quantitate distensionis.

D. Aduersarij nihilominus non pauci contendunt, quò vehementior & maior pulsus extiterit, eò robustiorem facultatem indicari, ac proinde magis naturæ consentaneum esse. Quod eis responsum dabis?

Obiectio.

C. Respondebo, quòd cor secundum naturam constitutum, pulsu symmetro & eurhythmo insitum sibi calorem moderetur, ad vitalem spiritum elaborandum: ac si mediocritatis limites excedat, vehementia magnitudòve, non virtutis robori, sed irritationi sit imputanda. Ideò vehementiùs & ultra modum micans pulsus, præter naturam censetur, ut & impensè durus atque mollis. Nam ut rectè monet Poëta:

Respon-
sio.

*Est modus in rebus, sunt certi deniq; fines,
Quos ultra citràque nequit consistere ve-
Etiam.*

D. Quid in *rhythmo* considerabis?

Quid in
rhythmo
confide-
randum,
penes tē-
pus mo-
tionis,
penes tē-
pus quie-
tis.

C. Duo considerabō, æqualitatem
& ordinem. Idcirco diligenter obser-
uabo penes tempus motionis, si nec
iusto velocior pulsus, nec tardior; &
penes tempus quietis, si nec frequen-
tior, nec rarior, sed *εὐρυθμος*, consonus
existat. Et ad *rhythm*i analogiā aper-
tius deprehendēdam, accuratius per-
pendam, si tempus distensionis tem-
pori contractionis respondeat, nec al-
terum ab altero superetur. Pulsus
quippe *εὐρυθμος*, propriū servat *rhyth-*
mus. At proprius *rhythmus* æqualis
& ordinatus est. *Rhythmus* autem æ-
qualis, temperamento, sexui, ætati,
tempori, & regioni analogus est: ordi-
natus verò in pulsationum multitudine
certam circuitus seriem, constan-
tiāque retinet.

Quid Pul-
sus sit
eurhyth-
mus.
Qualis sit
proprius
rhyth-
mus.
Qui sit
rhyth-
mus
æqualis.
Qui or-
dinatus.

Sic accuratè perspecta pulsus sym-
metria vel ametria in qualitate &
quantitate, ac *rhythm*i analogia, vel
anomaliam in tempore motus & quie-
tis, atque in pluribus pulsationibus
taxi vel ataxia, ego acri intentione di-
iudicabo, an naturalis sit, vel præter-
naturam.

*D. Qua methodo Sphygmica artem
circacorporis agrum exercebis?*

C. Ego ad agrum curandum accersitus, imprimis obseruabo, si pulsus suam amiserit symmetriam in qualitate, vel ratione mouentis facultatis, vel mobilis organi: vt si naturali vehementior sit, vel remissior; durior vel mollior; & in quantitate, vt si maior, vel minor extet: deinde si proprium deseruerit rhythmum in tēpore motus vel quietis; vt si velocior, vel tardior; aut crebrior, vel rarior euaserit. Cor siquidem præter naturam affectum, diuerso pulsu quicquid molestū est excutere, aut quicquid deest instaurare, contendit. Si pulsus à proprii rhythmī æqualitate descuerit, perscrutabor an anomalia sit singularis, in vna pulsatione conspicua, an collectitia in multarum pulsationum congerie, quæ ουσμηλία Græcis dicitur: ac si singularis exiit, num in vna parte, an in diuersis partibus arteriæ percipiatur.

D. Quomodo singularum anomaliam in vna parte arteriæ percipies?

Quomodo ars
Sphygmica
circacorporis
agrū
exercenda
sit.

Quomo-
do tri-
plex ano-
malia sin-
gularis
in vna
parte ar-
terię per-
uestigan-
da.

1.

Gal. c. 8.
li. de Diff.
puls.

C. Ego singularem anomaliam in vna parte arteriæ retegam, primùm si celerior sit systole quàm diastole, vt in febribus putridis; vel contrà: vt in ardentibus. Vnde pulsus deprehenditur ἀρρυθμος dissonus, ἢ ῥυθμὸν ἢ σάζων: ἀλλὰ διαφθεύων, suum rhythmum non seruans, sed labefactans, χάκωσις γὰρ τῆς ἰσχύος ῥυθμῷ, ὅστις διαφθερεῖ, ἢ σέρησις παντελής. Vitium enim natiui rhythmī, corruptio seu deprauatio est, non absoluta abolitio seu priuatio.

2. Deinde si motus, licet continuus, celerior sit initio, in fine tamen tardior, qualis est pulsus αἰσισταχὺς, imparcitatus: vel celerior in fine, sed initio tardior, cuiusmodi est pulsus δορυαδίζων caprizans: vbi diastole interciditur quiete, & post eam velocior euadit.

3. Tum si crebrior appareat, vt pulsus διχρῶτος bis feriens, tanquàm malleus ab incude resiliens. Sic triplicem in vna pulsatione anomaliam vicissim peruestigabo.

D. Quid anomalia prima significat?

Quid si-
gnificet.

1.

C. Maiorem expellendæ fuliginis necessitatem indicat, si systole cele-

rior sit; vel æstus contemperandi, si diastole velocior. Vnde illa putridæ, hæc ardentis febris comes est.

D. Quid secunda?

C. Naturam à causis insalubribus, quas euincere conatur, impeditam esse ostendit, si celerior motus initio, quàm in fine:

Vel naturam noxiorum humorum, quorum copia grauatur, victricem esse testatur; si celerior in fine, quàm initio.

D. Quid tertia?

C. Caloris excessum arguit, propter quem facultas duplici motu maiorem studet refrigerationem allicere, quam vnico non potest ob instrumenti durtiæ.

D. Quomodo anomaliam in diuersis arteria partibus reperies?

C. Ego in diuersis arteriæ partibus, non vno duntaxat digito, sed pluribus digitis arteriam contingentibus, vel in situ, vel in motu inæqualitatem peruestigabo.

In situ quidem, si arteria ipsa à propria sede traducatur, vt in pulsu vibrato, in quo arteriæ quædam partes

quomodo
duplex
anomaliam
singularis
in diuer-
sis arte-
riæ par-
tibus
peruesti-
ganda.

in situ.

furfum, alia deorfum eodem tempore feruntur, inftar iaculorum valida manu emifforum: & in pulſu convulſivo, in quo utrinque ab extremis retrahi, tendi, & conuelli videtur arteria, inftar chordæ tenſæ.

2.
in motu.

In motu verò, ſi multis digitis arteriam contingentibus pulſus diſſimilis occurrat; vt ſi mot⁹ intercідatur adeò vt arteria parte vna feriat digitum aliquem, altera minimè: Vnde *Παρόνομος* intercīſus aliqua ex parte dicitur: vel ſi motu continuo exiſtente, inæqualitas quædam in celeritate, magnitudine, duritie, digitis omnibus æquè tangentibus percipiatur; vt in pulſu ferrato, qui ferræ modo ferit digitos, aliis arteriæ partibus magis, aliis minùs diſtensis: & in pulſu vndoso, vbi arteriæ partes viciffim, vndarum inſtar ſeſe attollentium, diſtenduntur. Qui degenerat in vermiculantem, ſi paruus, frequens & languidus fiat; ac demum in formicantem, ſi omnium minimus, frequentiffimus & languidiſſimus euadat.

D. Quid ſignificat anomalia in ſitu, qualis in pulſu vibrato, & convulſivo percipitur?

C. Pulsus vibratus, magnam prodit inflammationem, aliūve acutum morbum, cum quo natura summo discrimine decertat.

Quid significet
1.

Pulsus autem convulsivus lethalem à siccitate convulsionem portendit.

D. Quid significat anomalia in motu, qualis in pulsu interciso, vel continuo, veluti serrato & undoso?

C. Pulsus singularis intercisus arguit impediri naturam. Si vitio instrumenti intercidatur, minùs periculosus; si facultatis imbecillitate, periculosior.

Pulsus serratus internam partium nervosarum inflammationem longè periculosissimam portendit.

Pulsus undosus serosorum humorum in corpore turgentium index est, ac interdum sudoris critici prænuntius. Cùm in vermiculantem degenerat, ac demùm in formicantem, exitialis; quia vitalem facultatem collapsam testatur.

D. Si anomalia systematica fuerit, quid in plurium pulsationum congerie considerabis?

Quid in anomalia systematica sit animadvertendum.

C. Diligenter animadvertam, num

certam inæqualitatis seriem seruent, an nullam prorsus circuitus formam retineant.

D. Quinam sunt pulsus inæquales ordinati?

qui pul-
sus inæ-
quales
ordinati.

C. Pulsus *μύεσι*, tùm *ἐκλείποντες*, deficientes, qui æqualiter imminuuntur, adeò vt primo pulsu secundus paulò minor sit, secundo tertius, tertio quartus, & pari modo reliqui donec deficient;

Tùm *παλινδραμῶντες*, denuò resurgentes, qui sensim ad pristinam redeunt magnitudinem.

D. Quinam sunt pulsus inæquales & inordinati?

qui inor-
dinati.

C. Pulsus *διαλείποντες*, intermittentes, in quibus vna aut altera deest pulsatio, nulla proportionem seruata; & *παρεμπιπτόντες*, coincidentes, vbi inter duas pulsationes tertia præter spem intercurrit, veluti superuacanea.

D. Quanam anomalia deterior?

Quæ ano-
malia pe-
ior,

C. Singularis anomalia deterior est, quàm systematica, quòd singulæ pulsationes labefactatæ maius portendant periculum, quàm inter plures inculpatas vna vel altera vitata.

Inæqualitas ordinata perniciosior est, quàm inordinata, quòd illa permanentem, hæc variantem causam arguat. Quæcumque à languente facultate proficiscitur, longè etiam periculosior, quàm quæ instrumenti vitio contingit.

D. Qua methodo sphygmicam artem circa corpus neutrum exercebis?

C. In corpore quod indifferenter se habet, nec planè sanum, necdum ægrum, ad morbi præcautionem, in còtrectando valetudinarii pulsu, diligenter animaduertam, si suam etiànum symmetriam seruet in qualitate & quantitate, vel ametros prorsus euaserit; ac si suum adhuc rhythmum retineat, in tēpore motus & quietis, vel à proprii rhythmici æqualitate & ordine recesserit. Quod percipiam; si tempus distensionis, temporì contractionis sit analogum, vel alterum ab altero superetur.

Quomodo
ad
Sphygmica
circa
corpus
neutrum
exercenda.

DE RESPIRATIONE.

D. Pulsus ad vitam tuendam apprimè utilis, expositus est: nunc aperias velim, an vitamunia solus obeat?

C. Minimè. Pulsus in vitalibus eden-

disactionibus, sociam habet Respirationem, quæ Græcis ἀναπνοή dicitur.

D. Quid est Respiratio?

Quid Respirationis.

C. Respiratio est motus inspiratione & expiratione constans, à facultate animali, ope musculorum editus, ad insitum calorem contemperandum, ac subministrandum spiritui vitali atque animali pabulum. Proinde motus est ex duobus motibus contrariis compositus, & gemina inter eos quiete, ad eundem prorsus modum quo & Pulsus. Eorum vno aër in pulmonem trahitur, thorace dilatato; altero ex pulmone excluditur, eodem subsidente & compresso. Ille πῦρ διασολῆ, hic πῦρ συσολῆ proportionem respondet. Quoniam enim maior est cordis flamma, quam ut possit arteriarum pullu temperari; aliam præstandi refrigerii rationem natura per respirationem machinata est, ut æstuante corde animalis facultas propriorum musculorum ministerio, thoracem vicissim attolleret atque deprimeret, quò pulmones dilatato thorace vnà attollantur diducanturque ad frigidum aërem

rem folliſ inſtar intra ſe pertrahendum, depreſſo autē iidem ſimul ſummittantur, ad excaſactum aërem & cum eo fuliginem omnem exprimendum. Hinc patet Reſpirationis & Pulſus uſum eundem eſſe, licet à diuerſa facultate ac diuerſis inſtrumentis illa peragatur.

D. Quotuplex eſt Reſpiratio?

C. Tot ſunt Reſpirationis, quot Pulſus differentiæ. Vt enim pulſatio, ita & Reſpiratio, eſt mediocris aut vehemens vel debilis, magna vel parua, velox vel tarda, crebra vel rara, æqualis vel inæqualis, ac inſuper facilis vel difficilis. Illa Græcis *εὐνοία*, hæc verò *δυσνοία*, vel *ὀρθονοία* dicitur.

Reſpirationis
differentiæ.

D. Quid Reſpiratio mediocris ſignificat?

C. Reſpiratio mediocris indicat vegetam eſſe facultatem, nec vlla inſtrumenta malè affecta, nec auctum, nec imminutum eſſe uſum.

Quid ſignificet
Reſpiratio
mediocris.

D. Quid Reſpiratio vehemens & debilis ſignificant?

C. Illa robustam, hæc inſirmam facultatem eſſe arguit.

Quid vehemens
debilis.

D. Quid magna & parua?

N

Quid ma-
gna, Par-
va.

C. Magna propter incendium, au-
ctum esse vsum indicat: parua verò
imminutum esse ostendit, propter ca-
loris refrigerationem, vel ob aliquod
respirationis instrumentum malè af-
fectum.

D. Quid velox & tarda?

Quid ve-
lox, Tar-
da.

C. Velox accidit propter auctum
calorem, vel partium respirationi di-
catarum angustiam, ac dolorem cum
febre. Tarda diminutum calorem in-
dicat, vel instrumenti alicuius læsio-
nem, dolorem.

D. Quid crebra & rara?

Quid cre-
bra.

Frequens
& magna.

Frequens
& parua.

Rara.
Rara &
magna.

C. Crebra maximam necessitatem
urgentem, vel facultatem oppressam,
aut prostratam, demonstrat. Frequens
& magna æstum ingentem designat.
Talis solet esse in febre ardente, tùm-
que feruidus spiritus ore naribusque
efflatur. Frequens verò & parua in-
firmas esse vires testatur, aut instru-
menta impediri, auctum tamen esse
vsum. Talis deprehenditur in flam-
matis visceribus, vt pulmone, dia-
phragmate, pleura, iecore, liene. Ra-
ra caloris natiui diminutionem præ se
fert. Rara & magna delirium pertinen-

dit. Rara & parua caloris inopiam, oppressionem vel extinctionem testatur.

Rara & parua.

D. Quid æqualis & inæqualis?

C. Æqualis Respiratio, facultatis robur, & organorum integritatem denuntiat. *Inæqualis* verò facultatis motricis imbecillitatem, vel asperæ arteriæ angustiam, obstructionem, compressionem denotat.

Quid æqualis?

Inæqualis.

Formidanda Respiratio, quæ inæqualiter interciséque ducitur, ut dupla videatur aëris intra pectus reuocatio. Funesta idem est, cum spiritus frigidus ore & naribus efflatur: aut spiritus propè totus per nares inspiratur & expiratur, pinnis contractis & dilatatis.

D. Quid εὐπνοία, διαπνοία & ὀρθοπνοία significant?

C. Εὐπνοία magnam vim habet ad salutem in omnibus acutis morbis, quodd pectoris & partium in eo contentarum temperiem renuntiet. Vnde spiratione integra manente, natius calor superesse demonstratur, qui vrgētimalo repugnare sufficiat. *Ex Hipocrate lib. i. Prog. & Gal. c. m.*

Quid significet εὐπνοία.

Dyspnœa.

Δυσπνοία verò mala, quia partium vitalium intemperiem designat.

Orthopnœa.

Sed multò peior & periculosior ὀρθοπνοία, quando æger non potest, nisi recta ceruice spirare, supinus cùm iacet suffocatur. Indicat enim ferinam destillationem in pulmones, anginam suffocantem, empyema, vel asthma incurabile.

D. Obiter abs te peto, an viuere quispiam possit Respiratione priuatus?

An quis
Respira-
tione
priuatus
uiuere
possit.

C. Interdum ita deficere videtur Respiratio, vt abolita putetur. Sed reuerà nequit aboleri, vita superstita.

D. Cur ita deficit Respiratio?

Defectus
Respira-
tionis
causæ.

C. Ἀπνοία defectus Respirationis triplicem habet causam, nempe angustiam maximam spiritum intercludentem, summiæ facultatis infirmitatem, & caloris inopiam, vt in syncope, & hysterica passione, in qua calor adeò refrigerat, vt solius transpirationis ope vita ad aliquod tempus foueri credatur, vt docet Gal. cap. 5. l. 6. de loc. aff.

DE ACTIONIBVS

Animalibus & Naturalibus.

D. Erudite Baccalauree, quoniam effe-

Etus est index sua causa; Actio autem la-
sa, primus est morbi effectus; unde præsenti-
tem & futurum eius statum indicat: ani-
males & naturales, nedum vitales fun-
ctioes examinanda sunt. Dum explora-
tis pulsū viribus, tacita mente per anima-
les actiones excurre, quid considerabis?

Cur ani-
mationes
animales
& natu-
rales, ne-
dum vi-
tales, sint
expendē-
dæ.

C. Imprimis considerabo si per-
maneant ægromens sana, Nam ἐν πάσῃ
νόσῳ τὸ ἐπὶ τῷ τῶν διαύσεων, ἀγασθόν, in om-
ni morbo mente constare, bonum: τὸ
δ' ἐναντίον, κακόν, desipere verò malum.

Cur prin-
cipes ani-
mæ fun-
ctiones
i. conde-
randæ, an
integre
vel læsæ
sint.

Aph. 33. l. 1.

Deinde si quidpiam imaginetur
æger, quod reuera non sit.

Ratioci-
natio.

Num si obliuiscatur eorum quæ po-
stulauit, vt phreneticus potionis, le-
thargicus matulæ. Nam mentis, ima-
ginationis & memoriæ lesio, affectum
esse cerebrum indicat.

Imagi-
natio.
memoria.

Pergam deinceps ad interiorē sē-
sum, vt somnum & vigiliam. Nam vt
ἀριστὸν τῶν νυκτῶν καὶ ἡμέρας, saluberrimum
noctu dormire; ita κακίστον μὴ κοιμᾶσθαι,
μῆτε τῆς νυκτὸς, μῆτε τῆς ἡμέρας, pessi-
mum est neque noctu, neque interdiu
dormire, quod vigiliis immoderatis
spiritus dissipentur & vires exoluatur.

2. Sen-
sus inte-
rior, vt
somnus
& vigilia.

Si somnolentus videatur æger, percontabor si somnus sit laboriosus, quia ἐν τῷ νοσήματι ἔπνος πόνον ποίει, διατάξιμον, in quo morbo somnus laborem facit, lethale. *Aph. 1. 1. 2.*

Tum si turbulentis agitetur insomniis. Terrifica enim insomnia triste quiddam portendunt.

Et exte-
riores,
visus, au-
ditus, gu-
stus, odo-
ratus.

Ab interiori sensu, ad exteriores transibo. Externos enim sensus vigere optandum est. Visum verò, auditum, gustum, odoratum deprauari, haud spernendum malum.

3. motus.

Posteà motum observabo, ad quem pertinet decubitus. Animaduertam obiter an in alterutrum latus, vel supinus, aut pronus, decumbat æger; quia decubitus supinus noxius est: proptereà quod incallescant renes, & multi vapores per spinam ad cerebrum ferantur. Solis idè morbis oculorum conuenit. Pronus verò decubitus, delirium portendit. Iis solis confert, qui colicis cruciatibus, aut ventris torminibus affliguntur. Accuratè verò perspiciam, si liberè se erigat æger in lecto, an veluti terræ pondusiners jaceat.

D. Dum naturalibus actionibus animi intendes, quid moliêris?

C. An vegeta, vel prostrata sit appetentiâ, primùm sciscitabor, quia
ἐν ἔχειν αὐτὸς τὰς ἀπορροεὺς, ἀποδόν: τὴν δὲ
ἐναντίον, κακὸν, benè se habere ad ea quæ
offeruntur, bonum: contrà verò, ma-
lum. Aph. 33. l. 2.

Cur ani-
maduer-
rendum
1. qualis
sit appe-
tentia.

Deinde num integra, vel læsa sit coctio, proprijs excrementis perdiscere conabor, deiectionibus prima, vrinis secunda, sudoribus tertia.

2. an co-
ctio in-
tegra sit
vel læsa.

Tum perquiram si excrementorum euacuatio, fiat κατὰ φύσιν, vel παρὰ φύσιν, id est certo modo, ordine & tempore, vel contrà; vt inde conii-
ciam naturalis œconomix statum.

3. an al-
ius benè
vel malè
suo mu-
nere fun-
gatur.

DE VRINIS.

D. Medicus tacto pulsu, ac perspecta ægrotantis respiratione, actionibusque animalibus & naturalibus expensis, ad vitales, animales & naturales vires explorandas, Urinam diligenter inspicit, ad morbi dignosim consequendam. An in Vroscopia æquè sis, atque in arte Sphygmica versatus, tentare placet. Quid est urina?

Trāitus
ab actio-
nibus, ad
excreta.

C. Vrina est liquidum venosi generi excrementum, ex secunda coctio-

Quid Vri-
na?

ne alimenti in hepate facta proditum,
 à sanguine in renibus segregatum &
 ad vesicam delatum, in qua suam ac-
 cipit formam. Excrementum illud
 nihil aliud est, quàm serum quatuor
 humorũ, corpori nutriendo ineptum,
 quod sanguinem ab hepate quoquo-
 uersum per venas, ad singulas corpo-
 ris partes alendas deducit, (vnde *σφοδρὴ*
ἰχθυα, alimenti veliculus, ab Hippo-
 crate vocatur;) eoque munere perfun-
 ctum, insita facultate à renibus per
 emulgentes attrahitur; atque hinc per
 vreteras in vesicam demittitur, & à
 vesica foras per vrethram excluditur.
 Vnde vrina constitutionis partium
 plurimarum quas attingit, bonæ vel
 malæ, nuntia est. Pars enim quælibet
 benè vel malè affecta, affectionis suæ
 notas vrinæ transeunti inurit: quo-
 niam diathesin suam humoribus in se
 contentis impertit, quorum vrina
 comes est.

*D. Quos, & quarum corporis partium
 affectus præter naturam indicat vrina?*

*C. Vrina morbos omnes ex humo-
 ribus quantitate & qualitate peccan-
 tibus ortos demonstrat; vt febres non*

Quos
 partium
 affectus
 Vrina do-
 monstrat.

modò continuas, quæ in maioribus venis sedem habent, sed & intermittentes, aliósque affectus in prima & tertia, nedum in secunda corporis regione, humorum vitio contractos: quòd antecedens morbi causa duplex, plethora & cacochymia, à quâ ille primùm fit, deinde fouetur, in venoso genere consistat, ac vtriúsque coctionem aut cruditatem, proinde morbi statum, & quatuor tempora, quæ morbifici humoris *ἀμύλια*, vel *πρωτογενή* distincta sunt, certò referat.

Lotium verò, non modò iecoris, quod functionum naturalium princeps est organum, venarumque principium, in quo fit hæmatosis; sed & partium per quas illabitur, vt renum, vreterum, vesicæ ac penis affectus, & continentem eorum causam repræsentat. Nam tamen si non diutiùs in his subsistat, ac hæreat; ab illis tamen sordes & inquinamenta (si qua insunt) præterfluens corradit, & secum rapit. Itaque vna Vrina de toto ferè decidua, significationem imprimis generalem sortitur.

Quarum
partium
characte-
rem im-
pressum
& inustam
notam
Vrina re-
ferat.

N

D. Quæ sunt in Vrinis consideranda?

quæ in
Vrinis
confide-
randa.

C. Duo in Vrina qualibet imprimis consideranda veniunt, ῥῆμα, liquor, id est liquidum vrinæ corpus, & παρυσίασμα, contentum, id est subsistens corpus liquori adiunctum, quod homogeneon, vel heterogeneon existit. In liquore εὐστασις consistentia, & accidencia duo, quantitas & qualitas, in qua color & odor spectantur. Paryphistamenon homogeneon, cuius materia est eiusdem generis, pro varietate loci, in quo continetur, triplex existit: ὑπέρσκις sedimentum, quod in imo subsidet: ἐναιώρημα, suspensum, quod in medio stat: & νεφέλη, nubes, quæ in sublimi natat. Paryphistamenon heterogeneon, cuius materia est diuersi generis, licet ab homogenei cōtenti natura degeneret, nihilomin⁹ vel in infima vrina, perinde vt illud subsidet, vel per mediam Vrinam volitat, vel per summam Vrinam innatat. Inter heterogenea in fundo hærentia, extant corpuscula quædam farina crassiori vel squamulis, vel fur-

furi similia, interdum subsidentia, quæ ab Hippocrate *ὑπερίσκιες κριμνώδεις, πεταλώδεις, & πυρρώδεις*, dicuntur, i. sedimenta farinacea, squamosa, & furfuracea. Præter hæc in vrina nonnunquam subsident concretus sanguis, pus, arenulæ, mucus.

In medio Vrinæ volitant, & interdum quoque fundum, aut superiora petunt, corpuscula filamentis & pilis similia : In superficie vrinæ quatuor præter naturam apparent : corona, bullæ, spuma, pinguedo. Ab hisce omnibus plures emergunt Vrinarum differentiæ, aliæ essentielles, aliæ accidentales.

DE VRINARVM

differentijs.

D. Recense singulas Vrinarum differentias?

C. Essentiales Vrinarum differentiæ petuntur à systasi, à qua tenuis, vel crassa aut mediocris appellatur; ac infus per clara, quam visus acies penetrat, aut turbulenta, per cuius medium non videmus : quæ in tres differentias discernitur à Fernelio, quarum vna, licet clara fuerit emicta, mox tamen tur-

Vnde sci-
mantur
Vrinarū
differen-
tiæ, essen-
tiales.

N. vj

bata externi frigoris vi euafit, ſed igni expoſita promptè declaratur : altera turbida quidem meitur, ſed ſpontè ſubſidentibus partibus craſſioribus tandem inclareſcit : tertia confuſa nuncupatur, quæ turbata meitur, nec externo calore, nec ſpontè clareſcit.

Acciden-
tales.

Accidentales verò differentiæ ſumuntur à quantitate, à qua multa vel pauca dicitur vrina, & à qualitate. Ratione coloris alia alba vel aquea, alia intèſè vel remiſſè nigra, ad quam rubra, viridis & liuida pertinent: alia inter vtrámque extremam mediæ ſunt, vt pallida, citrina, flaua vel ſubflaua, ruſa vel ſubrufa. Ratione odoris dicitur ſuauiſ vel graueolens, pro vario item ſedimento varia ſortitur nomina.

Ab heterogeneis contentis, alia farinacea, alia ſquamofa, alia furfuracea, alia cruenta, alia purulenta, alia arenofa, alia mucofa, alia capillis conſperſa, alia coronata, alia πομφολυγιδης bullans, alia αφρώδης ſpumans, alia pinguis, vel oleofa denominatur.

DE VRINARVM CAUSIS.

D. Harum differentiarum cauſæ, ac-

curatē sunt inuestiganda, ut ijs cognitis certius decernatur iudicium. *Vrina tenuis, crassa, ac mediocris, claraque & turbulenta, causas expone?*

C. *Vrina fit tenuis cruditate, aut obstructione. Cruditate, cū calor natiuus imbecillior liquorem co-* Cause
vinarū;

Tenuis.
quendo crassum efficere nequit. Obstructione, cū id tantū quod tenue est percolatur, crassum relinquitur. Nephriticorum vrinę sunt tenues obstructione: hepaticorum & stomachicorum, quibus frigidior & imbecillior ventriculus, infirmum iecur, cruditate.

Vrina fit crassa alieni ut crudi humoris permistione, aut viarum laxitate. Mulieres utraq; causa crassas reddunt vrinas. Habent enim collum vesicę breue, sed latum, ac cruditatibus multis abundant. Crassas.

Temperatus calor mediocrem dat consistentiam. Siquidem natiuus calor alimentum, humoresque concoquens, primū quidem & maximē substantię mediocritatem molitur, cui dein pro partium natura colorem addit. Medio-
cris.

Clara.

Vrina nedum tenuis, sed & crassa, potest esse clara. Multa quippè crassa, vt oleum, vitrum, sunt perspicua.

Turbata.

Vrina eorum, qui vinum album tenue largiùs potarunt, est tenuis; attamen clara & pellucida. Talis redditur ab ægri coctione. Vt enim vrinam frigore turbatam declarat moderatus ignis, sic perspicuam efficit temperatus color natiuus.

Turbida.

Turbida plerùmque ex renum aut vesicæ abscessu, vlcere, aliisque vitiis manat; è quibus cruor, sanies, pus aut mucus profluit. Quæ citra hos affectus fuerit, crassorum humorum copiam in venis, horùmque effusionem renuntiat. Sæpè etiam vrina repentè turbida euadit, cum solutis obstructionibus, apertisque viis crassior materia diu cohibita excidit è liene, iecore, renibus, aut è venis maioribus, quod ferè sanis post exercitationes, ægrotantibus post morbos obuenit, maximè in crisi diuturnarum febrium, in lienis, iecorisque morbis, & in abscessuum eruptione. Turbida vrina vino comparatur, quod fecis permixtione turbidum est.

Confusa vrina, quæ nec spontè, nec externo calore depuratur, fit insigni putredine & corruptela humorum qui in maioribus venis continentur. Idcirco comparatur vino vetustate acido, fulgure aut tonitruï strepitu corrupto, quod vappa dicitur:

D. Quid causa sit cur interdum, tum crassa, tum tenues vrina, ne vel ingenti frigore quidem; interdum verò temperato etiam loco turbentur, scire velim?

C. Id non nisi ad insitum vrinæ calorem referri potest, qui vt hypostasin, ita & cæteras partes locis distinguit, quem constat aliàs languidum, aliàs valentem esse.

Cur aliàs
turbetur.
aliàs non
turbetur
vrina.

D. Quanam sunt Vrina copiosioris & parçioris causa?

C. Multa Vrina interdum ex immoderato potu vini tenuis vel aquæ, vel ex diureticis medicamentis obtingit: vel ex aliarum euacuationum, vt sudoris & deiectionis, suppressione: quandòque copiosior emittitur calida & sicca intemperie renum, qui vi maxima ex omni corpore serum proliciunt, assiduaòque profundunt, vt in diabete: vel corporis totius colliqua-

Causæ
copiosioris.

&
Parcioris
vrinæ.

tione, vt in febribus ardentibus. Aliquando à serosi humoris destillatione è cerebro per spinam dorsi ad renes, inde ad vesicam irruente : Nonnumquam à natura morbum per vrinæ vias iudicante. Parcior verò redditur vrina, cùm parum bibitur, ac siccioribus eduliis viuitur : vel cùm humiditas ardore febrili consumitur : vel cùm vrinæ materia aliò transfertur. Vnde qui multum sudant aut deiciunt, parum meiunt ; quia serosus humor ad corporis habitum vergit, aut ad alnũ auertitur. Hydropicis etiam parcior sit vrina, sero à renibus non attracto, sed in abdominis capacitatem translato. Sæpiùs autem vrinæ paucitas ab obstructione nascitur. Sic Nephriticis lotium retinetur obstructis vrinæ ductibus.

D. *A quantitate, ad qualitatem vrinarum, in colore & odore pergamus. Causa colorum, quibus tinguntur, peruestiganda. Quibus causis vrina colorantur?*

Causa
colorum
qui in
vrinis ap-
parent.

C. Tribus causis vrinæ variis coloribus inficiantur : primùm, alteratione, vt cruditate, coctione, vstione : secundò, reialicuius, vt sanguinis, puris

permistione: tertio, dominatu feri. At cuiusque humoris suum est serum, sanguinis rubrum, bilis flauum, pituitæ album, melancholiæ nigrum. Refert autem vrina colorem feri dominantis. Serum verò copiosius, ostendit eum humorem abundare, cuius est serum. Nonnunquam assumpti alimenti, aut medicamenti colore, tinguntur vrinæ. Sic epotum rheum concolorem vrinam reddit. Ordinarius potus decocti radicis oxalydis, rubram facit vrinam.

D. Albarum & nigrarum vrinarum causas explica?

C. Vrinæ fiunt albæ & aqueæ, vel cruditate, vel albi alicuius, vt chyli, feminis, aut puris permistione, aut feri pituitosi copia: aliquando priuatione bilis, vt in ardenti febre, quando illa ad cerebrum rapitur, instante delirio. Tum enim phreneticis alba cernitur mictio, absentiâ bilis, qua solet vrina colorari.

*Causæ
vrinarum
albarum.*

Nigræ fiunt contrariis causis, humorum scilicet vstione, humoris melancholici vel atrabilarii mistione, vel feri melancholici dominatu. Non

Nigrarum.

est nouum morbos melancholicos, vt quartanas febres, vrinis nigris terminari, humore morbifico per vrinas excreto.

D. Recense etiam causas urinarum adnigram pertinentium?

Rubrz. C. Vrina rubra fit sanguinis permistione, vel seri sanguinis dominatu; vel affatione incipiente.

Viridis. Viridis autem maiori vstione, aut bilis porraceæ permistione.

Liuidæ. Liuida aucto vstionis gradu, aut bilis ceruleæ mistione.

D. Persequere causas Vrina pallida, citrina, & aliarum ad citrinam accedentium.

Pallidæ,
Citrinæ,
Flauæ,
Subflauæ,
Rufæ,
Subrufæ,
C. Omnes fiunt à calore mediocri. Vnde cum vrina album colorem permutat pallido, aut flauo, bonum. Arguit enim coctionem inchoari. Sin autem in rubrum, viridem, aut liuidum mutetur, malum omen.

D. Fœtida Vrina causam exprime?

Fœtidæ. C. Fœtor interdum assumptorum, vt putris casei, vel alliorum vsu, contrahitur: interdum è renum aut pudendi vlcere procedit. Nonnunquam ex superioribus locis proficiscitur, ab

humore, aut partis cuiusdam substantia putrescente.

D. Patefecisti causas substantia & accidentium chymatis Urinarum, de Paryphistameni homogenei & heterogenei causas deinceps agendum. Quid propriè vocas paryphistamenon homogeneon?

C. Paryphistamenon homogeneon voco, crassiores urinae partem, quæ ortus sui causam duxit, ex sanguinis portione minùs elaborata, corporis nutritioni minimùm idonea, insiti caloris vi secreta & in imum depulsa; quandoque sursum repulsa, vel in medium, vel in sublime. Vnde sedimentum, vel enæorema, vel nubes appellatur.

D. Cum Paryphistamenon homogeneon penitus consanguineum videatur, quòd in venoso genere ex hamatoseos reliquijs ortum fuerit, cur hypostasis, enæorema & nubes loco dissident?

C. Causa cur loco discludantur, ab homogenei contenti cruditate, aut coctione dependet. Cum enim Paryphistamenon crudum sit, vel coctum: crudum autem spiritu flatulento turgat, qui coctione discutitur; si per-

Quid paryphistamenon homogeneon.

Cur paryphistamenon homogenea loco dissident.

exiguus, vel nullus, superfit flatus, qui sursum materiam cōtentam impellat, hypostasis in imo subsidet: si verò multus flatus in fundo luxuriet, qui materiam contentam ad medium efferat, enæorema in medio suspensum hæret; sin autem plurimus flatus ad liquoris superficiem vsque materiam contentam attollat, in sublimi nubes apparet.

D. Eademne sedimenti materia est in urinis sanorum atque aegrorum?

An sit
eadem se-
dimenti
materia
in sanis
atque æ-
gris.

C. Hypostasis in ægris non modò fit ex reliquijs secundæ coctionis, quæ in nutrimentum partium mutari non potuerūt, sed etiã ex materia morbifica.

D. Ad heterogeneousorum in Urinis contentorum causas transeamus. Quibus ex causis fiunt κρινωδεις, πιταλωδεις, & πιτυρωδεις & σποδασις, sedimenta farinacea, squamosa, & fursuracea?

Causa hy-
postaseos
farinaceæ.

C. Κρινωδης & σποδασις fit à colliquatione, vel vniuersi corporis, vel renum duntaxat. Si citra febrem apparuerit, renes duntaxat afficiuntur; sed si subfidentia in febre ardente farinam crassio-rem referat, sanguinem ardore febrili torrefactum arguit, & in carne

quicquid tenerum & adipale inest liquatum, & carnem denique ipsam duriolem, non secùs atque ea quæ in sartagine pertorrentur exarefactam.

Πεταλώδης squamosa ab eadem causa, Squamosa.
sed vehemētiore, efficitur; cùm febris sz.
tanta est, vt non modò carnes, sed partes etiam solidiores inæqualiter colliqueſcant.

Πιτυρώδης furfuracea fit à longè vehementissimo calore febrili, solidas partes supra modum colliquefaciente, vrente, & resiccante. Itaque nisi Furfuracea.
πιτυρώδεις & πιτυρώδεις ὑψιστάμυνα sece- sz.
dant à vesica scabie affecta, summum ardorem in sanguine testantur, quo interior tunica venarum ab acerrimo succo abraditur, desquamatur, & in furfures resoluitur.

D. Cruenta, purulenta, arenosa & mucosa urinae causas aperit?

C. Aliquando subsidet sanguis in grumum concretus, vnde cruenta urina redditur, aperta, rupta, aut exesa in renibus aliqua vena, puta dum à grādiore calculo atteruntur. Causa
vrinae
cruentæ,

Quandòque pus ab aliquo renum &
Purulenta.
aut vesicæ abscessu conferim, aut vl- sz.

Qui di-
stingua-
tur pus à
semine,
&
à pituita.

cere, paulatim simul cum vrina efflu-
xit, quod suo pondere fundum
petit. Ideò discernitur à semine, quod
semper innatat vrinae, propter suam
tenuitatem & leuitatem. Distinguitur
etiam à pituita, quod hac, licet quiete
subsideat, crassa tamen sit, atque te-
nax, sibi que cohæreat; illud verò agi-
tatum mox dissoluatur ac diffuat.

Causa
arenosæ,

Arenosa vrina procedit à calculosa
renum constitutione, nedum à cali-
diori eorum intemperie.

&
Mucosæ
vrinae.

Mucosa vrina cum dolore emicta,
fit à crassa pituita, quam vesica cumu-
lat, quia frigida & membranosa exi-
stet. At quæ nullo dolore fluit, è reni-
bus, vel circumpositis partibus affe-
ctis, illabitur.

*D. Vnde prodeunt filamenta albis capil-
lis similia, in vrinis volitantia?*

Vnde
prodeant
filamenta
per mediā
vrinam
volitan-
tia.

C. Filamenta albis capillis similia,
à renibus reddi, author est Hippocra-
tes. At Fernelius animaduertit ea sæ-
pius ex ijs vasis spermaticis deriuari,
quæ parastatae dicuntur, in quibus
teretem figuram sortiuntur ex seminis
materia, quæ vi morbi sensim defluēs
calore crassescit.

D. Putásne in mentem venisse Hippocrati, pilorum mictionem, quam τειχισμὸν Græci vocant, à solutarenium substantia prodire?

C. Minimè. Sed pilos quibus Vrina conspergitur, à crasso & viscido humore in renibus exsiccatò, torrefacto & in fila conglobato natos, Hippocratem voluisse reor.

D. Supersunt heterogenea quæ per summam Vrinam innatant; inter quæ corona primas tenet. Quid est corona?

C. Est circulus ambitu suo supremam Vrinæ faciem cingens.

Quid corona.

D. In qua Vrina conspicitur corona?

C. In ea, cui partium dissimilitudo quædam inest, aut humorum exagitatione, aut color aliquis magis tinctus.

In qua vrina appareat.

D. Quo colore prædita est?

C. Corona varij coloris est, pro vario humore à quo gignitur, quem repræsentat.

Quo colore prædita.

D. Vnde spuma & bullæ oriuntur?

C. Spuma & bullæ constant ex eadem materia. Spuma enim nihil aliud est, nisi multæ bullæ aggregatæ & coherentes. Generantur autem bullæ à flatu in viscida materia incluso, qui

Causa spumæ & bullarum.

cùm exhalare nequeat, materiam in tumorem attollit. Dum enim flatus in materia tenaci agitantur, neque faciliè transire possunt, bullæ proueniunt; atque quò humor is est viscidior & flatus crassior, eò diutius spuma & bullæ durant.

D. *Quam ob causam Vrina pinguis fit?*

Causa
pinguedi-
nis in vri-
nz super-
ficie in-
natantis.

C. Nisi Vrina ab epoto oleo oleosa euaserit, pinguedo supernè innatans à liquato renum adipe, vel à corporis totius colliquatione gignitur.

DE SIGNIS MORBORVM,

que sumuntur ab Urinis.

D. *Hactenus Vrinarum differentias & causas enarraſti, ſupereſt vt quid ſingula ſignificent breuiter explices. Sed vt vera ſignificatio haberi poſſis, antequàm de ſingulis decernas, Vrina, qua fida morborum nuntia eſt, ab ea qua fallax eſſe conſuevit, accuratè diſtinguenda?*

Quæ vri-
na mor-
bos certò
denun-
tiet.

C. Vrina, quæ nulla inquinatur permiſſione rerum externarum, quarum qualitatibus immutatur, interiores partium & humorum affectiones certò denuntiat.

D. *Quenam reſ externa propriam vri-
na indicationem peruertunt?*

C. Potus

C. Potus immoderatio, præsertim aquæ, aut vini albi tenuis, copiosiorē urinam profundit, eamque tenuem & crudam; & quæ, quoniam præproperè perlabitur ac præterfluit, nec partium, nec humorum affectiones, nec qualitates expressas exquisitè refert. Non pauca etiam vel mediocri usu urinam colore inficiunt, ut crocus, cassia, rhabarbarum, senna, rubia maior: quædam alieno illam odore perfundunt, ut allium & terebinthi lachryma. Horum enim qualitates urinam immutant. Itaque cauendum ne Medici iudicium fallant.

quæ præ-
pria uri-
næ signi-
ficationē
peruertit.

D. Quid substantia & accidentia chymatis Urinarum significant, sigillatim deinceps perpendamus. Quid urina tenuis, crassa & mediocris indicant?

C. Urina tenuis & aquea, nisi manifesta sit obstructio renum, ut in nephritide; vel hepatis aut lienis, ut in quartanis febribus: cruditatis est soboles. Tam exiguus interdum calor est, ut aquam aliūve potum talem labi sinat, qualis acceptus fuerat. Propterea tenuis urina mētur in principio morbi, dum cruda sunt om-

Quid in-
diceret Uri-
na te-
nuis.

nia. Incipit enim crassescere incremento, quia tunc coctio inchoatur.

Crassa.

Crassa vrina, nisi ex laxioribus patientioribusque viis vrinae profluat, oppressi caloris nota est, quod calor insitus crudorum humorum exuperantia prematur.

Mediocris.

Vrina mediocris consistentiae vegetum calorem, exquisitamque concoctionem ventriculi, iecoris atque venarum ostendit.

D. *Quid clara & turbida significant?*

Quid clara.

C. Perspicua vrina perfectam concoctionem, humorum bonitatem, & caloris nativi summam vbertatem ostendit, cuius vis etiam in vrina permanens hypostasim tandem secernit & distinguit.

Turbata.

Quæ, cum primum miecta est, turbatur, & igne clarescit, principium coctionis arguit.

Turbida.

Verè turbida, quæ ex renum aut vesicæ affectibus non proficiscitur, diuturnos contumacesque morbos, & capitis dolores, à crassorum humorum copia oriundos, indicat. Vnde Hippocrates: Quibus vrina turbida, qualis iumentorum est, iis capitis dolor vel

adeſt, vel aderit. Perſeuerans autem diutiùs, aut vcternum, aut lethargum minatur.

Confuſa quæ igne non clareſcit, Confuſa
ſanguinis & humorum, qui in venis ſunt maioribus, confuſionem, corruptionem & putredinem portendit, eamque ferè malignam. Quocirca in ſolis continuis febribus, iſſque periculofis ea deprehenditur.

D. Quid vrina copia & paucitas indicant?

C. Niſi copioſioris vrinæ euident Vrina multæ
ſit cauſa, vt potus multus, diureticorum uſus, aliarum vacuationum ſolemnium ſuppreſſio, catarrhus, aut colliquatio totius corporis; probabile eſt morbum vrinarum copiâ ſolutum iri.

Niſi paucioris vrinæ ſit manifeſta Paucæ
cauſa, vt paucus potus, inſignis ſudor, alui profluuium, aut ingens incendium, à quo vrinæ materia reſoluatur; coniectura eſt vrinæ vias calculo, aut muco obſideri.

D. Quid ſinguli vrina colores ſignificant?

C. Colores extremi, & qui ad illos

accedunt, humorum cruditatem, aut
vstionem, plùs minùs indicant.

Vrina al-
ba;
nigra.

Vrina enim alba cruditatis, nigra
vstionis nota est; nisi talis sit, alicuius
albi aut nigri permistione. Distinguè-
tur potissimùm hoc signo; quòd ea-
rum, quæ alteratione sola præter na-
turam colorantur, tenuis sit consisten-
tia; earum verò quæ permistione,
crassa.

Alba &
tenuis.

Alba ergo & tenuis, cruditatem
ostendit: aut bilem aliò, vt ad cerebrũ,
translatam. Hac in acutis, febribus
delirium minatur.

Alba &
crassa.

Alba & crassa, crudæ pituitæ sobo-
les est.

Nigra & tenuis vrina, lethalis est;
quia summæ vstionis, aut extincti ca-
loris, est index.

Nigra verò & crassa, non est per-
petuò lethalis: quia multi morbi me-
lancholici iudicantur vrinis nigris.

Rubra &
tenuis.

Rubra & tenuis, quæ flammea, ar-
dentem febrem indicat, & iecur im-
modicè calens, qualis si perseveret, in-
teritum portendit.

Rubra &
crassa.

At si rubra simul & crassa fuerit,
qualis in synocho sæpè redditur, aut

bilis rubræ copiam, aut affari sanguinem ostendit, nisi talis sit permistione sanguinis: quod accidit dum renes à calculo atteruntur: sed tum vrina cùm refrixit, sedimentum velut concreti sanguinis exhibet.

Vrina viridis fit summo incendio: Viridis,
liuida, natui caloris extinctione. Liuida.

Medii colores, vt pallidus, citrinus seu subaureus, rufus, flauus, subflauus, qui sunt extremis illis interiecti, coctionis sunt indices, præsertim si colore mediocris consistentia attestetur.

Pallida;
Citrina;
Rufa;
Flaua;
Subflaua;

D. Quid odor vrina denuntiat?

C. Odoris suauitatem vix sperare licet ab vrinis, nisi vel terebinthina, vel odoratiore medicamenti vi affletur. Fœtor autem, si nec assumptorum usu, nec renum aut vesicæ vicio contractus fuerit, ex superioribus locis prouenit. Fœtida verò vrina inde profluens, siue rubrâ turbidâque sit, siue tenuis ac perspicua, putredinis semper est index: eâque putredo aut in humoribus, aut in partium substantia consistit. Si recens est fœtor & repente natus in vrina crassa ac turbi-

Quid vrina graueolens significet

da, humor: sin vetus ac diuturnus in vrina tenui ac perspicua, partis cuiusdam substantia putrescit.

D. Hucusque declarasti quid designet Vrina chymosis, nunc quid paryphistamenon homogeneon & heterogeneon indicet, aperias velim. Illud triplex, hypostasis, enaorema & nubes. Quid significat hypostasis?

Quid hypostasis indicet.

C. Hypostasis morbifici humoris coctionem significat, si laudabilis sit.

D. Quale debet esse sedimentum laudabile?

Hypostasis optimatur.

C. Sedimentum illud optimum est, quod album, læue & æquale conspiciatur. Venæ siquidem materiam morbi coctione dealbant, ac læuem id est vnitam; non diuulsam, & æqualem, id est vbiq; & perpetuò sibi similem, reddunt; non vna parte coctam, altera crudam; nec hodie coctam, cràs crudam. Itaque quò candidior, læuior & æqualior hypostasis erit, eò melior, quia certiùs naturæ victoriam demonstrat. Quæ ab hac recedit, mala; & quò longiùs discessit, eò deterior.

D. Hypostasis, quæ non fuerit alba, nec

levis, nec aequalis, quid demuntiat?

C. Substantia quæ non fuerit alba, quid arguet hypostasis
 humorem peccantem, cui concolor
 est, abundare demonstrat, flaua bilem; flaua,
 rubra sanguinem aut rubram bilem; rubra,
 nigra melancholiam vel atram bilem; nigra,
 viridis bilem porraceam aut æruginosam; viridis,
 violacea glasteam. Quæ diuisa violacea; Diuisa.
 est, non vnita, ostendit à flatu factam perturbationem in imo corporis. Inæqualis, diuturnum fore morbum portendit: eiúsque dubiū euentum, quia fit ex humore cocto & incocto. Inæqualis.

D. Quid enæorema & nephelion significant?

C. Vt hypostasis robustam, sic Quid enæorema & nubes indicent.
 enæorema nondum firmam, ac nubes
 etiamnum infirmiorē naturam arguit. Cū enim paryphistamenon
 homogeneorum materia communis
 sit, potens calor eam coquit, incrassat,
 secernit, & in imum deturbat; Minus
 potens eam in medio suspensam relinquit:
 Adhuc impotentior in sublimi; adeo ut inferiora paryphistamena
 sublimioribus perpetuò præsentent.
 Imbecillitas verò maxima significa-

tur, si nullum toto morbi progressu, in vrinis, appareat paryphistamenon. Licit enim nequaquam necesse sit, in lotio sanorum aut ægrotorum conualescentium extare perpetuò sedimentum, quòd in oligodiatòn vrinis nihil quòdque subsideat; ac biliosi nonnunquam morbi, sine sedimento feliciter terminentur: melior tamen & multò securior habetur vrina, quæ nò modò substantia mediocri est, nec instat aquæ tenuis, nec vt iumentorum crassa, clara, non turbida, colore subaureo, sed in qua etiam hypostasis subsidet alba, lauis & æqualis. Talis enim cæterarum quasi lex est, & regula, vt quæ concoctionem inculpatam indicet.

Optima
vrina
quæ.

D. Eadèmnè vrina tibi videtur in omnibus sanis semper obseruari?

Vt mutetur tēperamentum, sexu, ætate, victus ratione, anni tempore.

C. Minimè. Temperamento quippe, sexu, ætate, victus ratione ac cæli constitutione mutatur. Nam biliosi coloratior est vrina, quàm pituitosi; viri, quàm mulieris; iuuenis, quàm senis. Pituitosi verò crassior est quàm biliosi, mulieris quàm viri, quia multa superuacanea vt in vterum, ita in ve-

ficam vndique conflunt: puerorum
quàm ætate florentium, propter in-
gluuiem: senum propter caloris im-
becillitatem, cruda est, tenuis, alba.
Copiosior & crassior hominum qui
intemperanter, quàm qui frugaliter
viunt. *Gal. 2. Prognost.* scribit, quòd
vrina sedimentum nullum habeat, si
tenuiter viuitur: copiosum, si largiùs;
exiguū verò, si modicè viuitur. Æsta-
te parciore redditur vrina, quàm hye-
me: quia multum feri sudore & insen-
sibili transpiratione resoluit æstus.

*D. Ab homogeneis ad heterogenea con-
tenta pergamus. Quid ἰσχυρὰ καὶ κενώ-
δεια portendunt?*

*C. Quæ subsident in vrinis crassa-
menta farinæ crassiori similia, Hip-
pocrati longam inualitudinem signi-
ficant, propter pepasmi difficultatem.*

D. Quid πταλώδεια καὶ πτυσώδεια?

*C. Si quis squamulas minxerit, &
gravis odor adsit, vesica exulcerata
est.*

At si citra vesicæ exulcerationem
excutiunt, febris ardens interiores vaso-
rum tunicas colliquefacit, & velut in
lamellas dissolvit. Vnde & solidarum

*Quid
ἰσχυρὰ καὶ
sedimen-
ta signifi-
cent.*

*Quid
πταλώδεια
καὶ πτυσώ-
δεια.*

partium consumptio inest.

Quid
cruenta
& puru-
lenta vri-
na.

Quibus in Urina crassa quædam fursuri similia exeunt, ijs vesica scabie laborat. At si hæc in Urina tenui apparent, colliquatæ febris ardorem denuntiant, ob quem & venarum sanguis retorretur, & earum substantia incendio perusta solidum quiddam quasi intertrimentum deperdit, abiicitque, quod cum urinis emititur.

D. *Quid cruenta & purulenta Urina significant?*

Quid
cruenta
& puru-
lenta vri-
na.

C. Si sanguis & pus cum Urina reddatur, renum aut vesicæ exulcerationem significat, inquit Hippocrates Aph. 75. l. 4.

Quandoque pus à partibus diaphragmate superioribus manat, sed tunc æqualiter id permiscetur Urinæ: dum verò à renibus & vesica proficitur, non æqualiter permiscetur Urinæ. A vesicæ ceruice, ingenti partis dolore manat; à renibus, nullo ferè sensu doloris.

D. *Quid arenosa & mucosa Urina significant?*

Quid are-
nosa &
mucosa.

C. Arenulæ cum Urina postremæ

prodire solent. Rubrae & flavae à renibus; albæ à vesica proficisci creduntur. Si copiosæ illæ fuerint, & crassiusculæ, calculum minantur. Earum quippè adhæsu calculus milij vel hordei magnitudine concrevit, qui cum è renum substantia in capacitatem excutitur, Urinas crassas, turbidas, rubras aut subnigras reddit, impendentis nephritici doloris indices. Calculus in caput vreteris insertus dolore excruciat: ac tùm Urinae tenues & albæ, quales in omni ferè renum infarctu cernuntur.

Crassior pituita instar mucinarium matulae fundo inhærescens, cum dolore emicta, vesicae calculum, aut cervicis sordidum vlcus denuntiat, auctore Fernelio. Sed Sennertus, salua vesica, inculpatisque renibus, cum maximo in meiando cruciatu, taleñr materiam per aliquot septimanas continuo tanta copia cum urina eiici vidit, vt impossibile videatur, illam saltem à vesica vel renum vlcere profuixisse: verùm cacochymiae in partibus ultra renes sitis soboleam fuisse censet, quam naturæ per hanc

324 *N. Ab. Frambesarij*
viam euacuare placuit.

D. Quid filamenta albis capillis similia in urinis volitantia significant ?

Quid filamenta albis capillis similia significant.

C. Spermaticæ materiæ corruptelam, à fœda gonorrhæa relictam, recludunt; atque fœdam vteri colluviẽ, in mulieribus quibus albicantes menses profluunt.

D. Persequamur heterogenea in superficie urinæ contenta. Quid significat corona?

Quid corona significet.

C. Corona ferè docet qualis in vasis maioribus sanguis habeatur. Nam tenuis & alba dilutum sanguinem & fero tenui perfusum ostendit: crassa & alba pituitosum, citrina naturalem: crocea bile multa, eaque flaua, conspersum: rubra & ardens, feruidum & accensum: viridis bile prassina vel æruginosa, cærulea & liuida vel naturali melancholia vel atra bile inquinatum, aut hunc certè in eorum humorum naturam corruptione mox abiturum.

D. Quid spuma & bulla significant ?

Quid spuma & bulla significant.

C. Spuma multa citra urinæ agitationem innatans, flatu arguit plurimos in corpore vagari, ventriculū & intestina distendi, colicum dolo-

rem imminere, idque vel fructuum
vel leguminum immoderato esu, vel
infiti caloris imbecillitate. Ea si ma-
gnis bullis diu perseveret, crassos &
viscosos humores, ex hisque obstru-
ctiones indicat: at si leui causa hæ bul-
læ rumpuntur atque dissoluuntur, te-
nuem flatum, tenuésque humores.
Si bullæ parvæ & exiguæ per vrinæ
coronam dispositæ sunt, capitis do-
lor adest; cephalalgia quidem, si coro-
nam omnem; hemicrania verò, si illius
solum medietatem occupent: acriór-
que dolor erit, si aureæ sint & citrinæ;
mitior, si albæ & pallidæ; diuturnus
verò, si diu permaneant. Quæ porrò
media vrinæ facie consistunt, pacati
doloris sunt indices. Cum enim sum-
mam vrinæ partem teneant, ipsum
quoque caput in homine summum
dolore obsideri testantur; idque vel à
flatu, vel ab humore, cuius speciem
bullarum color exprimit. Bullæ gra-
nis exiguis similes in corona sitæ, si
dum versatur & agitur vrina deor-
sum versus depulsæ, mox in coronam
resiliunt, destillatio è capite, vel in
pulmones, vel in ventriculum, vel in

scapulas, vel in alias subiectas sedes
precumbit: cuius vis & natura, ex co-
lore vrinæ, coronæ, atque bullarum,
intelligitur.

D. *Quid pinguedo vrinis innatans si-
gnificat?*

Quid
pinguedo
vrinis in-
natans si-
gnificet.

C. Pinguedo per summa innatans
telis araneorum similis, hominem
(inquit Hippocrates) tabe consumi
significat. Nisi enim renum colliqua-
tio & fusio quædam in causa sit, cor-
pus vniuersum vel febre ardente, vel
phthisi, vel hectica febre liquefcit.
Diuisa quasi olei puncta innatantia,
alterutrum similiter, sed inefficaciùs,
significant.

D. *Quenam sunt obseruanda antequàm
certa de vrinis sententia feratur?*

Vrina
quando
colligen-
da.

Quali
macula
sit repo-
nenda.

Vt custo-
dienda sit
à Sole,
frigore,
vento.

C. Excipienda Vrina est à somno
prima, perfecta cibi concoctione, eâ-
que vniuersa, quod pars nulla diluci-
dè possit notas omnes exprimere. Ma-
cula in qua reponatur alba sit & dilu-
cida, qualis ferè vitrea est. Obturetur
procul à sole, à frigore, & à flatu; ne
vel turbetur, vel crassescat. Quieta,
nullaque agitatione resideat, dum
sensum refrixerit; nec tamen supra sex

horas asseruetur, ne quam corruptionem subeat. Si fortè vel frigoris vi, vel sponte sua crassescat, turbeturque, igne leni dissoluatur, atque declarabitur, nulla agitatione, ne dissipetur hypostasis. Urinæ inspectio in loco sit, nec obscuro, nec nimium lucido, nec Solis radiis collustrato.

Ut rursus
bata de-
claranda.

Quo loco
inspiciē-
da.

QUA RATIONE MEDICIS

in equariis exercitatio subeunda.

D. Perdocte Candidate, si præstantis Medici nomen apud vulgus tibi comparare velis; partem affectam, affectusque speciem & causam, atque futurum morbi eventum, absentis etiam agroti, te tanquam hariolum oportet augurari, ex inspectione sola Urinæ tibi oblata. Qua ratione artis promantica peritum te populo exhibebis?

C. Antequam de absentis ægroti Urina mihi proposita sententiā nuntio feram, quod anni tempus, quæ cæli constitutio sit, quos morbos regio inuehere soleat, & quis morbus communiter grauetur in populum, animaduertam. Nam is semper suspiciendus qui multis insidiari consuevit. Ac si mihi notus sit ægrotans, quæ illius

Antequam
de urina
sententiā
feratur,
quæ Me-
dicū secū
reputa-
re oportet.

natura & cōstitutio, quibūſque mor-
bis ſit opportunus, memoria repetā.
Laborantīſque ſexum, ætatem, vi-
ctūſque rationem accuratè perpen-
dam. Nam ſi mulier præter naturam
afficitur, an vitio vteri contractus ſit
affectus obſeruabo. Si ſenex eſt qui la-
borat, hyeme, pluuiſo cælo, & in re-
gione humida, fieri vix poteſt quin
tuſſi, catarrho, & ventriculi imbecilli-
tate, deiectāque appetentia affligatur,
atque morbis à deſtillatione ortis cō-
ſiſtetur; maximè ſi natura humidior,
atque crapulæ & vinolentiæ deditus.
Si iuuenis iſque bilioſus egrotat, æſta-
te media, cælique ſtatu & regione
feruenti, poſt victum calidum, exer-
citationēmye immoderatam, diu me-
cum reputabo, num febre ardente, an
tertiana intermittente, aut pleuritide,
vel dyſenteria corripitur; vt hinc
coniectura fiat, eo teneri morbo, cui
magis eſt obnoxius, aut qui tum tem-
poris plurimūm graſſatur in vulgus.

Pereſpectā deinceps vinā, ſi nulla
externarum cauſarum vi mutata ſit,
num renes vrinæque ductus affician-
tur, diligenter inueſtigabo: num olim

nephritide & calculo tentatus æger fuerit, perquiram. Si nec renum, nec vesicæ vitium extet, quænam sit viscerum aut venarum intemperies, vrina demonstrabit, simplèxne sit, an ex humorum vitio, & quod humoris generis exuperet, & an cum putredine atque febre. Nam color intemperiem, substantiâ crassa aut turbulenta humoris vitium, confusio putredinem denuntiabit. Quin & vrinæ contenta sedis affectæ certam notitiam exhibebunt.

D. Si alba & tenuis urina tibi proponatur, quid respondebis?

C. Dicam ventriculum atque iecur supra modum refrixisse, cibi inesse fastidium, ferèque deiectam appetentiam, ventriculum à pastu distendi atque dolitare, ructus multos, eosque acidos emitti, flatu plurimos euagari, frigus plerùmque sentiri, caput ingrauescere, corpus vniuersum quasi eneruatum languere, multa olim commissâ fuisse errata in victu, idque vel potu frigida, vel fructuum esu, vel vigiliis, vel mœrore. Si iamdiu malum persistit, corpus vniuersum cruditate

Quid respondere oporteat, alba & tenui vrina proponitur.

scatere, viuidum periisse faciei colorem; aut lienteriam esse, aut pedes tumere, & leucophlegmatia, aut cachexia periculum impendere. Et quoniam ea quoque vrina sepe notatur in melancholia, atque in lienis tumore, loquar de mœrore, metu, insomniis turbulentis, rugitu sinistri hypochondrij, cordis palpitatione, scotomate, & aliis id genus symptomatis.

D. Si alba & crassa vrina tibi offeratur, quid dices?

Quid alba
& crassa.

C. Cùm alba & crassa simul, aut turbida fuerit, quoniam à crassa lentaque pituita dominio fit, enuntiabo caput dolore concuti, vel graui somnolentia teneri, viscera humoribus multis impediri, intestina atq; hypochondria flatibus distendi, & colicum dolorem imminere, ventericulum nausea, aut pituitosa vomitione premi. Hæc si simul confusa apparebit, aut quotidianam aut lentam febrem esse, eamque diuturnam, & symptomata virgere, quæ febrēs comitari solent.

D. Quid si aurea & tenuis?

Quid aurea
& tenuis.

C. Vrina aurea, si tenuis fuerit, iecoris calidam intemperiem, sitim,

corporis extenuationem , vigilias, somnum turbulentum , manuum volas , plantasque pedum impendiò calidas.

D. Quid si eadem crassa?

C. Ea, si crassa erit , bilem flauam ^{Aurea & crassa,} exuperare & exagitari , hancque vomitione reddi , os ieiuno amarescere, animi defectiones obrepere, ventriculum & præcordia incalescere, idque ferè cum siti; aluum torminibus , aut crebra deiectione sollicitari, quæ dysenteriam minatur; aut corpus pruritum ardere, aut scabie fœdari.

D. Quid si eadem confusa?

C. Eadem, si confusa existat, tertiam ^{& confusa,} nam aut ardentem febrem affligere, capitis dolorem, vigilias, delirium, sitim inexhaustam, aliâque harum febrium symptomata , aut adesse, aut imminere.

D. Quid si rubra, tenuis & confusa?

C. Rubra vrina, si tenuis aut mediocris sit, sanguinis efferuescentiâ inesse, capitis pulsanter dolorem atque grauitatem, membrorum tensionem lassitudinem: & si confusa fuerit, synochum ^{quid rubra, tenuis,} putridam, eiusque symptomata. ^{& confusa.}

D. Quid si aliis coloribus prædita?

Quid aliis
coloribus
prædita.

C. Si ex aliis urinae coloribus, vel icterus, vel iccoris scitrus, vel phlegmone, vel melancholia in liene, vel cæterorum quippiam inesse coniicitur; symptomata omnia, tùm quæ illic profecta sunt, tùm quæ impendere solent, causas quoque evidentes, ex quibus illa proficisci consueverunt, diligenter persequar. Sed interrogatiunculam cautè præmittam, quampridem morbus inuasit, subitòne, an lentè, ac pedetentim, & quàm vehementer: ut hinc coniectura fiat, acutùsne, an diuturnus is sit.

D. Quid si bullans urina tibi afferatur?

Si bullas
urina
proponatur.

C. Si bullæ per summam urinae coronam dispositæ, caput dolore, aut humore multo, grauari denuntient; mox iudicabo & somnolentiam & sensuum tarditatè esse; ex hisque aut soporem, aut paralytin, aut grauiorem defluxionis ruinam instare: aut cùm iam certa destillationis signa deprehenduntur, humorem aut in ceruicem, aut in scapulas, aut in latera atque thoracem, aut in pulmones

cum tussi, aut in articulos procumbere: atque si cum destillatione febris signa existant, pleuritici vrgere, maximè verò si tùm temporis populariter illa vagatur: sin verò cum destillatione, Urina sit oleaginea, pthifin vel inesse, vel proximè instare.

DE DEIECTIONIBVS.

D. Perdoctæ Candidatæ, iam à Fernelio Doctore celeberrimo hariolandi artem ex Uriniste perdidicisse percipio. Sed amplius quæronum ab alijs etiam excrementis diagnostica atque prognostica ducantur signa?

C. Maximè. Deiectiones enim atque sudores etiam spectantur, quòd primæ regionis affectus illæ detegant, hi tertiæ.

Cur deiectiones spectantur.

D. Quæ sunt in deiectionibus consideranda?

C. Substantia & accidentia, puta quantitas & qualitas in colore & odore, atque permista. Vnde deiectionum differentiarum plures existunt.

Quæ in deiectionibus consideranda.

D. Cedo quas?

C. Deiectio à substantia dicitur liquida, aut dura, vel mollis: à quantitate multa, vel pauca; ac frequens,

Differentiarum deiectionum sumptæ, à substantia: à quantitate:

à colore: vel rara: à colore, alba vel nigra; aut
 ab odore: flaua, vel rubra, aut viridis: ab odore
 à permis- foetida, vel sine foetore: à permistis va-
 cis. ria sortitur nomina, vt à sanguine
 cruenta, à pure purulenta, à chylo
 chylosa, à pituita mucosa, à flatu fla-
 tulenta, à spuma spumosa, à pinguedi-
 ne pinguis: quandoque lumbricis re-
 ferta.

D. Deiectionis cuiusque causas expone.

Cause **C. Deiectio** liquida fit, vel frequen-
 deiectionis liqui- tiore vsu liquidioris alimenti, vel cru-
 da. ditate, vel destillatione: dum à toto
 vel à parte aliqua, vt à cerebro, hu-
 mor multus ad sentinam confluit: ob-
 structo quoque mesenterio, quòd à
 iecore non attrahatur chylus.

Dura.

Contrariis causis stercus induratur,
 pauco, eoque sicciore & adstringente
 alimento, vel calore resiccante, siue
 à vehementi febre; siue ab interna in-
 flammatione proficiscatur, vel ab im-
 probò labore, aut immoderata exer-
 citatione contractus fit.

Mollis.

Mollis fit mediocri coctione.

Multa.

Eadem ratione augetur & minui-
 tur deiectionum quantitas. Nam qui
 multum edit, vesciturque cibo excre-

mentitio, vt pane furfuraceo; & qui parum coquit, aut coctum non distribuit, multum deiicit: Qui verò parcè ac duriter viuit, quique vritur alimentofacilis concoctionis & distributionis, ac minimùm excrementitio, parum deiicit.

Pauca.

Frequens aluus redditur acrimoniabilis assiduè excreticem stimulantis.

Frequentis.

Rarior est cùm supprimitur bilis, à qua iritatur excretrix.

Rara.

Colorantur fæces alteratione vel permistione: alteratione, nempe cruditate, vstione, aut mediocri coctione: permistione alieni, vt chyli, sanguinis, puris, pituitæ. Vnde chylosæ, cruentæ, purulentæ, mucosæ nuncupantur.

Colorata.

Alba deiectio fit aut cruditate, aut bilis absentia, aut commistione humoris albi, vt chyli non distributi, vel puris ab abscessu erumpentis, aut pituitæ aliundè confluentis.

Alba.

Nigræ verò aut vstione, aut humoris melancholici aut atrabilarij mistione.

Nigra.

Flaua mediocri coctione, ac permistione bilis, quam natura quotidie à folliculo in ecphyfin transmittit per

Flaua.

meatum cholidochum ; vt, clysteris instar, excretricem ad officium incitet.

Rubra. Rubra fit à sanguine, vel vltione.

Viridis. Viridis maiori vltione, aut permistione bilis porraceæ vel æruginosæ.

Fœtidæ. Fœtor contingit humorum putredine, nisi manifestam habeat causam, vt vsum alimenti, vel medicamenti fœtidi. Aphrodisæus in problematibus quærit cur humanum stercus peius oleat, quàm ceterorum animalium : respondit hoc pendere à cruditate : hanc verò à varietate alimenti.

D. Deiectionum differentias, & causas explanasti, nunc signa breuiter perstringe?

**Optima
deiectio
quæ.**

C. Deiectio censetur optima, quæ mollis est, & cohærens & subrufa; nec graueolens, & assumptis alimētis analoga. Hæc enim naturalis facultatis integritatem significat; ac nullum, ex vicinis partibus, aut vniuerso corpore, fieri humorum decubitus denuntiat. Quæcûmque ab hac deflectit, vt quæ liquida vel dura est consistens, quæ alieno colore tincta, quæ graue olet, quæ partes habet distractas, minimèque cohærentes, nec assumptis

Quæ præter naturam.

pris alimentis proportionē responder, præter naturam est, vitiūque materiæ, aut facultatis, ostendit.

Liquida & aquosa deiectio in morbis acutis mala; quia *amplius*, vel obstructionem, vel catarrhum indicat. Quæ citra sensum & voluntatem egri elabitur, periculosa; quia prostratas vires arguit.

Quid indicat deiectio liquida.

Dura & coacta deiectio, prava; quia diuturniorem in intestinis moram significat, ob expultricis imbecillitatem, aut bilis defectum, vel propter acutam febrem, aut internam inflammationem, quæ stercus exsiccat, & totam absumit humiditatem.

Dura

Quæ copiosior, vel parcior est, damnatur. Copiosior, quia defectum *ariditatis*, aut pituitæ defluxum in aluum è supernis partibus indicat, vnde & ipsa liquida redditur.

Copiosior.

Parcior, quia plurimam fieri distributionem ostendit. Vnde præcalidi iecoris est index, quod totam ferè chyli humiditatem pellicit. At quò plus humoris à iecore trahitur, eò facies alui pauciores & aridiores redduntur.

Parcior.

Frequentior,

Frequentior alui deiectio flauæ bilis redundantiam arguit.

Rarior,

Rarior meatus cholidochi obstructionem.

Alba,

Alba aut pallida deiectio, mala; quæ cruda & incocta est. Si propter bilis absentiam talis sit, obstructionem meatus cholidochi, ut in ictericis; vel bilis translationem in cerebrum, ut in phreneticis ostendit.

Nigra,

Nigra deiectio in morbi principio lethalis: sed melancholica in statu, die critico, præcedentibus pepasmi gnis, cum euphoria contigerit, morbum soluit. Verum atrabilaria, quæ splendet ut pix, perpetuò funesta est. Itaque de hac intelligit Gal. cum c. de atra bile scribit, se nunquam vidisse unum qui nigra deiecerit, non interuisse.

Rubea,

Rubens alui proluuius in morbo omnibus, praua est; quia humiditas crudo sanguine conspersa deieciuntur, ob retentricis facultatis hepatis imbecillitatem.

Cruenta,

Cruenta verò, quæ sanguis cum fecibus deieciuntur, vel hæmorrhoides detegit, vel dysenteriam ab exulceratione

tione intestinorum,

Viridis deiectio, nisi ab alimentis Viridis,
corruptis originem duxerit, exitiosa,
quia talis fit ab æruginosa bile.

Verficolor deiectio morbi longitu- Verficolor,
dinem portendit; quia varios affectus,
multosque humores prauos indicat,
quorum coctio non nisi longo tem-
pore perfici potest.

Deiectio insigniter putida, in malis Putida,
habetur; quia putredinem insignem
demonstrat, nisi fuerit critica, nature
motu, excreto humore putri, qui
morbum faciebat.

Purulenta deiectio ruptum in me- Purulenta,
senterio, vel in cauis hepatis absces-
sum denuntiat.

Chylosa deiectio hepatis obstru- Chylosa,
ctionem vel imbecillitatē significat.

Mucosa deiectio, pituita in intesti- Mucosa,
nis genitæ, vel aliunde illapse, soboles
existit.

Spumosa deiectio magnum intus Spumosa,
incendium ostendit, vel contumacem
humorem à permixto flatu agitatam:
quæ cum stridore, deterior est; quia
flatuum permixtorum ab imbecillo
calore genitorum copiam arguit.

Pinguis.

Pinguis deiection, nisi ab assumptis pinguibus, aut à sola intestinorum pinguedine fusa fiat, lethalis est; quia totius corporis colliquationem indicat.

Vermes
quis por-
tendant.

Vermes per aluum excreti, cum suscitentur ex materia putri, putredinem subesse attestantur. Quod plures sunt, aut maiores, eò maioris putredinis sunt indices. Considerandum si viui, an mortui excludantur. Nā mortuose exire peius est. Summam quippe putredinem esse constat, à qua perierint. In malignis febribus semper in ægri perniciem excernuntur, in aliis morbis distinguenda sunt tempora. Nam in morbi cuiusque principio, vermes exire malum est. Corruptela enim indicatur, quam vt effugiant, mox foras prodeunt. At in incremento, statu & declinatione, non adeò malum est secedere lumbricos.

DE SUDORIBVS.

D. *E' communibus coctionum excrementis restat Sudor. Quid est Sudor?*

Quid Su-
dor.

Sudoris
materia.

C. Sudor est humidum tertie coctionis excrementum, per cutem in aquæ speciem erumpens. Cuius ma-

teria eiusdem cum vrina generis sero-
sus est humor, quem in sanis calor hu-
midus per habitum corporis diffusus
fundit & attenuat. Hæc in ægris con-
iunctam habet aliquam morbifici
humoris partem. Et quemadmodum
vrina humorum in venis contentorū;
sic Sudor eorum, qui in habitu corpo-
ris continentur, qualitatem prodit.

D. Quæ sunt in Sudore consideranda?

C. Substantia, quantitas & qualitas Quæ in
Sudore
conside-
randa.
multiplex, à quibus numerosæ pro-
deunt Sudoris differentię.

D. Cedo quas?

C. Sudor à substantia dicitur tenuis, Differen-
tiæ Su-
doris
sumpræ,
à substan-
tia,
à quanti-
tate,
à qualita-
te.
vel crassus : & lentus, vel friabilis : à
quantitate, multus, vel paucus ; aut
mediocris : à qualitate, quæ in colore
cernitur, rufus, aut ruber, vel viridis ;
quæ odore percipitur, fœtidus vel mi-
tis ; quæ sapore, salus & amarus, vel
dulcis ; quæ tactu deprehenditur, ca-
lidus vel frigidus ; quæ locum spectat,
vniuersalis vel particularis ; quæ mo-
tum, criticus vel symptomatikus ; id
est naturalis, vel præter naturam.

*D. Harum Sudoris differentiarum
causas explica.*

Cause
Sudoris
tenuis,
Crassi:

C. Sudor tenuis fit ex sero tenuiore
& crudiore: .

Crassus coctione, aut humoris cras-
si, vt pituitosi permistione.

Lenti,

Lentus colliquatione, vel humo-
ris visceridi mistione.

Friabilis,

Friabilis, humorum assatione.

Mulci,

Multus gignitur multo potu, co-
piofiore sero, aut à calore humido,
qui solus humores in sudorem resol-
uit. Hinc naturâ calidi humidi, vt
sanguinei, nec non pueri & adolescen-
tes, plurimùm & frequenter sudant.
Graciles verò, sicci, senes, & quibus
iecur aut lien, aut totum corpus ina-
ruit, non sudant. Adiuuat plurimùm
laxitas cutis. Nam qui sunt sicca, du-
ra & adstricta cute, rarò minimùm-
que sudant.

Calidi,
Frigidi,

Sudor calidus fit calidi, frigidus fri-
gidi humoris permistione: aut calidus
à calore febrili, frigidus natiui caloris
extinctione, qualis syncopticus, qui
viribus exolutis syncopen comita-
tur; atque etiam diaphoreticus, geli-
dus sudor, mortis prænūtius. Vtérq;
verius *ἐπίδρωσις*, mador, quàm *ὑπόδρωσις*,
à Medicorum coryphæis nūcupatur.

Sudor, ut plurimum, linteum deter- Rufus,
 forium tingit colore rufo ; quia sola Rubri,
 bilis, aut humoris peccantis portio Viridis,
 valdè tenuis in sudores resolvitur. Si
 quandò ruber aut viridis color depre-
 hendatur, ille à sanguinis, hic à por-
 raceæ vel æruginosæ bilis permistio-
 ne proficiscitur.

Sudor dulcis fit colliquatione cor- Dulcis.
 poris. Itaque contra naturam est. Na- Salfi &
 turalis debet esse falsus & amarus, ra- amari,
 tione bilis.

Graue olet sudor propter humorum Fœtidi,
 putredinem. Putrent verò illi, quia
 non difflantur.

Sudor vniuersalis à toto corpore Vniuer-
 manat: particularis, ab aliqua parte. falis,
Particu-

Sudor criticus fit robore naturæ laris,
 superfluum humiditatem euacuan- Critici,
 tis.

Symptomaticus verò vi & magni- Sympto-
 tudine morbi, & prauorum humorum matici.
 redundantia, contingit.

*D. Explicatis singularum Sudoris dif-
 ferentiarum causis, subnecte signa boni
 & mali ominis?*

C. Sudor in omnibus acutis mor- Sudor
 bis optimus habetur, qui calidus, & optimus
qui.

uniuersalis, & copiosus, cum euphoria, die critico, prægressis pepasmi signis erumpit. Talis enim vel febrem prorsus aufert; vel ita saltem minuit, ut eam deinceps facilius ferat ægro-
tans.

Pessimus
qui.

Pessimus contrà symptomaticus, qui frigidus est. & paucus, & circa caput tantum & faciem atque ceruicem oritur, nec die critico, nec præcedentibus coctionis signis. Hic enim, cum febre acuta, mortem: cum mitiore vero longitudinem morbi portendit, ob copiam humorum natium calorem obruentium, quæ non nisi longo tempore superari potest. ex *Aph. 37. l. 4.*

Qui bonus.

Quicumque Sudor expurgatæ succedit aluo, bonus est; quia crassiore dempta morbi materia, quod tenuioris reliquum est exhaurit.

Qui malus.

Sed Sudor in morbi principio, malus. Humoris enim peccantis copiam, proinde morbum fore chronicum indicat.

Particularis Sudor, ut affectæ partis, indicat.

Copiosus Sudor qui ægrum non leuat, in malis habendus est; quia vires exoluit.

Qua corporis parte Sudor manat,

morbum in ea situm arguit. *Aph.* 38.
l. 4. Vt si capite, aut thorace, Sudor
 emanet, ibi humorem morbosum
 delitescere significatio fit.

DE PARTICULARIBVS
excrementis.

D. *Quæ in communibus excrementis
 considerata videbantur patefecisti, an
 particularia insuper ad morbi diagnosi
 & prognosi expendenda sint, aperi?*

C. Sputa in affectibus thoracis, &
 quæ per nares excernuntur in cerebri
 morbis accuratè sunt obseruanda.
 Affectus enim partium, à quibus pro-
 deunt, certò demonstrant; quia mate-
 riæ morbi coniunctæ portiones quæ-
 dam sunt. Quinetiam morbos par-
 tium, quarum sunt excrementa, salutare
 vel lethales, ac breues vel diuturnos
 fore prænuntiant. Itaque morborum
 illa thoracis, hæc cerebri diagnostica
 & prognostica signa sunt.

D. *Quæ sputa coniunctam morbi cau-
 sam indicant?*

C. Sputum album, morbum à pi-
 tuita, rubrum à sanguine, flauum à
 bile permixta, nigrum à melancholia
 fieri significat.

Cur spu-
 ra, & ce-
 rebri ex-
 crementa,
 ad morbi
 diagnosi-
 sin, &
 prognosi-
 sin expen-
 denda.

Vt à spu-
 ris, morbi
 causa di-
 gnosca-
 tur.

D. Quæ sunt salutaria in thoracis affectibus sputa ?

Optima
sputa
quæ.

C. Sputa quæ alba, lævia & æqualia sunt, neque consistentia nimis humida, neque nimis crassa, optima censentur; quia perfectam coctionem adeptæ sunt, idèο ἀσφάλεια ὑγιεινὴ, significant.

D. Quanam sunt pernicioſa sputa ?

Quæ le-
thalia.

C. Sputum nigrum atque liuidum, pessimum; quia vel humoris adustionem, vel caloris extinctionem portendit. Sputum, quod vi caloris pituitam incrassantis & adurentis, rotundum & grandinosum euadit, deterrimum, Delirium quippeminatur, ob caloris excessum.

Salsum sputum, siue ex putri pituita, siue ex vstæ bilis cum seroso humore permixtione proueniat, exulcerationis pulmonum metum adfert.

Fœtidum sputum in phthisicis funestum; quia, putredinis, puris & vlceris indicium est.

D. Quæ sputa morbi breuitatem prænuntiant ?

Quæ
morbi
breuitatem
præ-
nuntiant.

C. Sputa, quæ in pleuritide, alijsque thoracis affectibus citò apparent, &

quæ facilè educuntur, breuem fore morbum pollicentur. Siquidem & naturæ robur & materiæ bonitatem ostendunt.

D. Quæ morbi longitudinem portentant?

C. Quæ tardiùs & difficiliùs, putæ cum dolore & tussi vehementi excernuntur, facultatis imbecillitatem, aut materiæ cruditatem, aut contumaciam, proindèque morbi longitudinem portentant. Hinc liquidum, & viscidum sputum damnatur; quia verùmque difficulter expuitur. Illud enim ob tenuitatem spirituum eludit, hoc ita hæret arteriæ, ut vix auelli possit. Illud itaque cruditatis est indicium, hoc contumacis materiæ.

D. Si nullum tussiendo, sputum educatur, quid inde significatur?

C. Si nullum tussiendo, sputum prorsus auellatur, pessimum signum est; quia summam cruditatem, & contumaciam humoris, cum virium imbecillitate coniunctam denuntiat.

D. Quid significant excrementa è naribus prodeuntia?

C. Quæ prodeunt è naribus, excre-

Quæ longi-
tudinè
porten-
dant.

Quid ex-
pectora-
tionis de-
fectus in-
dicet.

Quid ex-
crementa
è naribus
prodeun-
tia signi-
fice.

mentitiorum, qui in cerebro sunt, humorum coctionem, vel cruditatem ostendunt. Nam si pituitosum excrementum per nares emissum, tenue & cruditatem arguit; siue à frigore comprimatur, siue à calore fundatur: crassiusculum, coctionem: si durum & foetidum, moram & calorem. Si reneatur in cerebro, apoplexiæ, vel epilepsiæ, aut lethargi, metus subest. Quibus humidiores sunt nares, iis humidius atque infirmius est cerebrum: proinde minùs prospera valetudine fruuntur, teste Hippocrate Aph. l. 6.

DE SIGNIS,

à corporis habitu desumptis.

D. Ad morbi diagnosis atque prognosin, priora duo symptomatum genera actionum lesio, & excrementorum amissionis, in examen adducta sunt, habitus corporis mutatus examinandus superest. Habitus nomine partes hinc intelligo, quæ nostris obijciuntur oculis; Inter quas facies omnium prima conspicitur, ad corporis totius euexiam vel cachexiam indicandam.

Quid in facie considerandum?

C. In facie, primum illud conside-

Quid in
zri fa-
cie confi-
derandum?

randum venit, an sui ipsius sit similis vel dissimilis. Nam quæ naturali simillima est, in acutis morbis optima censetur; quia facultatum omnium integritatem ostendit. Quæ verò dissimilis, & naturali contraria, perniciofa est. *ex Progn. l. l. i.*

Quæ facies optima.

Quæ pessima.

D. In quo similitudo, & dissimilitudo spectatur?

C. In mole, colore, & caractere.

D. Quid extenuata facies, quid turgida significat?

C. Illa macilenti, hæc plethorici corporis nota est.

Quid significet facies extenuata, turgida.

D. Quid faciei color supra consuetudinem rubicundus indicat?

C. Plethoram.

Supra modum rubicunda.

D. Quid faciei color flauus, nigricans, albicans?

C. Cacochymiam biliosam, melancholicam, pituitosam.

Flauus, Nigricans, Albicans.

D. Quid caractere à naturali discrepans arguit?

C. Valdè multum à naturæ modo recessum, ac proinde periculum, portendit.

Character mutatus.

D. Quæ facies admodum naturali contraria?

Quæ fa-
cies ad-
modum
naturali
cōtraria.

C. Horrendissima illa graphicè ab Hippocrate descripta, in qua nasus acutus, oculi concaui, collapsa tempora, aures frigida ac contractæ, & extremitates earum auersæ, cutis circa frontem dura & circumtenta & arida, ac color pallidus, vel niger, liuidusve, aut plumbeus. Id enim formæ vitium, si contractum non est ab aliqua causa euidente, vt ab insomnio, alimenti inopia, aut alui fluore, mortem in propinquo esse portendit; quia consumptio talis existit, ob morbi malignitatem.

Cur Me-
dicus lin-
guam in-
trospi-
ciat.

D. Medicus perspecto agrotantis vultu, linguam introspicit, ut percipiat oculis an benè sit constituta, vel à naturali constitutione remota. Cum enim carnem habeat raram & spongiosam, à fuliginibus è ventriculo & thorace ascendentibus, & ab humoribus è capite defluentibus, salina permixtis, facile mutatur. Quid lingua mutata designat?

Quid a-
lienus
linguæ
color in-
dicet.

C. Lingua præter naturam affecta, peccantis humoris dominium colore & sapore refert. Rubicūda quipè sanguinem, alba pituitam, flaua bilem, nigra verò atram bilem domina-

ri demonstrat, quia τὸ χεῖμα ἔχει χυμὸν
 εἰκὸς, i. color subiectis humoribus si-
 milis. Quinetiam à bile saporem Quid se-
por.
 amarum, à pituita dulci dulcem, à sal-
 sa falsum, à succo melancholico aci-
 dum, in ore persentiscit ægrotans.

*D. Quid arida, aspera àque lingua signi-
 ficat?*

*C. Lingua redditur arida & aspera, Quid sic-
 citas &
 saporque finditur, ex humiditatis, quæ asperitas.
 à calore febrili absumitur, defectu.
 Quocirca linguæ ariditas & asperi-
 tas, febrilem ardorem ex ichoribus
 biliosis genitum significat.*

*D. Medicus insuper ad principum na-
 turalis œconomiae partium constitutionem
 indicandam, hypochondria diligenter con-
 trectat. Qualia signa petuntur ab hypo-
 chondrijs?*

*C. Optima profectò, si mollia, æqua-
 lia, anodyna, atque crassa sint: pessima
 verò, si dura, tensa, inæqualia, dolen-
 tia, atque extenuata. ex Hipp. l. i.*

Progn.

D. Horum signorum causam explica?

*C. Hypochondria mollia, æqualia
 & doloris expertia in quouis morbo
 laudantur ab Hippocrate; quia par-*

*Quæ hy-
 pochon-
 dria opti-
 ma.
 Quæ pes-
 sima.*

*Quid
 mollia;
 æqualia,
 & anody-
 na signi-
 ficant;*

Quid du-
ra, tensa,
reniten-
tia & do-
lorifica.

Quid
crassa &
extenua-
ta.

tium subiectarum, vt abdominis, m-
culorum, mesenterij, hepatis, lienis
vetriculi temperiem renuntiant. D-
ra verò, tensa, renitentia & dolorifi-
damnatur; quia intemperiem, obstru-
ctionem, phlegmonem, scirrhum, a-
flatus subesse declarant. Quinetia
crassa extenuatis præferuntur: quia
la roboris indicia sunt; hæc verò in-
becillitatis partium, quæ contabu-
runt, nedum signa sunt, verumetia
causæ; quòd nec bona ciborum co-
coctio fiat in ventriculo, nec sangui-
natio in hepate. *Aph. 35. l. 2.*



DISPUTATIO IV.

DE CURANDI METHODO,
quæ *ἡγεμονικὴ* Græcis dicitur.

DOCTOR IV.

Ad huc Pathologia, sub qua αἰτιολογικὴ & σημειωτικὴ comprehensæ, ad patefaciendos præter naturā affectus: eorū curandorum ratio superest, *ἡγεμονικὴ* Græcis dicta, quibus constituatur aperi?

CANDIDATUS.

Ad curandi methodum constituendam duo requiruntur, directus indicationum ordo, & legitima remediorum administratio.

quibus
constitua-
tur cu-
randi me-
thodus.

DE INDICATIONIBVS.

D. Quid est indicatio?

C. Recta ratio est, quid ad sanitatem instaurandam sit agendum dictās: *ἡγεμονικὴ*, nonnunquam *σημειωτικὴ*, Græcis dicitur.

D. Quotplex sunt indicationes?

Quotus-
plex in-
dicatio-
nes.

C. Duæ sunt summæ indicationes:

prima à viribus, altera ab affectibus
contra naturam: sub quibus coindica-
tiones & contra-indicationes con-
tinentur.

Indicatio à viribus. D. Cur indicatio à viribus prima per-
hibetur?

C. Quia vires ante omnia conser-
uandæ sunt hominibus, vt docet Ga-
lenus l. 9. Meth. med. quòd ipsarum
conseruandarum gratia curatio insti-
tuatur.

D. Quid indicant vires?

C. Vires sui custodiam semper in-
dicant, eodem authore.

D. Quid indicant affectus præter naturam?

C. Omnis præter naturam affectus,
sui amotionem indicat, vt testatur Ga-
lenus l. 9. Meth. med.

D. Quotuplex est indicatio ab affectibus
præter naturam?

*Ab affe-
ctibus
præter
naturam.*

C. Triplex, prima à causa morbi
sumpta, secunda à morbo, postrema
à symptomatis.

D. Cur in morbi curatione indicatio à
causa præmittitur?

*A causa
morbifi-
ca.*

C. Quia causa Persistente, manet
affectus, nec penitus euelli potest.
Itaque in omnibus omninò morbis,

in quibus eff:ctrix causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est, auctore Gal. c. 4. l. 4. Meth.

D. Cur indicatio à morbo statuitur, cum, sublatâ continente causâ, protinus solvatur morbus?

C. Respondeo ut plurimum continentem causam non adesse, sed antecedentem dumtaxat, quâ sublatâ morbus sui amotionem indicat.

Amotione.

D. Cur indicatio à symptomaticis ultima?

C. Quia symptomaticis nullius curatio primum fit, sed perpetuò affectus symptomatici ipsum facientis, ut asserit Galenus com. 2. in 6. Epid.

A symptomaticis.

D. Ergo nulla sumitur à symptomaticis indicatio?

Obiectio.

C. Sumitur quidem, non quatenus symptomatica est; sed quòd rationem habeat causæ nonnunquam vires imminuentis, vel morbum augentis.

Solutio.

D. Quotuplex indicatio à morbi causa?

C. Morbi, qui adhuc fit, curandi indicatio duplex: prima ab antecedente, altera à continente eius causa; quia morbi, qui adhuc in generatione est; quòd quidem gigneretur, generari est.

Quotuplex indicatio à causa morbi.

prohibendum ; quòd verò genitum,
iam est curandum.

Prohibebitur autem augeri sublata
antecedente causâ ; factus verò mor-
bus curabitur , solutâ cōtinente mor-
bi causâ , authore *Galeno* , in *arte Me-
dica*.

Duplex item curandi scopus in
morbo à fluxione nato , primus in hu-
more ad partem affectam etiamnum
influyente sistendo , alter in humore
parti laboranti influxo vacuando , vt
testatur *Hippocrates lib. de Locis*.

Quicūque morbi à fluxionibus
sunt : primum fluxiones sedare oport-
et ; deinde id , quod influxit , educere.

D. Quotuplex indicatio à morbo?

Quotu-
plex in-
dicatio à
morbo.

C. A simplici morbo simplex indi-
catio , sed à composito multiplex.

*D. Quanam in composito morbo præmit-
tenda indicatio?*

Quæ in
cōposito
morbo
præmit-
tenda in-
dicatio.

C. In connexo morbo præmittenda
indicatio illius , qui alterius curatio-
nem prohibet. Vt si cum vlcere con-
iuncta sit phlegmone , hæc prius cu-
randa , quàm illud ad cicatricem
perduci possit , vt *Galenus l. 7. meth.
med.* prodidit.

At vbi vnus indicatio, cum alterius indicatione pugnat; miscenda est, adhibendâque curatio, quæ neutri affectui officiat, sed vtrique quodammodo profit, *eodem authore*. Sic ventriculû frigidiorē & iecur calidius temperata iuuant, quæque ex calidis frigidisque constant; & modò horum, modò illorum vsus alternatus.

Vrgentior tamen indicatio vbique præferenda. Affectus enim vnde primùm maximèque imminet hominî periculum, hic primus curari debet, vt præcipit *Gal. l. 3. meth. med.*

D. *Quid est coindicatio.*

C. Quæ vnâ cum principe indicante, id quod agendum est insinuat. Quid coindicatio.

D. *Vnde sumuntur coindicaciones?*

C. Ab ægrotantis temperie, ætate, consuetudine, anni tempore, cæli statu, affecta parte, & aliis id genus. Sic ægrotantis tēperies cum ipso morbo contrarietatis mensuram indicat. Vnde sumuntur coindicaciones.

D. *Quid est contraindicatio?*

C. Quæ impedit ne id fiat quod primò indicatur. Sic plethora euacuationem indicat, sed imbecilliores vires eam prohibent. Quid contraindicatio.

DE REMEDIIS.

D. Ab indicationibus, ad remedia transeamus.

Quid est remedium?

Quid re-
medium.

C. Quod corporis affectum præter naturam depellit.

D. Quæ sunt in remediorum administratione consideranda?

Quæ in
remedio-
rum usu
animad-
uertenda.

C. Qualitas, quantitas, utendi modus & tempus.

D. Quale remedium esse debet?

Quale re-
medium
esse de-
bet.

C. Morbo contrarium. Remedium si quidem est, quod morbum depellit: quicquid autem morbum depellit, id illi vim infert: quod vim infert, contrarium est. Quocirca remedium morbo contrarium esse necesse est.

Obie-
ctio.

D. At morbi nonnulli similibus depelluntur remediis; ut febris calido cathartico, & dysenteria medicamento aluum solvente. Ergo non omnis morbus contrariis profligatur remediis.

Solutio.

C. Respondeo, eiusmodi omnia morbo licet similia sint, eius tamen causæ primùm ac per se aduersari, morbo autem ex accidenti. Sic rhabbarum, quamvis calidum, febrem curat; dum ipsius materiam expur-

gat, & dysenteriam purgatio leuat,
noxiâ materiâ eius efficiente causa
detractâ.

D. *Quomodo remedij quantitas definienda est?*

C. Cuiusq; remedij quantitas ex laborantis natura, ac morbi magnitudine simul metienda est, teste Galeno c. 15. l. 9. meth. med. sed limitatiùs definitur affectû partis indicationibus.

Ut remedij quantitas definienda ex agrotantis natura, & morbi magnitudine.

D. *Ad remedij quantitatem recte definiendam, nemini dubium, quin morbi magnitudo sit perpendenda; ut constet quàm validum remedium, quo gradu recessus, quo pondere, quoties & quousque sit decernendum, sed cur agrotantis naturam adiungis?*

C. Quia morbi magnitudinem non modò symptomatum vis atque impetus, verumetiam à pristino habitu recessus indicat. Hic autem ex laborantis natura deprehenditur. Naturæ nomine temperiem intelligo, & ætatem, & insitam corporis constitutionem, & consuetudinem. Id propositis à Fernelio exēplis clariùs percipietur. Cognitus sit Dion ante morbum calido siccoque temperamento, Theon

verò frigido atque humido, ambos peræquè adoriatur febris ephemera: Theoni, qui à pristino habitu longiùs recessit, frigidiora remedia, quàm Dioni decernenda sunt. Grauiùs quippe & periculosiùs, ex Hippocratis sententia, laborat; quòd ipsius naturæ, ætati atque consuetudini, minus consentaneus sit morbus. Eadem ratione senex, qui iuxta ac iuuenis tactus iudicio febricitet, frigidiora tãdem quàm iuuenis exposcet auxilia, licet ad ea sensim veniendum esse horretur virium imbecillitas. Similiter cùm pituitosum atque biliosum parcausus inuadit, biliosus cognato morbo minùs periclitatur, huicque leuiora medicamenta, tum bilem purgantia, tum refrigerantia, quàm pituitoso congruunt. Quia *ὑπερπότης* febricitanti largior frigidæ potio, quàm vini meracioris vsui assueto, porrigenda. Si quidem aduersus omnem affectum præter naturam, adhibendum eò vsque contrarium est remedium; dum in naturalem, aut certè pristinum habitum, factus sit regressus.

D. Cur

D. Cur remediij quantitatē affectæ partis indicationibus limitatiùs definiri aſſeris?

C. Quia remediij quantitas, quam morbi magnitudo præſcripſerit, etiã pro partis affectæ cõditione augenda, minuendãve eſt. Non enim omni æquẽ parti eadem congruere poteſt.

Ut limitatiùs definiatur remediij quantitas, partium indicationibus,

D. Vnde partis cõditio æſtimatur?

C. Ex ipsius conformatione, ſitu, præſtantia, atque ſenſu.

D. Quid in ſingulis animaduertendum?

C. In conformatione conſiderandum quàm rara ſit aut denſa.

In ſitu ſitne in ſummo ea corpore cõſtituta, an in alto demerſa, quàm longè abſit, vel ab ore, vel ab eo loco, cui remedium imponitur.

In præſtantia ſpectandum, parsne ſit ex earum numero quæ principes appellantur, & corpus vniuerſum gubernant, cuiuſmodi ſunt cerebrũ, cor & iecur; anne munus publicum habeat & toti corpori commune, vt pulmo, vt ventriculus, inteſtina, renes & veſica, & quæ his ſubſerviunt, nerui, arteriæ, & venæ: aut an priuata ſit, ſibi dumtaxat, non aliis utilis.

In ſenſu videndum, hebesne is

Q

362 N. Ab. Frambesarij
fir, in acutus.

D. *Quomodo horum animadversione,
remedy quantitas est immutanda?*

Ut reme-
dii quan-
titas im-
mutanda,
ratione
Confor-
mationis,
Situs.

Pars densa & cōpacta, remedia ex-
poscit validiora & attenuātia magis,
quorū vis intrò subire possit, cuius-
modi sūt renes & iecur; quę verò sub-
stātia est rariore, vt liē, pulmo & mus-
culorū caro, mitiora postulat. Affectus
in corporis summo positus, pari quo-
dammodo remedio abigi potest: qui
verò in alto corpore demersus la-
tet, valentiùs & attenuantiùs flagitat.
Validiora quippe inflammato iecori,
quàm inflammato abdomini, extrin-
secus imponuntur. Et ex assumptis,
vehementiora renibus, quàm ven-
triculo debentur, quandoquidem
in ventriculum illabuntur ea viribus
integris: ad renes verò hebetiora &
imbecilliora reddita, neque qualia
assumpta sunt, perueniunt. Longior
quippe via est per viscera partēque
multas directā, in quibus remedia
aliis permiscentur humoribus, nec
leuem mutationem subeunt. Pręstan-
tia idcirco mitiora exposcit remedia,
ne vehementiorum appulsu & conta-

Pręstan-
tia.

gione facultas aut offendatur aut dissipetur ad vitę conuersationem necessaria. Priuata verò pars & ignobilis vehementiora perfert, & quanta exposcit morbi magnitudo. Principi parti laboranti nullum adferendum est remedium, quod immodicè vel relaxet, vel refrigeret, sed id semper quadā corroboradi facultate polleat.

Ob sentiendi præstantiam neque ^{Sensus} oculus, neque os ventriculi vehementia acriæque medicamenta: hebetioris verò sensus partes & valida & acria medicamenta nullo incommodo ferre possunt.

D. Profligando morbo contrarium conuenire remedium patet: sed utrum perpetuò id morbo par esse debeat, nondum constat.

C. Profectò si tribus numeris corpus incaluit, quicquid tribus quoque numeris frigidum, paribus viribus ei conuenienter adiungetur. Id si quidem euidenter immutabit, pariterque tātumdem ab eo vicissim immutabitur, dum mutua amborum pugna mediocritas quædam emergat. At si infirmius fuerit, morbi curationem

Cur morbus pari contrario profligandus?

imperfectam relinquet: sin autem validius, contrarium morbi genus inducet.

Et quomodo.

D. *Hac de remedij qualitate & quantitate: utendi modum & tempus persequamur. Num id semel & vniuersim, ac paulatim sit adhibendum, explices velim?*

Qui semel ac vniuersim pari contrario morbus eximendus.

C. Leuior affectus pari contrario semel vniuersimque summoueri potest: quandoquidem nullam id corpori viribusque insignem vim infert.

Extremo quoque morbo extremum diligentissimè remedium, auctore Hippocrate, est adhibendum. Vbi etiam materia turget, ne principem aliquam partem obruat, statim initio valentissimum medicamentum adferendum est.

Qui lentè ac paulatim.

Mediocris autem affectus, quoniā nec præcepsest, nec periculosus, lentè paulatimque tutiùs eximitur; quia (vt monet Hippocrates 2. aphorismorum.) vniuersim & repentè vacuare, vel replere; vel calfacere, vel refrigerare, vel alio quouis modo corpus mouere, periculosum: omne siquidem inimicum naturæ inimicum; paulatim verò quod fit, tutum. Cùm

enim lentè paulatimque curatio instituitur; vtrique tum morbo, tum naturæ consulitur. Morbus quippè abigitur, naturâ quàm minimum fieri potest, offensa.

D. Quomodo lentè paulatimque fit curatio?

D. Bifariam, vel contrariis paribus exigua quantitate adhibitis, vel contrariis blandis, & quæ inferiore sint recessus ordine, identidem sæpiusque repetitis.

quibus
modis
lentè cu-
ratio
fiat.

D. Opportunum remediij tempus est, quod morbi temporibus accommodatur; quæ incuratione tanti sunt momenti, ut si Fernelio credamus, sine clauo & remis nauiget, naufragium tandem facturus, qui nulla temporum obseruatione medicinam facit. Sed quo morbi tempore artis præsidium videtur opportunius?

C. In principio morbi opportunior esse remediorum vsum summus dictator promulgauit his verbis:
ἀρχαῖων ἢ νέων ἢ τι δοκῆν κινεῖν κινεῖ
ἀνμαζουσὴν δ', ἢ συχίν, ἔχον βέλτιον, ὅστι
Cum morbi inchoant, siquid mouendum videtur, moue: cum verò consistunt, melius est quietem habere.

Quo
morbi
tempore
remedia
ex vfu
fiat.

D. Cur in principio potius, quam in vigore morbi, exhibenda remedia sunt?

C. Causa statuitur, prima ab ipso Hippocrate expressa est; quòd circa initia & fines omnia imbecilliora; circa statum verò, fortiora sint symptomata. Altera verò, à Galeno, quòd in vigore natura humori morbifico concoquendo, & morbo profligando prorsus intenta, nullis remediis ab instituto auocanda sit.

DE VICTVS RATIONE.

D. Quod summatim comprehensum est, nunc particulatim discutiendum, & in unoquoque remedij genere accuratius versandū. Quot sunt remediorum genera?

C. Tria: diætā, chirurgia, & pharmacia.

D. Quid diætæ nomine intelligitur?

*Quot remedi-
orum
genera.*

C. Victus ratio corpori alendo idonea.

D. Qualis instituenda agrotanti diætā?

*Quid
diætā.*

C. Diætæ qualitas ex morbi specie & laborantis natura indicatur. Diætā morbo contraria, calido frigida, frigido calida, sicco humida, humido sicca; atque corpori naturā ca-

lidiori, vel frigidiori, sicciori, vel humidiori, siue id ratione ætatis, siue consuetudine fiat, familiaris instituenda. Vnde & ægrotanti, quàm fieri potest, gratissima esse debet; quia ex Hippocrate, parum deterior potus & cibus, suauior autem; melioribus quidem, sed minus suauibus, est preferendus, *Aphor. 38. l. 2.* & à consuetudine quàm minimè remota, quia *eodem authore*, Quæ longo tempore consuetæ sunt, etiam si deteriora sunt, minus ijs, quæ insuetæ sunt, molestare consueuerunt. *Aphor. 50. l. 2.*

Quæ
victus
ratio in-
stituenda.

D. *Quæ victus quantitas decernenda?*

C. Victus quantitas ex morbi temporibus & corporis natura præscribitur. Victus tenuis in principio morbi acuti est exhibendus, in incremento tenuior, in statu tenuissimus, præcepto Hippocratis. Quando morbus in suo vigore constiterit, tunc victu tenuissimo vtendum. *Aphor. 8. l. 1.* Cùm enim sæuissima symptomata vigent, & natura in morbi coctionem tota incumbit, aliò auertenda non est, neque plenioris cibi concoctione distrahenda. Et quò breuior

quæ vi-
ctus qua-
ritas præ-
scribenda.

futur⁹ est morbus, hoc victus tenuior, pro cuiusque temporis conditione, imperandus, lege Hippoc. Vbi morbus peracutus est, extremè tenuissimo victu vtendum est. *Aph.* 7. Et quibus statim morbus consistit, ijs statim tenuis victus adhibendus est.

Quò verò longior, eò minùs tenuis, quòd ὁλότοιον ἐς ὑπερὸν ἢ ἀκμὴν, ἐμμετρῶδες ἀποτέρας διαίτης, ὡς αὖ ἐξ ἀρκῆς. σὴ νόσῳ, quibus posterius debet consistere, prius vberior diæta requiratur, vt æger sufficiat. *Aph.* 10. Pro corporis etiam natura magis vel minùs calida, siue id ratione ætatis, siue ex anni tempore contingat, plenior vel tenuior victus ratio instituenda. Pueris quippè plenior, senibus verò tenuior, medias ætates degentibus moderatus victus congruit, quia ex hipp. Qui crescunt, plurimum habent calidi innati. Plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus absumitur.

Senibus verò parum calidi innati inest, propterea paucis succendiculis egent, à multis enim extinguitur. *Aph.* 14. l. 1.

Hinc, senes facillimè ieiunium fe-

runt, secundo loco qui ætatem subsistentem habent, minùs adolescentes, omnium minimè pueri. *Aph.* 13. l. 1.

Plenior item victus hyeme & vere conuenit; quia, eodem authore, ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi. Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor iannatus plurimus est. *Aph.* 15. l. 1.

Cùm verò naturales corporis vires vitiosorum humorum copia grauantur, tenuior victus esse debet; quia impura corpora quantò plus nutries, tantò magis lades. *Aph.* 10. l. 2.

D. Quis viuendi modus seruandus?

Qui viuendi
modus.

C. Cùm ex anni tempore, tum ex corporis habitu innotescit. Parciùs siquidem, sed frequentius æstate & autumno; largiùs autem, sed rariùs, hyeme & vere cibandum est, ex *Gal.* propterea quòd æstate & autumno cibos difficillimè ferunt, hyeme facillimè, secundum locum ver habet. *Aph.* 18. l. 1.

Adhæc: Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, lentè reficere

Q v

370 *N. Ab. Frambesarij*
oportet; quæ verò breui, breuiter.
Aph. 7. l. 2.

D. Quando victus egrotanti tempestivus?

Quando
victus
tempesti-
uus.

C. Cùm morbus remittit vel inter-
mittit. In accessionibus (*inquit Hip-
pocr.*) abstinere oportet: Nam cibum
dare noxium, tum quòd excandes-
centi morbo natura obsistens noua
cibi coctione auocanda non sit, tum
quòd in ipsa febris excandescencia,
tetto vapore corpus vniuersum per-
fundatur, eoque recens sumptus eibus
labefactetur, & maxima ex parte cor-
rumpatur.

DE VENÆ SECTIONE.

D. Quid chirurgiæ nomine intelligitur?

Cur chi-
rurgiæ
nomine
phlebo-
tomia in-
telliga-
tur.

C. Et si chirurgiæ nomine quælibet
manus operatio significatur, vna ta-
men venæ sectio καὶ ἐξολω, plerùmque
intelligitur; quia venæ sectio commu-
ne auxilium est eorum, qui ex plenitu-
dine fiunt, morborum, authore *Galeno*
in Aphor. 47. lib. 6. Nam euacuatio
omnium humorum æqualiter, quæ
quidem exquisitissima est, fit per ve-
næ sectionem, eodem teste *in Aph. 17.*
lib. 2.

D. Putâsne phlebotomiam in morbis duntaxat plethoricis ad vacuandum habere locum?

C. Phlebotomia non morbis tâtùm plethoricis ad vacuandum, sed φλεγμαῖς, cæterisque morbis à fluxione excitatis, ad reuellendum & deriuandum administranda. Siquidem utilis est, cùm vehementiorem humorum impetum, ad contrarium reuellere, vel ad propinqua deriuare volumus. *Ex Gal. lib. 9. meth. med.* Itaque humorum, qui aut peccant in venis, aut ex his affatim defluunt, proprium accommodatùmque remedium est venæ sectio. Illos quippè euacuat, hos verò reuellit vel deriuat. Vnde morbos, quos, vel sāguinis vbertas, vel eruptio progeniuit, præsentem quidem sanat, imponentes arcet. Nec modò per se morbis curandis phlebotomia confert, vacuando, aut reuellendo, vel deriuando: sed etiam ex accidenti, tum refrigerando, cùm calidiorem sanguinem educit: tum obstructions expediendo, dum sanguinis plenitudinem venas obstruentem tollit.

Phlebotomiz
vñs
quorū
plex.

D. Quo discrimine reuulsionem & de-

Q vj

Quæ dif-
ferant va-
cuatio,
reuulsio,
deriva-
tio.

C. Vacuatio propriè dicitur hu-
morum citra motum vllum aut exa-
gitationem in venis peccantium. Re-
uulsio humorum, qui ex quavis sede in
partem aliquam impetu feruntur &
influunt: Derivatio verò eorum qui
partem obsident, ipsi quodammodo
iam impacti. Vnde reuulsio definitur
illabentis humoris in contrarium tra-
ctus; derivatio verò humoris illapsi
tractus in vicinum latus.

D. *Quæ ad sanguinis plenitudinem va-
cuandam secunda vena?*

Quæ se-
cunda ve-
na ad
plenu-
dinis va-
cuatio-
nem.

C. Plenitudo puta vt & biliosa ex
interiore cubiti dextri vena commo-
dissimè detrahitur: melancholica ex
interiore sinistri cubiti vena. Quæ ve-
rò ex crudorum colluie suborta fue-
rit, ex utrocúmque cubito per æquè
demi potest.

D. *Quæ ad reuulsionem?*

Ad re-
uulsionē.

C. Sanguis, vel quivis humor cum
sanguine per venas confertim in quā-
vis corporis partem supra claves po-
sitam irruens, reuelli debet, secta è re-
gione cephalica cubiti vena. Influens
autem è venis maioribus in aliquam

earum partium, quæ inter clauēs & renes sitæ sunt, reuellitur sectâ è regione basilicâ cubiti venâ. Qui autem in eas partes decumbit, quæ inter renes & femora interiacent, sistitur, si quidem plethoricum corpus est; primum sectione interioris venæ, deinde saphenæ, idque è directo sedis affectæ. At si minimè plethoricum corpus est, vna saphena aperta, satis reuellit.

D. Quæ ad derivationem?

C. Deriuatio fit aperta ea vena quæ in affectam partem inseritur, per quâ hæc modò alimentum capebat, modò noxium humorem influentem excipit. Quocircà cū iniecto scalpello illa vena præciditur, pars multitudine defessa illac onus suum deponit.

Ad derivationem.

D. Quæ sanguinis quantitas detrahenda?

C. Tantum sanguinis detrahendū, quantum morbi magnitudo postulat, ac vires sustinere possunt. Hinc constantibus viribus sanguinem à xeromachus ἀγρῶ, vsque ad animi deliquiū ducere præcipit post Hippocratem Galenus, & in ardentissimis febribus, & in maximis inflammationibus, &

Quæ sanguinis quantitas demenda.

in vehementissimis doloribus, vt affectus magnitudini vsquequaque respōdeat vacuationis quantitas. Aequa siquidē & perfecta vacuationis quantitas est, quæ citra insignem virium offensionem totam morbi materiam adimit. Hoc autem morbi viriūque inter se exquisita collatio demonstrat.

D. Vnde morbi magnitudo æstimanda?

Vnde morbi magnitudo æstimanda.

C. Morbus magnus dicitur aut ex se, nempe è sua essentia & sede, aut ex sua continente causa, aut ex symptomatum sæuitia. Si praua quædā morbi species, velut inflammatio, principem aliquam partem obsideat, sitque morbificus humor putridus & venenatus, aded vt graua inde excitentur symptomata, magnus profectò morbus est, cui magna congruit sanguinis euacuatio. At si simplex intemperies partem aliquam ignobilem occupet, nec sit malignus humor morbificus, leuiāque symptomata inuehat, minor habendus est morbus, & qui parciore indiget euacuationis.

D. Vnde vires æstimandæ?

Vnde vires æstimandæ.

C. Valentes & imbecillæ vires ex

functionibus internoscendę sunt. Vis naturalis ex vrinarum & excrementorum alui cruditate: vitalis, ex pulsu paruo, obscuro & languido, & ex respiratione parua, difficili atq; crebra: animalis, ex sensuum motusque læsione, debilis animaduertitur: vt ex functionum naturalium, vitalium & animalium integritate, triplex facultas robusta deprehenditur.

D. Maximi refert languidas vires ab oppressis internoscere. Hæ siquidem largæ, illæ nullam vacuationem ferunt. Unde earum distinctio petenda?

C. Ex causis euidentibus. Si enim externæ causæ prægressæ sunt, quæ virium substantiam vel mutant, vel dissipant, eas verè languidas esse constat; sin nullæ eiusmodi deprehensæ sunt, & aliæ interiores & abstrusæ causę urgent suo pondere, cuius generis sunt obstructio, & immoderata humorum copia, oppressas duntaxat esse coniicimus.

Qui languidas vires ab oppressis dignoscere licet.

D. Estne ad vacuandi sanguinis quantitatem definiendam, morbi viriumque magnitudo duntaxat animaduertenda?

C. Mittendi sanguinis quantitatem

Animaduersiones in sanguine miste do.

ex morbi magnitudine atque virium robore perceptam exquisitiùs atque perfectiùs eidentium causarum obseruatio præscribit, ex quibus tres numerantur interiores, temperamētum, habitus & ætas, ac totidem externæ, ambientis constitutio, spontanea vacuatio, & consuetudo vitus.

D. *Cur in sanguine mittendo obseruandum temperamentum?*

Cur in sanguine mittendo obseruetur temperamentum.

C. Quia calidum humidumq; temperamentum in propria solidarum partiũ substantia situm, vi insiti caloris assiduo plurimùm dissipatur, nec idè peræquè copiosam fert vacuationem, atque frigidum & siccum. Quodcũque verò corpus inde humidum dicitur, quòd multo humore abundet in venis recondito, id facillimè vacuationem tolerat.

D. *Cur corporis habitus spectandus?*

Habitus.

C. Quia corporis habitus extenuatus, mollis & rarus, tum imbecillus, tum multæ dissolutioni obnoxius; contrà verò, carnosus, firmus atque densus, pauca sinit è corpore dissipari. Qui autem præpinguis & obesus exi-

fit, quamquam minimum dispergitur, difficilè tamen venę sectionem idcirco sustinet, quòd exilibus sit venis, quas exinanitas pinguedo facile stringit deprimítque; vt inde metus sit, ne natiuus calor extinguatur. Quibus etiam amplę & turgidę venę spectantur, tolerabilior est euacuatio, quàm quibus angustę. Et quod ad humorum naturam attinet, tenues & calidi celerrimè dissipantur ac diffluent; crassi verò ac frigidi, diutiùs hærent.

D. Cur ætas consideranda?

C. Quia nec in ætate decrepita, quę Ætas effœcis est viribus, tutò vena pertunditur; nec in ætate puerili, quę corpus calidum & humidum obtinet, molle, tenerum ac patens, quod sponte sua assiduò digeritur ac defluit, sed in ætibus intermediis, quę firmis viribus & corpore bene constituto tenentur, audacter mittitur sanguis.

D. Cur ambientis constitutio animadvertenda?

C. Ambientis constitutio ex re. Regio gione, anni tempore, & cœli statu proficiscitur. At regio feruens & arida multum innati calidi, viriùmque,

necnon & multum peccantis humoris è corpore haurit. In ea proinde parcior sanguinis missio esse debet. Regio frigidior ac humidior innatum calidum, humorisque, intus coërcet, horumque minimum dissolvit, quocirca sanguis abundantius profundi potest.

Anni tē-
pus.

In anni temporibus ver temperatum, succi viriumque abundans, sanguinem largius fundi permittit. Post ver autumnus, deinde hyems, omniū minimū æstas. Cæli status qui calidior vel frigidior obtigerit, vt Austrina vel Aquilonia tempestate, parcius: largius autem quicumque clemētior nulli ingenti tempestatū vi iactabitur, sanguinem mittendum esse suadet.

Cæli sta-
tus.

D. Quid de vacuatione, quæ fortè tum erumpit, cū venam secare proponimus, statuis?

Sponta-
nea va-
cuatio.

C. Spontanea vacuatio materiæ morbi nihil detrahens, artificiosam non excludit. Quod igitur morbus exposcit, protinus vacuandum. In vehementi tamen pleuritide, quo tempore fortè fortuna erumpet sudor, aut vomitio, aut alius, sanguis mitti

non debet : at sedata eruptione, paulumque recreatis viribus, incidenda vena est. Symptomatica enim cum sit illa vacuatio, neque morbi substantiam detrahit, neque vicaria esse potest phlebotomiæ. Spontanea autem vacuatio, quæ morbi substantiam demit, si iam ægrotum leuet, possitque, quantum requiritur, vacuare, prorsus est naturæ committenda. Sin minus id possit, tantum detrahemus, quantum expedit ad perficiendum quod postulamus. Itaque in pleuritide, omnique febre continua, si sanguis abundantius ex vtero, ex hæmorrhoides, vel è naribus dimanet, iustaque sit vacuationis quantitas ex qua æger satis leuetur, vena nequaquam secanda: sin verò parcius aut languidiùs ex his locis profluit, morbusque interim vehementer vrget; quod deficit, venesectione supplendum.

D. *Quamobrem consuetudo inter quantitatis observationes habenda?*

C. Consuetudo viuendi accuratè perpendēda; quia si prospicim⁹ ægrotum tenuiter diu victurum, vel quia potionis & cibi languet appetentia,

Consuetudo.

vel quia morbus deuorare non finit, vt in angina fauces præcludente, parciùs euacuandum monemur, quàm si plenius is viuat. Tum enim sanguinis nonnihil retinendum asseruandumque est, vt post vacuationem vires alia deinceps adhibenda remedia ferre, & morbi longitudini atque iudicationi sustinendæ satis esse queant. Siquidem non præsentium duntaxat, verumetiam futurarum virium habenda ratio. Nec vacuationis consuetudo negligenda. Qui enim venæ sectionē iam est expertus, modò vires crebra vacuatione nondum sint læsæ, alacriùs eam perfert, quàm inexpertus.

D. Quis effundendi sanguinis modus?

Quomodo
mitten-
dus san-
guis.

C. Cùm semel & vniuersè facta vacuatio citra periculū adhiberi nō potest, quod vitiosè se habet, paulatim vacuare expedit, & minutatim salubre quidpiam pro eo reponere: at primū, quātum vires ferant, detrahare; deinde quod defuit iteratione supplere: idque vel bis, vel ter, vel nonnunquam sapiùs. Ea curatio Græcis est *ἐμπίπτειν*.

D. Quando mittendus sanguis?

C. Cum opportuna temporis occasio Et quan-
do.
aderit, ac idonea corporis præpara-
tio adhibita fuerit.

*D. Quod corpori per venæ sectionem
vacuando, tempus videtur aptius?*

*C. Duplex tempus animaduerten-
dum: anni vnum, morbi alterum: il-
lud ad præcautionem, hoc ad curatio-
nem. In muliere insuper prægnatio-
nis tempus ad vtrûmque finem pe-
culiariter obseruandum.*

*D. Quo anni tempore ad morbi præcau-
tionem pertundenda vena?*

*C. Verno potissimum, lege Hip-
pocratis, quibus venæ sectio prodest,* Quo an-
ni tēpo-
re, admi-
nistranda
phlebo-
tomia.
his vere secanda vena. Aph. 47. l. 6.
*quia tum nec æstus viget, qui corporis
dissolutionem faciat, nec frigus hu-
morum concretionem afferens, nec
inæqualitas vires perturbans, sed po-
tius bona temperies, inquit Philo-
theus.*

*D. Quo morbi tempore mittendus san-
guis?*

*C. In morbis à plenitudine vel flu-
xione ortis, mittendus in principio* quo mor-
bi tem-
pore.
sanguis, vt illa maturè dematur, hæc

auertatur, dum vires firmæ sunt atque constantes.

Est & administranda ipso protinus initio phlebotomia in febribus ardentibus, antequàm vehementior putredo inualeſcat, ac ſauiora euadant ſymptomata, & interioribus inflammationibus ꝓt vt qui in partem confluerat humor, nondum obhærens profluens ſanguinis curſum ſequatur.

D. Quo die aperienda vena?

Quò die:

C. In morbis qui circuitibus affligunt, intermiſſionis vel remiſſionis die, administranda erit phlebotomia, ne vllum naturæ negotium faceſſat. In aliis morbis qui nimiũ præcipites ſunt, vt apoplexia & angina, nullus dierum delectus eſt habendus.

D. Quâ horâ detrahendus ſanguis?

Quâ hora:
ra:

C. In quibus morbis vel præcautionis vel curationis gratia poteſtas datur ſanguini mittendo horam deligere, conuenientior erit matutina, quàm pomeridiana. Nam à Solis exortu ſanguis ſuſcitatur, viget atque dominatur, ipſoque diei lumine tenuis fit, ſerenus & ad fluédum aptior, maximè ſecundâ tertiâue horâ.

D. Quo pragnationis tempore mulieri grauida tutius administratur phlebotomia?

C. Si Hippocrati credamus, phlebotomia mulieri non conuenit, quando gerit vtero; quia γυνὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσα φλεβοτομῆσαι ἐκπιπύουσα, mulier in vtero gestans sectâ venâ abortit: Sed quotidiana experientia id perpetuum non esse ostendit. Profectò si ipse mulieri grauidæ, morbo ex cacochymia tentatæ, purgationem decernit à quarto mense ad septimū; nos multò tutius prægnanti tunc sanguinem mittemus ad aliquem plenitudinis morbum præsentem curandum, vel impendentem arcendum. Quòd si media gestatione liceat, longè totius initio factu fas est; quòd sanguis magis redundet, & fœtus minore egeat alimento. Hoc tempore si sæpè natura illius superuacui effusionem vtiliter aggreditur per nares, per hæmorrhoidas, aut per vterum; cur non similiter nobis liceat, premente necessitate naturam arte imitari? cùm multas videamus, quibus non est reſerata circiter quartum mensem vena, abortum facere, quia

Quo pragnationis tempore mulieri grauidæ secunda vena.

foetus sanguinis copia obruitur. Quin & citra plethoram, cum pleuritis, aliaue inflammatio vehementius vrget, pragnanti vena in cubito videtur cædenda. Inferiores enim pragnantium venas incidere minimè tutum, quòd impetu deorsum conuerso menses procedant, foetusque præcipitetur. Octauo nono mense, rarò citra abortum sanguis emittitur, nisi quid vrgeat.

D. *Qua ad vena sectionem, corporis preparatio adhibenda?*

Quæ ante
venæ sectionem
preparatio adhibenda.

C. Prima corporis regio si impura fuerit, prius expurganda. Si astriktor alius sit, excrementa clystere balano prolicienda, ne exhaustæ venæ sordidam eorum colluuiem exurgent. Si vitiosus humor in vicinis partibus expuret, ne eius corruptela in locum vacuandi sanguinis raptim traijciatur, differenda venæ sectio, dum sit blando subductus cathartico, cuius vis vniuersam corporis molem neutiquam exagitet. Si quæ sit ciborum cruditas, tantum moræ in vena pertundenda interponi debet, quantum satis est ad crudorum concoctionem.

D. *Estne*

D. *Estne perpetuò vena sectioni pramittenda præparatio?*

C. Adeò immanis & importunus nonnunquam morbus est, vt nulla præparatione, nulláque cunctatione festinare cogat. Sic in vehemētissima pleuritide, & in ardentissima febre: imminētis periculi euentus magis reformidandus est, quàm noxa ex non præparato corpore.

An perpetuò vena sectioni pramittenda præparatio?

DE MEDICAMENTO.

D. De ultimo remediorum genere nobis agendum restat, quod Græcis *εσφακον*, Latinis *medicamentum* dicitur. Quid *pharmaci* nomine intelligis?

C. Quidquid præter diætam & chirurgiam, ad corporis affectum præter naturam summouendum, adhibetur.

Quid medicamentum?

Vnde medicamentum veneno prorsus aduersum, quod naturalem corporis cōstitutionem omninò destruit; & alimento quod corporis substantiæ quodammodo simile, in eam tandem facessit atque conuertitur.

D. *Quotuplicia sunt medicamenta?*

C. Duplicia. Alia enim *κερωτικά*, Quotuplicia medicamenta; alia duntaxat *αλλοιωτικά*, alterantia. Illa causæ morbificæ

R

detrahendæ, hæc morbo propellendo dicata.

D. Quanam euacuantiæ sunt?

Quæ euacuantiæ.

C. Purgantia, quæ totius substantiæ similitudine vitiosum humorem sibi peculiarem è toto corpore trahunt, attractumque deiectione vel vomitione excludunt: Illa propriè *gastro-negæ*, hæc *ipsius*, dicuntur. Diuretica & diaphoretica, quæ vrinas & sudores mouent, quæque menses cient; quoniam non attrahendo, sed vel detergendo vel extenuando atque penetrando excrementa educūt; quodammodo euacuantiæ, non tamen purgantia ritè dici possunt. At alexiteria, quæ venenum proliciunt, amoliunturque similitudine, iure inter euacuantiæ connumerantur, nec ided cathartica nuncupari debent.

D. Qualia causa morbifica cathartica sunt adhibenda?

Qualia caco-chymix cathartica conueniant.

C. Cholagoga biliosæ, melanogoga melancholicæ, ac phlegmagoga pituitosæ caco-chymix purgandæ conueniunt; quia caco-chymia curatur purgatione, quæ cuique humori redundanti sit accommoda, authore *Gal.*

c. 6. l. 16. Meth. med.

D. *Quanam alterantia sunt?*

C. Quæ qualitatis contrarietate morbum depellunt.

D. *Qualia alterantia morbo adhibenda?*

C. Frigida calido, calida frigido, quæ alterantia.
 sicca humido, humida sicco decernenda morbo. Siquidem calida intemperies refrigeranda est, frigida verò calfacienda: similiter humida siccanda, & sicca humectanda, eodem auctore, c. 10. l. 7. Med. med.

Qualia morbo sint adhibenda.

Nec modò quæ primis, sed & quæ secundis facultatibus agunt alterantia affectui contraria congruunt. Sic obstructioni aperiëntia, dilatationi astringentia, duritiæ emollientia, laxitati corroborantia, ritè adhibentur.

D. *Quàm valida censes exhibenda esse medicamenta?*

C. Lege Hippocratis, leuibus quidem morbis medicamenta naturalia, vehementioribus verò valentiora sunt exhibenda, *Aph. de loc.*

Quàm valida esse medicamenta debeant.

Præter morbi magnitudinem, noxiæ humoris situs quàm valida cathartica sint eligenda indicat. Mitiora è prima corporis regione, mediocria è vasis

R ij

— 00

maioribus, valentiora è corporis habitu euocant. Expedita quippe facilisque purgatio est è ventriculo & ex intestinis, difficilior è venis mesenterii, deinde è iecore & ex liene, multò difficilior è venis maioribus, atque etiam è minoribus; omnium verò difficillima ex ipsa partium substantia, quæ ad summam cutem atque articulos accedunt. Quò enim pars quæque distatior & minus venis conspersa, eò difficilius purganti medicamento cedit.

D. Quàm validum deligi oporteat catharticum ostendisti, sed quid quantitate offerri debeat, nondum expressisti.

Ut melicamenti
quantitas
definienda sit.

C. Sua est & definita cuiusque cathartici quantitas, qua id conuenientem purgationis modum præstare solet, sed ea pro purgandi facilitate, difficultatève augenda, vel minuenda videtur.

D. Quibus notis deprehenditur purgandi facilitas ac difficultas?

Corporis
conditio.

C. Quando facilis vel difficilis sit futura purgatio, corporis, humoris, atque cæli status ostendit.

D. Quid corporis statu intelligitur?

C. Temperamentum, habitus, con-

stitutio, ætas & consuetudo.

D. Quare corporis conditio ad pharmaci quantitatem decernendam animaduertenda?

C. Quia è sicco exsuccoque corpore atque macilento pauca detrahi possunt: multa ex humido, & ex habitu eufarco. Ac firmum densumque corpus, cuius viscera & venæ naturâ angustæ obstruuntur facile, superuacua retinet, nec faciliè elabi sinit: molle verò, rarum ac laxum, quale mulierum est, patentius est, per quod concitati tractique humores faciliè decurrant. Robusti etiam & laboribus assueti leuiuscula aspernantur medicamenta, quemadmodum & quibus sensus est hebetior: contra incitantur faciliè qui exquisitiore sunt sensu, & qui vel naturâ vel morbo, vel viuendi ratione, delicatiores euaserunt. Pueri quoque & senes benigniora, non ut ætates mediæ valentiora ferunt medicamenta. Crebris item vacationibus assueti, pharmaco minùs lacessuntur, infæti magis.

D. Quid humoris statu intelligitur?

Humoris
natura.

C. Eius qualitas & copia.

R iiij

D. Cur humoris observatio ad medicamenti quantitatem præscribendam necessaria?

C. Quia aquosus humor, bilisque tenuis, facile: pituita & melancholia pigre defluit. Qui crassus est, & quasi ardore resiccatus, velut fixus subsistit in via: lentus & glutinosus ductibus obhærescit, copiosus verò & quasi restagnans, ut in obæfulis & in his qui se crapula ingurgitarunt, aut quavis ex causa humorum illuviem congesterunt, levi medicamento magna plerumque ventris perturbatione immoderatiùs profunditur.

D. Quid cæli statu intelligitur?

Cæli
Rati

C. Regio, anni tempus, & tempestas.

D. Cur cali status ad medicamenti quantitatem definiendam spectandus?

C. Quia sub canicula & ante caniculam, atque in regione æstuosa, acer & paucus inest humor in corpore, qui & foras euocatur, ut proinde haud facilis eius possit esse purgatio. Hyems verò media, regio gelida & tempestas Aquilonia corpus densant & astringunt, atque humorem coarctant, qui

ægrè dimittitur, sicque aluum exsic-
cant: contrà verò, Austrina soluit, la-
xat & humectat aluum; adeò vt Au-
strina duntaxat constitutione, & tem-
porum regionumque moderatione,
felices succedant purgationes.

*D. Præscripsisti quantum, exponere nunc
quomodo vacuandum sit, vniuersè, an
partitè; per superiora, an per inferiora?*

C. Purgandi modum noxii humo-
ris copia & laborantis vires commo-
strant. Cacochymia constantibus vi-
ribus pauca vniuersè detrahi potest,
sed imbecillis viribus multa partitè
eximenda. Quicquid enim peccantis
inest humoris, id prorsus expurgan-
dum, vt corpus à morbo vindicetur; at
non semel, sed per epicrasim id præ-
standum. Assentiendum quippè Hip-
pocrati benè monenti, Omnes extre-
mas euacuationes periculosas esse.
Vnde in multa cacochymia tutius est,
paulò citra modum subsistere, quàm
ultrà procedere. Conferentia verò
loca, per quæ noxius humor sit eua-
cuandus, profligandusque nature mo-
tus indicat. Nam si humor sursum
vergat, per vomitum; sin autem deor-

Quomo-
do mo-
lienda
purgatio.

Per quæ
loca.

sum impetura faciat, per alium erit molienda purgatio, præcepto Hippocratis: Quæ ducere oportet, quò maximè natura vergit, per loca conferentia eò ducere. Idcirco naturæ inclinatio diligenter obseruanda Medico.

D. Si fortè purgationis vias morbus interceptit, quid agendum?

C. Aliorsum motus erit auertendus. Numquam enim humor noxius in affectam sedem est deriuandus. Quocircà neque imbecillo ventriculo cienda vomitio, neque intestinorum vlcere aut inflammatione, bilis eò deducenda, sed aliorsum reuellenda. Iubet enim Hippocrates reuellere; si, quò non oportet, vergat. Quin & humor noxius, qui insueto naturali cursu fertur, inhibendus, & in rectum tramitem reuocandus; vt qui suo impetu, & impeditâ naturâ symptomaticè fiat: quemadmodum qui per conuenientes regiones atque vias deferretur, sinendus est; atque si segniùs progreditur, incitandus: fit enim, natura duce, quæ nihil nisi vtiliter gerit.

D. Quando decernenda purgatio?

C. Simul ac opportuna temporis occasio extiterit, & idonea præparatio adhibita fuerit. Quando purgandum sit.

D. Quod corpori purgando tempus videtur opportunum?

C. Ad præcautionem, anni tempus spectandum, ad curationem morbi tempus, ad utrâque gestationis tempus in muliere.

D. Quod anni tempus purgationi aptius?

C. Purgationi, quæ nullius præsentis morbi necessitate, ad præcautionem solam suscipitur, aptissimum est ver, deinde Autumnus, aut quæ illis non absimilis: sed quodammodo temperata sit constitutio, non æstuosa, qualis diebus Canicularibus; nec Aquilonia tempestas: sed Austrina humidave, quæ & corpora laxat & humores liquefacit. Id quod est ab Hippocr. expressum *Aph. 47. li. 6.* Quibus purgatio prodest, his vere purgatio imperanda; quia tum nec ingens viget calor, nec frigus, nec inæqualitas, sed bona temperies, ait Philotheus. Et *Aphorif. 5. lib. 4.* καὶ κινὰ, καὶ πρὸς κινὸς ἐργάσας αἱ φαρμακίαι. Sub cane

Quod anni tempus purgationi aptius.

& ante canem difficiles sunt medicationes.

D. *Quod morbi tempus purgationi accommodatius?*

Quod morbi tempus purgationi accommodatius.

C. In morbo valdè acuto tempus purgationi accommodatissimum, est principium, si materia turget, antequàm vltro citròque concitata in partem quampiam principem irruat; at nullo urgente orgasmo, status finis, quo perfecta existit concoctio, ac vacuatio spontè procedit, symptomatumque sæuitia mitescit. Tū enim materia fluida, & à reliqua puriore secreta iam est, simul natura præparatam illam expellere contendit: sed quia nimio perègrauata haud sola potest, arte subleuanda est. Cū enim nullus, vel certè languidus est naturæ motus, artis præsidium eius vices tempestiuè supplere debet. Vtràque purgandi occasio, ab Hippocrate expressa est, prima quæ ab orgasmo arripitur, *Aphorif. 10. lib. 4.* Medicari in valdè acutis, si materia turget, eadem die. Tardare enim in talibus malum est; altera quæ à perasmo captatur, *Aphorif. 22. lib. 1.* Concocta medi-

cari atque mouere, non cruda, neque in principiis, modò non turgcant.

D. Estne perfecta concoctio ad purgandum perpetuò expectanda?

C. Nequaquam. Etenim morbi incremento cum nondum perfectè, sed manifestè solum, & in fine principij, cum obscurè concocta est materia, hanc etiam quodammodo vacuare licet. Quod enim iussit Hippocrates concocta medicari, non solum perfectè, sed & quouis modo cocta complectitur, mox ea duntaxat à medicatione excipiens quæ ut in morborum principiis absolutè cruda sunt. Ita quæcumque vlllo modo concocta fuerint, medicari sinit, obscurè quidem cocta parcè, manifestè moderatius, perfectè verò cocta validius. Ut igitur in phlegmone non vniuersa materia retinetur, dum perfectam concoctionem sit assecuta, sed quicquid suppurat quotidie elicitur, ita sanè & in acutis statuendum morbis. Sic enim quicquid à purgatione reliquum erit, faciliùs natura domabit. Quin & vitiosus humor quisquis in prima corporis regione consistit, si

Cur perfecta concoctio ad purgandum non semper expectanda.

impetu quodam sponte mouetur, neque locis illis tenaciùs adhærescit, primo quoque tempore expurgandus est, nec eius concoctio expectanda, quamuis haud rectè possit ante coctionem exquisitè purgari, cùm in maioribus vasis conclusus, aut in aliquo viscere coërcitus putrescit. Est & alia ratione ante concoctionem purgandi necessitas, si præter continentem acuti morbi materiam, quæ aut in venis, aut in visceribus, aut in habitu est corporis, & cuius expectatur concoctio, alia quædam vitiosa in ventriculo, in intestinis, aut circum præcordia obheret, dolore, æstu, nausea, amarore, aliisve signis manifesta. Hæc enim omni tempore, etiam nondum vlla morbi apparente coctione, vtiliter potest, adhibita præparatione medicamento, trahi.

D. Quo die, quaque hora purgatio exhibenda?

Quo die,
quaque
hora pur-
gandum.

C. Tranquillo die purgatio tutior, expeditior verò perturbato. Quocirca impari die agitata materia expeditius, pari verò citiùs detrahitur; dū in quiete, nō in motu est. At cū morbi ac-

cessio fatigat, nulla vacuatione conuellendæ sunt vires. Sed perutilis & accommodata est vacuationi hora, quæ exacerbationem aliquantum præcedit. Tum enim cumulata materia exacui moueri que incipiens, promptius euellitur.

Quodcunque verò catharticum assumitur, expleta concoctione, exinanitòque ventriculo, iuuat; nec antequam exciderit, cibus est offerendus; nisi cum fortè maligna qualitate præditum est. Hebetatur enim eius vis, & obruitur, permistione cibi.

D. Quo pragnationis tempore mulieribus purgatio decernitur?

C. Grauidæ, inquit Hippocrates, sunt medicandæ, si materia turget, quarto mense, & vsque ad septimum. A iunioribus autem & senioribus cauendum. *Aphorism. 1. lib. 4.*

Quo pragnationis tempore purgatio grauidæ mulieri decernenda?

D. Cur nec primo, nec ultimo, sed intermedio duntaxat pragnationis tempore purgatio mulieri præscribenda?

C. Quia (inquit Galenus) foetus eandem cum vtero coherentiæ rationem habent, quam cum arboribus fructus. At hi prima generatione in-

firmis pediculis continentur : atque idè facilè decidunt, si quando ventus vehementior concusserit ; postea verò aucti ipsi difficulter à plantis dissoluuntur & diuelluntur, quemadmodum rursus vbi ad perfectam maturitatem peruenerint, sponte sua & sine vlla vi externa decidunt. Eodem sanè modo conceptus quoque primo à seminis submissione tempore, si animo aut corpore vehementiùs moueri mulierem contigerit, facilè ab utero abrumpuntur : quemadmodum & cùm perfecti iam fuerint, & adulti. Tempore verò intermedio firmiorem coalitum habent, & auulsioni minùs obnoxium. Quare mulier tum in utero ferens potest vehemètiore motus sustinere, sine foetus offensione, ac proinde tutiùs purgari, turgente materia.

D. *Quando purgationi supersedendum?*

Quando
purga-
tioni su-
perseden-
dum.

C. Cùm natura euacuationem aggredditur, sinenda est, dum opus compleuerit. Si morbum integrè iudicauit, nullo pharmaco proritanda ; nec aliud quicquam mouendum, vt præ-

cipit Hippocrates *Aph.* 20. l. 1. Sin-
quippiam ex imperfecta crisi dereli-
ctum fuerit, id cathartico detrahen-
dum; quoniam quæ relinquuntur in
morbis à crisi, recidiuos morbos face-
re consueverunt. *Aph.* 12. l. 2.

*D. Quæ purgationi preparatio præmis-
senda?*

C. Duplex ad purgationem præ-
paratio adhibenda, vna corporis, hu-
moris altera. Corpus ante purgatio-
nem, præcepto Hippocratis, *evger*
fluxum fiat, adedò vt. viæ omnes, per
quas medicamentum decurret, & per
quas noxius humor deriuandus ex-
purgandusque est, liberæ sint & ex-
peditæ. Primum igitur ventriculus
humorum copia minimè sit nausea-
bundus, ne haustum pharmacum
nimio perè auersetur, aut mox reuo-
mat. Nec intestina obstrueta noxio-
rum humorum cursum impedian-
t. Itaque nausea omnis ante purgatio-
nem summouenda aut vomitione, aut
inedia. Detracta enim de còsuetò cibo
portione natiuus calor crudòs humo-
res concoquit. Suppressa iamdiu-
alius, enemate mollienda. Noxius

Quæ pur-
gationi
præpara-
tio præ-
mittenda.

prætereà humor præparandus. Crassus lentusque, qualis est pituitosus & melancholicus, extenuandus & detergendus est oxymelite, apozematibus, iusculis, & aliis id genus medicamentis & alimentis accommodatis. Tenuis verò, ut biliosus, si feruentior & acrior, eius ante purgationem obtundenda est & frænanda acrimonia alterantium vsu.

D. *Est-ne perpetuò purgationi præmittenda præparatio?*

An perpetuò purgationi præmittenda præparatio.

C. Quisquis in corpore peccat humor tenuis ac fluidus, si ut in acutis morbis turget, statim initio nulla præparatione è quavis regione detrahendus est. Cum enim quasi oberrans fluctuet; & fluatrefluatque in venis atque visceribus, non admodum ægrè videtur medicamento cessurus. Sin autem parti cuiuspiam is firmitus inhærescit, vix nisi deterfus aut concoctus, & naturæ vi secretus, trahenti medicamento obtemperat.

D. *Hactenus exposuisti quando purgantia medicamenta sint exhibenda, nunc quando alterantia ex vsu sint, à te expecto.*

C. Fluxionis initio astringētia quæ hanc repellant sola ex usu sunt. In statu cū fluxio planè consistit, resoluentia: incremento verò utrāque permista. Aut si fortè congesta materia digeri minimè possè videatur, eius dein suppuratio procuranda. Medicamentorum autem extrinsecus ad mouendorū nulla stata hora, nisi cū ventriculū aut præcordia attingunt. Hæc enim cibo præmitti debent.

Quando
alceran-
tia ex usu
sint.

COROLLARIUM PHARMACEUTICUM.

D. Antequàm disputationi de Pharmacis finem imponam, quibus modis in nos agant, & qua methodo sint ad usum præparanda, luculenter explices velim?

C. Alliotica manifestis qualitatibus, tū primis, è temperamento; tū secundis, è materia primis qualitatibus instructa profectis, suam exerunt energiam.

Quibus
modis in
nos agant
medica-
menta
Alliotica

At Cathartica occultâ proprietate è forma prodeunte, peccantem in corpore humorem sibi peculiarem, ob substantiæ familiaritatem ac similitudinem attrahunt, quem natura subin-

Catharti-
ca.

402 N. Ab. Frambesary
de per aluum expellit.

Veterum
Medicinę
Procerũ
de purgã-
di modo
sententiã.

Noua me-
rindoli
opinio à
veterum
Archia-
trũ dog-
mate dif-
ferentia.

D. Licet veteres Medicina proceres & Græci & Arabes uno consensu omnes, Cathartica per os assumpta, à calore nativo in actum reducta, familiares undique humores attrahere prodiderint, qui in prima corporis regione sensim collecti, postea à natura facultatis expultricis operâ per aluum expurgantur: nouissimè tamen Merindolus, Medicus solertissimus (cum quo Parisijsolim apud D. Vayrium Procellarium degente magna mihi familiaritas fuit) exercitatione 7. purgationem non attrahendo, sed irritando fieri contendit. Inter medicamentâ purgatiua & humores qui purgantur, negat ullam esse substantiæ similitudinem, quâ illa possint hos attrahere. Nec qualitate tamen manifesta, nec occulta, ullam Cathartica attrahendi vim habere asserit. Verum artificialem purgationem naturâ fieri à Pharmacis irritatâ, ex eo demonstrare nititur, quod purgantibus omnibus acris quadam facultas insit, quæ facultatis expultricis stimulus existit.

Merindo-
li opinio
refutatur
à Candi-
dato.

C. Noua. Merindoli de medicamentis purgantibus doctrina, Mendendi artem ab antiquis Archiatriis jamdudum constitutam funditus

cuertere videtur, & quotidianis experimentis aduersari. Prima siquidem <sup>Argumē-
tum.</sup> methodi therapeuticæ lex, ad curandos morbos ab humoribus in corpore peccantibus ortos, cacochymiam imprimis demendam esse iubet proprijs Catharticis, biliosam Cholagogis, pituitosam Phlegmagogis, melancholicam Melanogogis. At si Cathartica humores noxios electione non attrahant, sed quælibet quoscūq; humores citra delectū iritatâ naturâ deturbēt, frustra præscribūtur à Medicis ad detrahendam cacochymiâ biliosam Cholagoga, ad pituitosâ Phlegmagoga, & ad melâcholicâ Melanogoga.

Quinetiam si Cathartica noxios humores expellunt, iritando naturam ad eorum excretionem, procul dubio naturæ vim inferunt. Quæ autem vim inferunt, contraria sunt. At si contrarietatis vi fieret expulsio, oporteret humores noxios, non per alium excerni, sed vel in habitum corporis impingi, vel per cutem expelli. Quoniam enim expellentia non ad se, sed à se pulsa fugant, medicamentorum per os assum-

ptorum vis purgatrix à ventriculo in
 intestina, ab ijs in mesaraicas lacteas,
 indéque in maiores venas, à majori-
 bus in minores delata, humores intus
 stabulantes à se fugando, nunquam in
 alium propulsabit. Quocirca rationi
 consentaneum est, non contrarietate,
 sed familiaritate, purgandorū humo-
 rum attractionem à purgantibus me-
 dicamentis fieri. Quid? Nonne rha-
 barbarum & aloë flava & amara, bi-
 lē flavā & amarā trahūt: turpeti cor-
 tex, agaricus, cnicus & elleborus al-
 bus pituitam albam: myrobalanus
 Inda, & elleborus niger, humorem
 melancholicum nigrum? Ergo &
 qualitatū, quę in amborum substan-
 tia sunt, analogia quædam, & recon-
 dita totius substantiæ similitudo, ex
 simili elementorum quatuor mistione
 manans, saltem in quibusdam colore
 & sapore, nedum experientia percipi-
 tur. Falsum insuper omnia Cathartica
 acritudine insigni prædita esse, qua
 naturam ad expulsionem iritent.
 Nonne plurima sunt dulcia, saltem
 minimè acria pharmaca, quæ lubri-
 cando & leniendo purgant, vt cassia,

violarum flores & semen, polypodiū, hermodactylus & similia? Incaſſum reſpondebit his ineſſe acritudinem, quæ maiori dulcis ſubſtantiæ moli tam altè immerſa eſt, vt diſcerni nequeat. Maior quippè dulcis ſubſtantiæ quantitas, acrimoniam demulcens, purgatoriam illius vim exolueret.

Præclare demonſtraſti propter ſubſtantia ſimilitudinem catharſin attrahendo fieri, contra Merindolum. Sed cur Catharticum, humorem trahit, non ab humore trahitur?

C. Quia ob calorem ſuum eſt potentius in attrahendo. Sunt omnia purgantia poteſtate calida. Eadem ſi non purgant, cocta in humorem tranſeunt, qualem attrahunt: niſi quòd horum quædam in nobis corrupta in venenum abeunt, vt poſt Galenum Syluius aſſerit, lib. 2. meth. medicamenta componendi.

D. Sed alia non pauca pharmaca ſunt, & vehementius calida, ad purgandum inepta?

C. Concedo, propterea quòd nulla intercedit inter pharmacum, & hu-

Cur Catharticū humorem attrahit, nō ab humore attrahitur.]

Obiectio.

Reſponſio.

morem noxium familiaritas, nullaq;
substantialis formæ similitudo, sed
diuerfa idiosyncrasia.

Quodd ac-
curatè
sint præ-
paranda
medica-
menta.

*D. Ut alimenta sic medicamenta
priusquam administrentur, accuratè præ-
paranda sunt, ne ullam naturæ noxam
inferant. Quotuplex est pharmacôn præ-
parandorum methodus?*

Quotu-
plex
pharma-
côn præ-
parando-
rum me-
thodus.

*C. Duplex. Methodica siquidem
medicamentorum præparatio, est
Synthetica, vel Analytica. Synthetica,
quæ ad corrigenda basis vicia, vtilium
adjectione perficitur. Analytica, quæ
inutilium basis impuritatum detra-
ctione fit. Illa jamdudum à Pharma-
copœis: hæc seculo nostro à Chymi-
cis est vsitata.*

*D. Chymica arti operam aliquando na-
uasti?*

Quodd
Pharma-
ceutica
method^o
ram Ana-
lytica,
quàm
Syntheti-
ca, Medi-
co sit sci-
tu neces-
saria.

C. Ego singulari studio medica-
mentum in sua elementa retexendi
rationem à Chymix peritis didici.
Nec enim minùs mihi videtur Medi-
co, scitu necessaria, pharmaci resol-
uendi, quàm componendi methodus.*

*D. Verùm ex te quero, utrùm medi-
camenta vulgari modo à Pharmacopœis
per synthesein concinnata, an exquisitiùs*

per analysin elaborata, Chymico ritu, tibi videantur præstantiora?

C. Vtræque medicamenta methodicè parata, sunt vtilia. Sed plebeijs atque rusticis hominibus admodum robustis, vulgaria sunt conuenientiora: nobilibus verò pueris, virginibus, mulieribus, viris delicatioribus, senioribus, ardentibus in literarum studia, & in Rempublicam incumben-
tibus, Chymica magis idonea; quòd mitiora, tutiora, ac suauiora existant, & exigua mole plurimùm polleant: proinde citra fastidium, necnon & citra noxam, exhiberi queant.

Quòd
vulgo
Vulgaria;
Proceri-
bus verò
Chymica
remedia
sint ap-
tiora.

D. *Aduersarij tamen non pauci, hac inutilia, periculosa, & perquam incommo-
da esse prædicant, ut omnes ab eorum usu deterreant.*

C. Haud grauabor quàm turpiter allucinentur ostendere, eorùmque argutias inanes & friuolas felle.

Cur hæc
accusetur
ab Ad-
uersariis.

D. *Non opusest (aiunt) simplicia me-
dicamenta in sua principia resolvere, cum
integra curandis morbis à se satis idonea
sint?*

1. Argu-
mentum
Aduersa-
riorum.

C. Respondeo: Simplicia medica-
menta sæpius ob substantiæ crassitudi-

Quòd re-
media

nem, aut impuritatem, vires suas proferre non posse. Ea igitur artis beneficio tenuiora atque puriora reddere expedit. Vt enim farinæ flos à furfure secretus, alendo corpori magis idoneus, quàm frumentum integrum; sic pura rhabarbari, cinnamomi, aloës, chalcanti, & aliorum medicamentorum essentia, curandis morbis aptior, quàm ipsamet integra pharmaca admodum impura. Adde quod medicamenta, à natura procreata, alias plerùmque noxias, & Medicæ intentioni cōtrarias qualitates sortita sint, quæ artis adminiculo demenda sunt.

D. Illicò replicant Aduersarii; admisceri posse, quæ noxiis & aduersis qualitatibus resistunt.

Cur Analytica medicamentorum præparatio, Synthetice sit anteponenda.

C. At hoc modo, medicamenti moles ægrotanti molesta, sine vlla necessitate augebitur. Cùm artis beneficio liceat, à materiæ crassamento, nobiliorem remedij portionem vindicare, ac qualitates noxias, vel intentioni nostræ aduersas, detrahare, vt reliquæ liberiores habeât agēdi potestatem; cur retentis inutilibus, alia miscebuntur, quæ vel nihil ad rem facient, vel vtilibus

vtilibus quoque facultatibus incommodabunt?

D. Pergunt assenerare remedia Chymicè preparata, sui ipsius respectu etiamnum inutilia esse; quod adeo subtilia redantur, ut vires suas amittant. Id probabiliter ex eo videntur adstruere, quod chymica dissolutione medicamenti, forma destruat, à qua vires procedunt. Qua ratione teli huius aciem retundes?

C. Non pereunt facultates, siue naturam remedij spectes, à qua permanant, siue artificis industriam consideres, qui profert illas: quin potius vegetiores euadūt. Natura quippe remedij ex diuersarum partium syndrome, facultates sortita est; quarum aliæ formam totius sequuntur, aliæ partium singularum temperiem. Ingenuè quidem fateor, abolita totius forma pessum ire priores, at posteriores pernego: imò à formæ iugo exemptas, liberiùs suis muniis defungi contendendo. Si remedia vulgari modo parata per infusiones & decoctiones, sua purgandi, vel discutendi, aliudve simile præstandi facultate non spoliantur, quo iure Chymica iisdem elabor-

Quòd res
media
Chymicè
præpara-
ta vires
suas non
amittant.

Quòd
partes à
toto
auulsæ
suas reti-
neant vi-
res.

Quòd si
infusa &
decocta
suas reti-
nent vir-
tutes,
multò
magis
Chymica.

rata vel nonnihil diuersis operandi modis, spoliata dicentur? Extractiones enim & destillationes non vtilem facultatem demunt; sed quòd inutile illius actionem impedire aut retardare possit, seiungunt. Quin & multò efficaciores sunt, quàm infusiones & decoctiones, ad traducendam de subiecto in subiectum partis formam & temperiem, à corrupto toto secretam. Vnde Chymici medicamenti vis vegetior & alacrior emergit. Nónne medicus artis Chemicæ famulatu naturam imitatur, quæ cibos à ventriculo acceptos, sepositis crassioribus excrementis, ad hepar prouehit; & inde puriorem salubrioremque alimenti portionem, caloris innati mirifica potestate extractam, venarum ministerio, ad singulas corporis partes alendas transfert? Neque enim cibi in ventriculo leuiter cocti statim nutriunt, plures adhuc mutationes sustinere coguntur, antequàm in familiare alimentum cuiusque partis euadant. Ita nec fœliciter medicamenta curant, quæ duntaxat leuiter elixa, vel aliter alterata, afflictis interancis

obiciuntur. Exquisitiùs præparari necesse est, vt, absque mora, ad extimas corporis partes, in modum nutrimenti ducantur.

D. Demonstrasti Chymicorum remedium facultates illibatas manere. Saltem non tam efficaces, dicent Aduersarij, quòd tenello subiecto adherentes, pristini vigoris haud exiguum amiserint. Quemadmodum igneus calor, qui flamma tenuioris minus est efficax, quàm pruna, candentisve ferri, aut alterius solidi corporis. Quid ad hoc obiectum respondes?

C. Non quidem abnuo collectas vires intensiores, & in angustam reductum calorem ardentiorum deprehendi. Sed ego id ipsum dico, chymica præparatione effectum dari. Dum enim simplex remedium est integrum, quæ illius portio caliditatis eximias vires præpollentes obtrinebat, non ijs sola potitur; sed reliquis, quibus cum coheret, impertit; vt ita in diuersa ex suo fonte distractus calor imminuatur. At quàm primùm ea pars reliquarum, quibus adhæsit, consortio est liberata, suas sibi possidet dititias. Ergo tantùm abest, vt minores sint illius fa-

Quod nō
subiecti
respectu
Chymica
remedia
inefficacia
sint.

cultates, vt triplò quadruplòve sint potentiores. An non hoc est, quod dicit *Galenus*, quæ partium sunt magis subtilium, promptius agere; tardius quæ crassarum, licet eadem amborum vigeat facultas. Itaque nihil subiecti tenuitas obsistit. Cibis quantumvis tenuis non amittit vires suas. Testatur experientia Chymico artificio ad eam tenuitatem cibum redigi, vt sub-
 latis partibus, inutilibus, quod reli-
 quum est, in omnes corporis regiones distractum, minori cum labore, ab afflicto licet calore, in substantiam nostram commutetur. Quod si nutriendi facultati non obfuerit tenuitas partium, amilla purgandi virtuti incommodabit.

Quod
 peritus
 artifex
 Chymi-
 cus non
 sit causa
 depravati
 remedij.

Nec artificis culpâ prosternentur remediorum facultates, si rectè cal-
 leat artem separandi à se inuicem partes heterogeneas, nouerisque gra-
 dus ignis qui requiritur, & alia quæ ad rem pertinent. Nec enim quæ vis purgandi inest rhabarbaro, vltione secer-
 net, nec distillatione, nisi eam prius affusi vehiculi ope à terrea com-
 page eduxerit. Sibi vis effera vomi-

tum ciendi, interanea subuertit. Eam autem nemo domabit, nisi ignis jugi tormento halitus suos penitus absumpserit, & ex cathartico diaphoreticum effecerit. Itaque non inficias eo, si quibus non decet modis tractetur remedium, eius facultates euanescere. Sin obseruetur separandorum conditio, ut quæ penitus terreæ substantiæ affixa hærent, ardentiori ignis gradu expugnentur; quæ æræa magis & fluida, moderatiore: tantum abest, ut spolientur remedium portiones suis congruentibus agendi qualitatibus, ut ipsæmet validiores suum minus absoluant, minisque afflictam naturam fatigent. Validiores autem tum esse facultates, nemo est qui in dubium vocare aufit. Patet hoc ex Hippocratis, Galeni, aliorumque consensu, qui remedia diuersis partibus donata, soluenda existimant, ut eò liberius vires suas exerçant. Sed an non auctoritatem exsuperat ratio? Nam luce meridiana clarius est, diuersarum partium diuersas vires, inuicem iunctas, mutuis operis intercipi & impediri. Sic quando vna sola qua-

quod facultates remedium Chymicorum validiores sint, quam integrorum.

litas requiritur, opportunius futurum est, si ea recluso toto producat, sepositis omnibus, quæ actionem eius vel impedire, vel deprauare possent.

D. Adversarij insuper inutilia putant esse Chymica remedia, quod cum exigua sint molis, innata corporis vi, ad nihilum ita redigantur, ut vel intransitu dispercant, vel in morbofo conflictu promptè succumbant.

C. Quantumvis amictu partium inutilium liberata, quoad molem substantiæ, sunt nudiora: non tamen quàm priùs infirmiora; cum quod quantitati decessit, qualitatis augmentum planè liberale compenset. ut videre est in anisi, cinnamomi, atque chalcanti essentia; cuius duæ vel tres guttæ plus habent virtutis, quàm magna quantitas integræ substantiæ. Hinc patet inutilia non esse Chymica remedia.

2. argu-
mentum
Adversa-
riorum.

*D. Hactenus primam Adversariorum rationem refutasti: pergamus ad secundam. Non videntur periculo vacare Chymica remedia. Gradum caliditatis eximium, eo præparationis momento acquisi-
nere. Valentius agunt, quàm sustineat hu-*

manat temperiei mediocritas. Prosternunt vires, & caloris externi flammis totum corpus replent. Non enim potest negari externum ignem, quo solo utuntur Chymici, suae caliditatis notas, rei quam lambit, imprimere. Quod prater euentum quotidianorum experimentorum, ratio quoque persuadet. Omnis enim actionis finis is est ut patiens reddatur simile agenti. Hoc vel sola docet alimentorum confectio, cuius ultimus gradus est assimilatio. At iam non est qualitas, quae promptius caliditate se insinuet patienti rei. Tenuis est, subit quantumvis arctissimos meatus, remouet obstacula: quod parum resistit, in se conuertit: quod obstinatius fatigat, quoad potest, sique non superat totum, aliquid saltem illius sibi assimilabile reddit: reddit calidum, & pro patientis qualitatis conditione, vel siccum, vel humidum. Accedit auctarium caloris maius, ardens vinum, cuius ope extractiones suas moliantur Chymici. His perpensis, ea remedia, qualitatis prima calida & secunda cuiusvis alterius excessu, periculosa sunt: ut ipsi relictis tutior sit antiquorum usus futurus.

quod
Chymica
remedia
non sint
periculosa.

C. Ego cum Galeno & Aristotele fateor, combustorum omnium nul-

lum planè esse frigidum, quando quidem inhaeret illis. ἐμπύρευμα. Id tamen haud difficulter aqua abluatur. Ac licet medicamenta, quæ acria non sunt, vstione calidiora reddantur; quæ tamen acria sunt, frigidiora fiunt; vel ipso Galeni testimonio. Ita quæ vritur chalcitis, minùs fit acris, nimirum partibus eius tunc quidem ad maiorem tenuitatem reductis, ceu aliorum vstorum omnium; quæ si lauentur, moderatiora euadunt, minùsque mordacia. Est ergo Galeni hæc sententia, quæ æreco sunt amittere plurimùm caloris, vtpote tenuiora. At calor in angustum actus, sumit vires, & ardens pruna instantiùs vrit, quàm flamma. Quæ verò non sunt acria, ignis contagio fiunt calidiora, quàm priùs fuerant. Sed qua caliditate? Quam vocat galenus ἐμπύρευμα. Quod cum facilè corrigatur, nil est inde metuendum remedio, ne fiat calidius. Corrigitur enim, vel ablutione, vel digestionem. Nónne arsenicum cum nitro calcinatum, acrimoniam suam, mordacémque calorem amittit, dum sæpiùs lauatur aqua calida? Ardens

præterea spiritus vini, vehiculum est
 educendæ spirituosæ virtutis. Is ab
 extracta virtute faciliè separatur, ut
 nil caloris remaneat, vel perpusil-
 lum. Sin remaneat, iam Medici ra-
 tionalis consilio, non nisi eo loco, &
 tempore, quod scopus curationis per-
 mittit, adhibetur. Vt nihil sit, quod
 caliditatis metu suspecta ea reddere
 oporteat. Ergo si tandem quæ vrun-
 tur, vel affuso vini spiritu extrahun-
 tur, libera sunt à caliditatis nimie ca-
 lumnia; quantò veriùs ea, quæ vel di-
 stillantur, vel alio potius, quàm ignis
 calore præparentur? An ergo timea-
 tur caliditas? quæ vel non nocet, si ad-
 sit: vel omnino non adest? Quid enim
 iustius alieno exasperatum calore
 censeriqueat, diuersis salium generi-
 bus? At plures illorum frigidos esse,
 suæque qualitatis notas de se dare,
 eruditi Chymici docent, experientia
 quotidianis casibus adiuti. Sed agè,
 largiamur calida esse quæcûmque ex-
 ternam acrimoniam suæ tenuitate cu-
 tim exuleerant. An idèò introrsum
 quoque adhibita, eiusdem violentia
 censenda? Ranunculus & allium esui

Quod ca-
 lida, quæ
 tûmvis a-
 acria, in-
 trò quo-
 que acci-
 pi pos-
 unt.

morem noxium familiaritas, nullâq;
substantialis formæ similitudo, sed
diuersa idiosyncrasia.

Quodd ac-
curatè
sint præ-
paranda
medica-
menta.

*B. Ut alimenta sic medicamenta
priusquam administrentur, accuratè præ-
paranda sunt, ne ullam naturæ noxam
inferant. Quotuplex est pharmacôn præ-
parandorum methodus?*

Quoru-
plex
pharma-
côn præ-
parando-
rum me-
thodus.

*C. Duplex. Methodica siquidem
medicamentorum præparatio, est
Synthetica, vel Analytica. Synthetica,
quæ ad corrigenda basis vitia, vt ilium
adjectione perficitur. Analytica, quæ
inutilium basis impuritatium detra-
ctione fit. Illa jamdudum à Pharma-
copœis: hæc seculo nostro à Chymi-
cis est vsitata.*

*D. Chymica arti operam aliquando na-
uasti?*

Quodd
Pharma-
ceutica
method^o
tam Ana-
lytica,
quàm
Syntheti-
ca, Medi-
co sit sci-
ru neces-
saria.

C. Ego singulari studio medica-
mentum in sua elementa retexendi
rationem à Chymix peritis didici.
Nec enim minùs mihi videtur Medi-
co, scitu necessaria, pharmaci resol-
uendi, quàm componendi methodus.*

*D. Verùm ex te quero, utrùm medi-
camenta vulgari modo à Pharmacopœis
per synthese concinnata, an exquisitiùs*

per analysin elaborata, Chymico ritu, tibi videantur præstantiora?

C. Vtraque medicamenta methodicè parata, sunt vtilia. Sed plebeijs atque rusticis hominibus admodum robustis, vulgaria sunt conuenientiora: nobilibus verò pueris, virginibus, mulieribus, viris delicatioribus, senioribus, ardentè in literarum studia, & in Rempublicam incumben- tibus, Chymica magis idonea; quòd mitiora, tutiora, ac suauiora existant, & exigua mole plurimùm polleant: proinde citra fastidium, necnon & citra noxam, exhiberi queant.

Quòd
vulgo
Vulgaria,
Proceri-
bus verò
Chymica
remedia
sint ap-
tiora.

D. *Aduersarij tamen non pauci, hac inutilia, periculosa, & perquam incommoda esse prædicant, ut omnes ab eorum usu deterreant.*

C. Haud grauabor quàm turpiter allucinentur ostendere, eorùmque argutias inanes & friuolas refellere.

Cur hæc
accusetur
ab Ad-
uersariis.

D. *Non opusest (aiunt) simplicia me- dicamenta in sua principia resolvere, cum integra curandis morbis à se satis idonea sint?*

1. Argu-
mentum
Aduersa-
riorum.

C. Respondeo: Simplicia medica- menta sæpiùs ob substantiæ crassitudi-

Quòd re-
media

nem, aut impuritatem, vires suas proferre non posse. Ea igitur artis beneficio tenuiora atque puriora reddere expedit. Vt enim farinæ flos à furfure secretus, alendo corpori magis idoneus, quàm frumentum integrum; sic pura rhabarbari, cinnamomi, aloës, chalcanti, & aliorum medicamentorum essentia, curandis morbis aptior, quàm ipsamet integra pharmaca admodum impura. Adde quod medicamenta, à natura procreata, alias plerùmque noxias, & Medicæ intentioni cōtrarias qualitates sortita sint, quæ artis adminiculo demenda sunt.

D. Illicò replicant Aduersarii; admisceri posse, quæ noxiis & aduersis qualitatibus resistunt.

Cur Analytica medicamentorum præparatio, & synetheticæ sit anteponenda.

C. At hoc modo, medicamenti moles ægrotanti molesta, sine vlla necessitate augebitur. Cùm artis beneficio liceat, à materiæ crassamento, nobiliorem remedij portionem vindicare, ac qualitates noxias, vel intentioni nostræ aduersas, detrahare, vt reliquæ liberiores habeant agēdi potestatem; cur retentis inutilibus, alia miscebuntur, quæ vel nihil ad rem facient, vel
vtilibus

utilibus quoque facultatibus incommodabunt?

D. Pergunt assenerare remedia Chymicè preparata, sui ipsius respectu etiamnum inutilia esse; quod adeo subtilia reddantur, ut vires suas amittant. Id probabiliter ex eo videntur adstruere, quod chymica dissolutione medicamenti, forma destruat, à qua vires procedunt. Qua ratione teli huius aciem retundes?

C. Non pereunt facultates, siue naturam remedij spectes, à qua permanant, siue artificis industriam consideres, qui profert illas: quin potius vegetiores evadūt. Natura quippe remedij ex diuersarum partium syndrome, facultates sortita est; quarum aliæ formam totius sequuntur, aliæ partium singularum temperiem. Ingenuè quidem fateor, abolita totius forma pessum ire priores, at posteriores pernego: imò à formæ iugo exemptas, liberiùs suis muniis defungi contendendo. Si remedia vulgari modo parata per infusiones & decoctiones, sua purgandi, vel discutendi, aliudve simile præstandi facultate non spoliantur, quo iure Chymica iisdem labo-

Quòd remedia Chymicè preparata vires suas non amittant.

Quòd partes à toto auulsæ suas retineant vires. Quòd si infusa & decocta suas retinent vires, multò magis Chymica.

rata vel nonnihil diuersis operandi modis, spoliata dicentur? *Extractio-*nes enim & *destillationes* non vtilem facultatem demunt; sed quòd inutile illius actionem impedire aut retardare possit, seiungunt. Quin & multò efficaciores sunt, quàm infusiones & decoctiones, ad traducendam de subiecto in subiectum partis formam & temperiem, à corrupto toto secretam. Vnde Chymici medicamenti vis vegetior & alacrior emergit. Nónne Medicus artis Chemicæ famulatu naturam imitatur, quæ cibos à ventriculo acceptos, sepositis crassioribus excrementis, ad hepar prouehit; & inde puriorem salubrioremque alimenti portionem, caloris innati mirifica potestate extractam, venarum ministerio, ad singulas corporis partes alendas transfert? Neque enim cibi in ventriculo leuiter cocti statim nutriunt, plures adhuc mutationes sustinere coguntur, antequàm in familiare alimentum cuiusque partis euadant. Ita nec fœliciter medicamēta curant, quæ duntaxat leuiter elixa, verbaliter alterata, afflictis interaneis

obiiciuntur. Exquisitiùs præparari
necesse est, vt, absque mora, ad exte-
mas corporis partes, in modum nu-
trimenti ducantur.

*D. Demonstrasti Chymicorum reme-
diorum facultates illibatas manere. Sal-
tem non tam efficaces, dicent Aduersarij,
quòd tenello subiecto adherentes, pristino
vigoris hand exiguum amiserint. Quem-
admodum igneus calor, qui flamma te-
nuioris minus est efficax, quàm pruna,
candentisve ferri, aut alterius solidi cor-
poris. Quid ad hoc obiectum respondes?*

C. Non quidem abnuo collectas Quod nō
subiecti
respectu
Chymica
remedia
ineffica-
cia sint.
*vires intensiores, & in angustam re-
ductum calorem ardentiorē depre-
hendi. Sed ego id ipsum dico, chymi-
ca præparatione effectum dari. Dum
enim simplex remedium est integrum,
quæ illius portio caliditatis eximias
vires præpollentes obinebat, non ijs
sola potitur: sed reliquis, quibus cum
coheret, impertit; vt ita in diuersa ex
suo fonte distractus calor imminua-
tur. At quàm primùm ea pars reliqua-
rum, quibus adhæsit, consortio est li-
berata, suas sibi possidet diuitias. Ergo
tantùm abest, vt minores sint illius fa-*

cultates, vt triplò quadruplòve sint potentiores. An non hoc est, quod dicit *Galenus*, quæ partium sunt magis subtilium, promptius agere; tardius quæ crassarum, licet eadem amborum vigeat facultas. Itaque nihil subiecti tenuitas obstitit. Cibus quantumvis tenuis non amittit vires suas. Testatur experientia Chymico artificio ad eam tenuitatem cibum redigi, vt sublatis partibus inutilibus, quod reliquum est, in omnes corporis regiones distractum, minori cum labore, ab afflicto licet calore, in substantiam nostram commutetur. Quod si nutriendi facultati non obfuerit tenuitas partium, nulla purgandi virtuti incommodabitur.

Quod
peritus
artifex
Chymi-
cus non
sit causa
deprauati
remedij.

Nec artificis culpâ prosternentur remediorum facultates, si rectè calcat artem separandi à se inuicem partes heterogeneas, noueritque gradus ignis qui requiritur, & alia quæ ad rem pertinent. Nec enim quæ vis purgandi inest rhabarbaro, vstione secerneret, nec distillatione, nisi eam prius affusi vehiculi ope à terrea compage eduxerit. Subij vis effera vom-

tum ciendi, interanea subuertit. Eam autem nemo domabit, nisi ignis jugi tormento halitus suos penitus absumpserit, & ex cathartico diaphoreticum effecerit. Itaque non inficias eo, si quibus non decet modis tractetur remedium, eius facultates euanescere. Sin obseruetur separandorum conditio, ut quæ penitus terreæ substantiæ affixa hærent, ardentiori ignis gradu expugnentur; quæ æreæ magis & fluida, moderatiore: tantum abest, ut spolientur remedium portiones suis congruentibus agendi qualitatibus, ut ipsæmet validiores suum munus absoluant, minuscule afflicta naturam fatigent. Validiores autem tum esse facultates, nemo est qui in dubium vocare auit. Patet hoc ex Hippocratis, Galeni, aliorumque consensu, qui remedia diuersis partibus donata, soluenda existimant, ut eò liberius vires suas exerçant. Sed an non auctoritatem exsuperat ratio? Nam luce meridiana clarius est, diuersarum partium diuersas vires, inuicem iunctas, mutuis operis intercipi & impediri. Sic quando vna sola qua-

quod facultates remedium Chymicorum validiores sint, quam integrorum.

litas requiritur, opportunius futurum est, si ea recluso toto producat, sepositis omnibus, quæ actionem eius vel impedire, vel deprauare possent.

D. Adversarij insuper inutilia putant esse Chymica remedia, quod cum exigua sint molis, innata corporis vi, ad nihilum ita redigantur, ut vel in transitu dispercant, vel in morbofo conflictu promptè succumbant.

C. Quantumvis amictu partium inutilium liberata, quoad molem substantiæ, sunt nudiora: non tamen quàm priùs infirmiora; cum quod quantitati decessit, qualitatis augmentum planè liberale compenset. ut videre est in anisi, cinnamomi, atque chalcanti essentia; cuius duæ vel tres guttæ plus habent virtutis, quàm magna quantitas integræ substantiæ. Hinc patet inutilia non esse Chymica remedia.

2. argu-
mentum
Adversa-
riorum.

D. Hactenus primam Adversariorum rationem refutasti: pergamus ad secundam. Non videntur periculo vacare Chymica remedia. Gradum caliditatis exiguum, eo preparationis momento acquiescere. Valentius agunt, quàm sustineat hu-

manat temperiei mediocritas. Prosternunt vires, & caloris externi flammis totum corpus replent. Non enim potest negari externum ignem, quo solo utuntur Chymici, sua caliditatis notas, rei quam lambit, imprimere. Quod prater eventum quotidianorum experimentorum, ratio quoque persuadet. Omnis enim actionis finis is est ut patiens reddatur simile agenti. Hoc vel sola docet alimentorum confectio, cuius ultimus gradus est assimilatio. At iam non est qualitas, quæ promptius caliditate se insinuet patienti rei. Tenuis est, subit quantumvis artissimos meatus, remouet obstacula: quod parum resistit, in se conuertit: quod obstinatiùs fatigat, quoad potest, sique non superat totum, aliquid saltem illius sibi assimilabile reddit: reddit calidum, & pro patientis qualitatis conditione, vel siccum, vel humidum. Accedit auctarium caloris maius, ardens vinum, cuius ope extractiones suas moliantur Chymici. His perpensis, ea remedia, qualitatis prima calida & secunda cuiusvis alterius excessu, periculosa sunt: ut ipsi relictis tutior sit antiquorum usus futurus.

C. Ego cum Galeno & Aristotele fateor, combustorum omnium nul-

quod
Chymica
remedia
non sint
periculo-
sa.

hum planè esse frigidum, quando quidam inhaeret illis. ἐμπρόσθεν. Id tamen haud difficulter aqua abluatur. Ac licet medicamenta, quæ acria non sunt, vstione calidiora reddantur; quæ tamen acria sunt, frigidiora fiunt, vel ipso Galeni testimonio. Ita quæ vritur chalcitis, minùs fit acris, nimirum partibus eius tunc quidem ad maiorem tenuitatem reductis, ceu aliorum vstorum omnium; quæ si lauentur, moderatiora euadunt, minùsque mordacia. Est ergo Galeni hæc sententia, quæ æreco sunt amittere plurimùm caloris, vtpote tenuiora. At calor in angustum actus, sumit vires, & ardens pruna instantiùs vrit, quàm flamma. Quæ verò non sunt acria, ignis contagio fiunt calidiora, quàm priùs fuerant. Sed qua caliditate? Quam vocat galenus ἐμπρόσθεν. Quod cum facilè corrigatur, nil est inde metuendum remedio, ne fiat calidius. Corrigitur enim, vel ablutione, vel digestionē. Nónne arsenicum cum nitro calcinatum, acrimoniam suam, mordacemque calorem amittit, dum sæpiùs lauatur aqua calida? Ardens

præterea spiritus vini, vehiculum est
educendæ spirituosæ virtutis. Is ab
extracta virtute faciliè separatur, ut
nil caloris remaneat, vel perpusil-
lum. Sin remaneat, iam Medici ra-
tionalis consilio, non nisi eo loco, &
tempore, quod scopus curationis per-
mittit, adhibetur. Vt nihil sit, quod
caliditatis metu suspecta ea reddere
oporteat. Ergo si tandem quæ vruntur,
vel affuso vini spiritu extrahuntur,
libera sunt à caliditatis nimiae ca-
lumnia; quanto veriùs ea, quæ vel di-
stillantur, vel alio potius, quàm ignis
calore præparantur? An ergo timea-
tur caliditas? quæ vel non nocet, si ad-
sit: vel omnino non adest? Quid enim
iustius alieno exasperatum calore
cenferi queat, diuersis salium generi-
bus? At plures illorum frigidos esse,
suxque qualitatis notas de se dare,
eruditi Chymici docent, experientia
quotidianis casibus adiuti. Sed agè,
largiamur calida esse quæcùmque ex-
ternam acrimoniæ suæ tenuitate cu-
tim exulcerant. An idèò introrsum
quoque adhibita, eiusdem violentia
censenda? Ranunculus & allium esui

Quòd ca-
lida, quæ-
tùmvis a-
cria, in-
trò quo-
que accie-
pi pos-
sunt.

sunt apta, quæ tamen extimam corporis superficiem in vesicam tollent. Et quis nescit cantharidum vsum introsum quoque antiquitus familiarem extitisse, nullo timore illius stigmatis, quod foris inurit? Est ergo diuersitas patientis subiecti animaduertenda. Quæ sunt validiora, maiorem sentiunt interaneorum repugnantiam, ob innati caloris robur. Hoc cum exterius minùs se proferat, magis grassatur remedium. Vt ita haud maior metus validioris medicamenti, ab eiusdem prouido vfu nos auocare oporteat. Facultates quidem augentur, non tamen omnes, sed eæ tantùm quas augeri expedit, quandoquidem excessus malignarum artificis præparatione imminuitur. Et licet auctiores euaserint vtilis illæ facultates, non tamen maiori periculo vsurpantur, quàm cætera solent vulgari modo parata remedia, quia minori quantitate exhibentur. Nam pro scrupulo vno Chymicorum medicamentorù, dragmæ duæ, & quandoque plures, vulgò dantur aliorum, iam si dragmæ duæ, vel plures, vacant periculo, longè

quod facultates
vtilis licet in-
crecant,
periculo-
sum re-
medium
nequaquã
cedant.

verius scrupulus vnus, seu paulò plura grana.

D. Adversarij fortasse questionem hinc tibi proponent, Candidate. Cum integumenta, quibus involuit natura remedium actuosas vires, ars euoluat, ut optato liberius grassentur; alia dein adiungat quæ retundunt, tardantve excessum earum; an non præstitisset naturalem misturam retinuisse? Huiusce rei solutionem aperte profer?

C. Nequaquam præstitisset, Præceptor. Alio enim fine miscentur à natura diuersæ remedium partes, alio ab arte. Natura vitam spectat vegetantis: ars Medicum vsum. Quæ ergo miscet natura, longè arctius deuincit, ut inuicem qualitates communicent: quæ verò ars, liberius, in eum duntaxat finem, ut alterius actioni, ceu frenum aliquod, alterum adhibeatur. Exemplo sit anisi oleum. Hoc integro aniso infirmum est, & magna seminis integri quantitas vix ac ne vix quidem id efficit, quod olei artificio Chymico extracti guttæ perpaucæ, quæ saccharo permixtæ ad sedandam tussim mirificè prosunt. Ergo quæ ars

Quod alio fine misceantur ab arte remedia, alio à natura.

420 N. Ab. Frambesary
admisceat, reprimunt facultatum ex-
cessum, quæ naturâ, non plus reprimunt, quàm impediunt.

Argumentum
Aduersario-
rum.

D. Tertia Aduersariorum ratio exa-
minanda superest. Incommoda secum ve-
hunt Chymicorum operosa preparationes,
inquiunt. Pharmacopœe nocent, cum
breuius afferrentur, in præcipitio corrup-
tionis constituta. Nocent agrotis, dum ca-
riora sunt, quàm vol tenuiores ipsius pa-
tiantur facultates. Pereunt facile, cum sint
tenuis essentia, quæ dièto citius euanesceat.
Carè prostant, quòd magno & labore &
pretio artificibus constet illorum confectio.
Quod ipsis responsum dabis?

Quòd
Chymica
remedia
non sint
corrup-
tioni
obnoxia.

C. Ego quicquid obijciunt pernego.
Vult Hippocrates remedia debere
esse εἰς παλαιὴν μεμνηνύμενα, quòd vetu-
statem ferant, accuratè elaborata.
Talia sunt Chymicorum. Quæ enim
corrumpuntur, aquosæ humiditatis
vitio eam aduersitatem incurrunt.
Extraneus calor latentem humorem,
quo cohærebant partes totius conti-
guæ, educit. Hæ vinculo ablato, iam
dilabuntur, & pessum eunt. Hoc est
quod dicit Galenus : φαίνεται δὲ ὕλη
ἐκ τῆς ὕλης πᾶσι γίνεσθαι σαπιδίαν, ἀπὸ τῆς δὲ

διεστάνει, ἀλλοτεῖν τε καὶ παρὰ φύσιν θερ-
μῷ, συνειπνίζεσθαι δὲ ὑπὸ τῆς ἀκυσήσεως.

Videtur putredo omnis ex materia
gigni humida, à causa verò efficiente,
extraneo & præter naturam calore,
augeri porro immobilitate. *Com. 3. in*
3. Epid. aph. 1. Ergo remedia Chymica
quæ parum inferetinuere aqueæ hu-
miditatis, ægrè corruptibilia sunt.
Phlegma abiecit, corruptionis pri-
mus author: Aëreæ & terreæ portio-
nes remansere, extra corruptionis
aleam constitutæ. Quocirca succi
aquei diu conservandi coquantur, vel
Soli exponuntur; ad aqueam humidi-
tatem absumendam. Quod autem
coctione, vel insolatione effectum idat
Medicina, id destillatione Chymia,
qua commodè in vaporem elevatam
medicamenti portionem humidam
abstrahit. Quæ reliqua sunt, spiritus
& oleum, terreæque portio, sua spon-
tè perdurant: modò studiosè inclusa,
externi aëris tyrannidi non permit-
tantur. Vnde concludo neutiquam
corruptioni momentaneæ obnoxia
esse Chymica remedia.

Ad propositam de caritate queri-

quidam
Chymica
remedia,
non sint
quàm
oporteat
cariora.

moniam respondeo, tam pretiosa remedia liberaliter à Proceribus, ad quorum sanitatem tuendam atque restituendam elaborari solent, esse remuneranda. Sed nonnulla etiam parari posse vulgaribus minimè cariora, pro fortunæ tenuioris hominibus. Puræ rhabarbari essentiaæ artificio Chymico extractæ scrupulus vnus magis purgabit, quàm integræ radicis dragmæ duæ. At pretii non multò maioris erit extracti rhabarbari scrupulus vnus, quàm infusio dragmarum duarum eiusdem. Plustamen temporis atque laboris in remediis Chymicis apparandis impendi fateor. Sed æquus Chymicus dignum à diuitibus præmium exiget, vt minori pretio possit ea, vel etiam gratis, præstare pauperibus. Sic non Arithmetica, sed Geometrica proportionem, remediorum suorum mercedem accipiet, maiorem vel minorem, pro singulorum facultatibus, ac prorsus nullam ab inopibus. Nam Christiana lege adstricti sumus, ad id præstandum proximo, quod nobis ab illo præstari velimus. Sed amplè in regno celorum remu-

neratio promittitur iis qui pauperibus in hoc terrarum orbe benè fecerint. Quin & Medicorum Princeps Hippocrates hortatur ne nimia seueritate utamur, sed ad ægri facultates respiciamus, vetâtque ne inhumani simus erga egenos & peregrinos. Si enim (inquit) affueri erga extraneos homines amor, aderit & erga nostram artem amor. in *Præcept. n. 45.*

D. Strenuè profecto, Candidate, Chymicorum remedium utilitatem, securitatem, & innocentiam defendisti, eâque acriter ab Aduersariorum calumniis vindicasti, qui falso supernacanea, periculosa & incommoda esse promulgabant, argutiis inanibus fulti, quas solerter elusisti, ac penitus euertisti. Sed cum medicamenta Chymico more parata tanti sint ad morborum curationem sitò, tutò & iucundè moliendam momenti, dic ingenie an Syntheticus Pharmacopœorum apparatus, tibi videatur necessarius?

C. Maximè. Componendorum quippè medicamentorum magna fuit tam ad simplices, quàm ad compositos morbos necessitas, ut præclare Fernellius docet.

Compo-
sitionis
medica-
mentorū
necessi-
tas

D. Quid? Simplem morbum simplex plerumque medicamentum, quod paribus sit viribus, tollit. Cumque simplex aliquod existit, quod citra ullam corporis & virium offensionem morbum prorsus depellat, quia omnium præstantissimum: nulla compositio permistione quarenda, neque quod simplici effeceris, composito tentandum. Etenim compositio prius est simplex, & certius & exploratius.

C. Non abnuo: Sed quoniam non semper cuique morbo peculiare remedium licet opponere, ad simplices etiam affectus, multis de causis necessaria fuit medicamentorum permistio.

D. Cedo quas?

Prima
cõponen-
doru me-
dicamen-
torum
causa.

C. Prima, cum simplex medicamentum deest curando morbo prorsus oppositum. Eius enim penuria compositum usurpatur, cuius vires sint morbo pares. Ut cum calida intemperies affligit numeris duobus à mediocritate distans, si nullum in promptu medicamentum sit frigidum ordine secundo, duorum quæ primi & tertij sint ordinis pares portiones temperata, compositum efficient ordinis se-

cundi, & depellendo morbo accom-
datum. Eadem in detergentibus, at-
tenuantibus, atque cæteris permis-
cendis est ratio.

Altera componendi causa, ex sim-
plicis medicamenti vitio depromitur,
quod aut imbecillum est, aut mali-
gnum. Imbecillum seu ignaum ac
pigrum, acrioris permissione excita-
tur, ut rhabarbarum spica vel cinna-
momo, senna cremore tartari, agari-
cus & turpetum gingibere, aut sale
gemmeo. Quod malignum fuerit (si
qua eius utendi necessitas est) beni-
gnioris permissione obtunditur, ut
scammonij, atque aloës acrimonia,
cotoneo malo, rosis, mastiche, traga-
cantho: Venenata qualitas, dictamno,
scordio. Ellebori nigri peruersitas,
aniso, dauco, cumino: opi vis narco-
tica, ne quid officiat, castorio & croco
emendatur.

Tertia componendi causa ex affectæ
partis substantia, situ, præsentia, atque
sensu existit. Cum enim pars densa,
longeque à remedijs dissita fuerit, ut
ren & uterus, plerumque attenuantia
basi permiscantur, quæ eò penetrent;

plerúmque alia, quæ substantiæ familiaritate basin eò dirigant, vt medicamentis cephalicis betonica, pulmonicis hyssopus, cardiacis buglossum, hepaticis agrimonia, splenicis scolopendrium, hystericis artemisia. Pars quòque nobilis aut exquisiti sensus (si basis vehementior fuerit) aliud quiddam sibi tota substantia familiare misceri postulat, & quod se suúmque robur conferuet. Ea propter, quæ visceribus accommodantur medicamenta, corroborantibus fulciuntur.

4. At omnium maximè necessaria componendi causa, est affectuum varietas, permiscenda siquidem tot erunt simplicia, quot facultates expectantur. Si simplex quidem est morbus, sed quem vel sua interior causa, vt humoris lentor, vel symptomatis grauitas, vt doloris sequitia comitatur, necessaria est medicamenti compositio, quæ in singulos affectus referatur atque pertineat. At multò magis, si multi, iique dissimiles morbi, vt intemperies & obstructio in eandem partem concurrant, aut etiam si partibus ij di-

uersis infideant, vt iccoris calida intemperies, renum calculus, & vteri obstructio menses suppressens. In his igitur necesse est, medicamentum ex his componatur, quæ sigillatim vnumquemque affectum depellant. In saporis suauitatem amarum medicamentis mel vel saccharum, additur: nimium dulcibus, limonum succus, vel acetum. Ad odoris verò gratiam, cinnamomum, anisum, caryophyllus, nuxmoschata, necnon & moscus aut ambaram.

D. Qua methodo componenda sunt medicamenta?

C. Vt methodo fiat apta medicamentorum compositio, basis in primis constituenda est, id est medicamentum simplex in compositione præcipuum, & velut columnen cui cætera innitantur, profligando affectui accommodatissimum, cuiusque tum qualitas, tum quantitas designanda. Qualitas quidem ex affectus, qui præternaturam in corpore fuerit, speciem, magnitudo, ex illius magnitudine; & ex laborantis partis natura, atque conditione præscribatur. Vt cum ca-

Qua methodo fiat compositio medicamentorum.

lidus erit affectus, medicamentum pro basi frigidum eligetur; atque si ordine secundo calidus est, id à mediocritate in contrarium pari ordine recedet. Si pars quoque affecta profunda fuerit, aut longè diffusa, densa, obtusi sensus, atque ignobilis; hinc basis facultas augenda erit, ut vires omnino pares in ipsam affectus substantiam exerceat. Partis quoque dignitate aestimata, medicamentum quærendum quod ei consentaneum sit, eamque singulari quadam familiaritate juvet. Horum observatione basis designabitur affectui contraria, eique par viribus, & affecta parti consentanea. Atque in primis si simplex & solitarius morbus, sine causa interiore, sine symptomate proponetur curandus; simplex depromatur medicamentum, quod depellendo illi par sit viribus, & partem juvet. Si simplex nullum par morbo suppetat, ex multis vnum tale comparetur, quæ aut similium aut etiam contrariorum sint virium. Si basis quæ sit arte constituta, omniumque optima, fuerit nihilominus vel ignava nimis,

vel maligna ; aliorum permistione
juvetur , & reliqua attexantur , quæ
illius effectum promoveant. Cætero-
rum autem quæ basis effectum felici-
tant , tum quantitas , tum vis minor
sit. Eorum verò quæ melioris usus , vt
saporis , odorisque gratia induntur ,
multò quidem minùs vis elucere de-
bet , aut basi obistere. Iam verò si
morbus simplex quidem est , sed quem
interior quædam causa fouet , aut ali-
quod graue symptoma comitatur ,
vniuscuiusque profligandi consti-
tuenda quoque basis est , cuius etiam
quantitas , ex affectus magnitudine
designetur ; vt quò vehementior is
fuerit , validiorem quoque basim for-
tiatur. Si præterea morbi complures
in vnam eandemque partem concur-
rant , cùm omnibus vnum æquè possit
remedium opitulari , multò magis
compositum id esse oportet , ex varijs
basibus , atque ex ijs quæ illas vndique
perficiant constitutum. Si in varias
longeque distitas partes varij morbi
inciderunt , non æquè necessaria est
compositio , cùm sua cuique remedia
seorsum pura aptari possint. Hæc

componendorum medicamentorum
methoduſeſt, ex ipſa quoque metho-
do medendi deprompta, quæ morbo
depulſo, corpus in naturalem habi-
tum reſtituit.



EXAMEN PRACTICVM.

DISPVATIO I.

DE RECTA

CVRANDARVM

Febrium ratione.

DECANVS.



PERDOCTE *Candidate, Galenus cap. 6. lib. 9. Methodi Medēdi, praeclarè scriptum reliquit, Neminem vltius artis scientiam nancisci posse, nisi & methodum quandam habuerit per vniuersalia theoremata, & in particularibus exemplis se exercuerit. Licet igitur haëtenus ex solertibus tuis responsionibus, vniuersalem medendi methodum, Hippocratis & Galeni legibus consentaneam, te consequutum animaduertierim; adhuc tamen intelligere cupio,*

an aequè in singulorum morborum curatione versatus, eadem industria possis generalia medendi præcepta in specialibus exemplis exercere, adeoque theoriam in praxim traducere. Eo fine singulas febris species tibi curandas propono. Quæ ad propriam cuiusque febris ideam observanda, unde indicationes sumenda, quæ adhibenda remedia expromas velim, & quæ ratione grauioribus succurrendû symptomatibus, quæ curationem ad se conuertunt, posthabita febre à qua prodeunt.

CANDIDATUS.

Quod à me postulas (observande Præceptor) ita arduum, ut id pro dignitate nequeat, nisi à Medico in artis operibus iamdiu exercitato præstari, omnes tamen ætatis & industriæ meæ nervos in eo contendam, ut mandatis tuis satisfaciam.

Quid Febris.

D. In primis ex te quaero quid sis Febris?

C. Febris est calor præter naturam è corde in vniuersum corpus effusus, caloris nativi substantiam labefactans, omnesque functiones interpellans.

Febris definitio oppugnatur.

D. Contra hanc definitionem sic disputo:

Quadam sunt febres frigidae, ex Aui-cenna Fen. I. l. 4. de Febribus.

Ergo

Ergo febris omnis non est calor præter naturam.

C. Nego antecedens.

D. Probo antecedens:

Effectus est index sua causa:

Sed plurimæ febres corpus ita refrigerant, ut rigorem inducant, quales sunt tertianæ febres omnes:

Ergo febres quædam frigida.

C. Respondeo in inuasionem tertianarum febrium corpus quidem rigore corripitur, præ vehementiori cordis aliarumque partium internarum calore, sanguinem & spiritus à partibus externis ad se cucurbitulæ instar trahente; sed calorem febrilem per vniuersum corpus subinde diffundi.

Defenditur.

D. At vehementior est vigente, quam inuadente febre, calor discussus tamen tunc temporis in corpore rigor est.

Quomodo hinc te extricabis?

C. Dico in ipsa febris apprehensione, dum materia morbifica turgens adhuc angustiori spatio conclusa, impetum facit, ut sese latius explicet, atque in ampliorem locum erumpere contendens acriter incandescit, in parte qua continetur, multò inten-

T

fiolem esse feruorem, & idèd velut in subsidium spiritus & sanguinem aduocare ; vnde refrigerato corporis habitu, rigor contingit : vbi verò in vniuersum corpus quoquouersum effusa est, atque hinc orta putredo vndique dispersa ; feruorem in foco lōgè remissiolem esse : licet in cæteris partibus rigore liberatis vehementior febrilis calor sentiatur.

Obiectio.

D. Ergo febris nequaquam est calor in vniuersum corpus æquabiliter fusus ?

Responsio.

C. Respondeo: Febrem ab ijs quibus continetur partibus, nisi prohibeatur, ad alias prorsus se exporreturam, ac vniuersum corpus occupaturam.

Altera obiectio.

D. In febre Lipyria (inquit Galenus) simul extrema frigent ; interna vruntur. Ergo Lipyria febris est externis partibus frigida, ve internis calida. In febre item Epiala quauis pars corporis, eodem tempore, febrem & rigorem sentit. Ergo Epiala febris, quotidiana continua species, à pituita vitrea, acidave, or:us sui causam ducens, merito frigida nuncupabitur.

Responsio.

C. Licet manus, pedes, totiusque

corporis extima cutis, algeant in Lipyria; nullibi tamen frigida febris dici potest, cum acutissima febris existat, cuius causa sit ad magnitudinem phlegmones viscera obsidentis referenda, *authore Galeno*. Ardoris namque vehementia sanguinem, & qui in eo continentur spiritum atque calorem, ad se ex toto corpore attrahit; ideo summæ corporis partes exangues redduntur, atque frigida. Quamvis etiam frigoris calorisque sensus in Epiala febre eodem tempore, eademque parte contingat; improprie nihilominus frigida febris appellabitur, quod à portione vitreæ pituitæ incensa & putrente oriatur, frigus verò à reliqua eius parte non putrente, ne incensa, sed frigida manente. Si quidem non putris pituitæ pars per uniuersum corpus dispersa rigorem concitat: quæ verò putruit, febrem accendit. Epiala æquid febris quotidiana censetur, quæ rigorem habet perpetuò comitem.

D. Quomodo urgentioris huiusce argumenti vim propelles?

Vnumquodque retinet naturam principis Noua ob-
iectio.

piorum ex quibus constituitur: ut corpora ignea, calida & sicca sunt; quia ex igne calido & sicco constant: aquea verò frigida & humida; quia ex aqua frigida & humida gignuntur:

Sed febres plurimæ à frigidis humoribus, ut pituita & melancholia gignuntur, quales sunt febres quotidiana & quartana:

Ergo febres plurimæ sunt frigida.

C. Respondeo: Febrem, nec à pituita, nec à melancholia fieri, nisi putrescente; ac utrúmque humorem per se licet frigidum, putrendo tamen calorem acquirere.

Solutio.

Adeò ut nulla rectè possit frigida febris appellari, sed omnis in caloris genere subsistat, cum tota febris essentia, calor sit præter naturam. Vnde rigor, horrore intermittentium febrium, tametsi accessionis est initium, febris tamen haudquaquam censeri potest, quòd nondum calor sit incensus: neque per febrem exitialem partium extremarum frigus, è febris est essentia.

D. Quòdnam est febris subiectum?

Subie-
ctum fe-
bris
quod.

C. Febris subiectum est totum corpus, ac præsertim cor. Febris siqui-

dem est intemperies calida primum cordis, ac per consensum totius corporis; cum vitales imprimis, dein naturales, animalésque actiones lædat. Vt enim calor nativus omnes functiones perfectas edit, sic febris omnes functiones interpellat, quod vniuersalis morbus sit.

D. Contra sic argumentor:

Intemperies morbus est similis, non organicus:

Sed febris ex se, est intemperies, eaque calida:

Ergo febris morbus est similis, non proprius, non toti corpori communis?

Obiectio.

C. Febris similaribus quidem paribus per se insidet, sed organicis, quæ ex similaribus constant, communicatur; adeo ut morbus sit vniuersalis, cum à febre omnes corporis partes incalescant.

Solutio.

D. Explanata febris definitione, ad eius differentias veniendum. Quot sunt febrium differentia?

C. Multiplices sunt febrium differentia. Aliæ enim essentielles, aliæ accidentales: sed prima & maxime

438 *N. Ab. Frambesarij*
propria defumitur è subiecto circa
quod versatur febris.

Galenica
februm
diuifio,
ex subie-
cto de
fumpta.

E' triplici quippè subiecto, in quo
consistit calor præter naturam, tri-
plex febris à Galeno statuitur, Ephe-
mera in spiritibus, putrida in hu-
moribus, hæctica in solidis parti-
bus.

D. Contra sic disputo:

Obie-
ctio.

*Febris cum morbus sit actiones per se
ludens, in solidis tantum partibus que
actiones edunt consistere potest. Adde quod
morbus sit affectus corporis uiuentis: in
corpore autem nostro, neque spiritus,
neque humores uiuunt, sed partes solida
duntaxat vita fruuntur:*

*Ergo febris nec in spiritibus, nec in hu-
moribus collocanda est.*

Respon-
do.

*C. Respondeo: Partes solidas in
omni quidem febre necessariò cale-
ctas esse, sed in hæctica primùm & per
se, in Ephemera per contagionem
spirituum, in putrida per consensum
humorum. Adeò vt febris nomen
acceperit ab eo quod primùm incen-
sum est; vt accensis primùm spiriti-
bus, Ephemera dicitur; accensis pri-
mùm humoribus putrida; & accensis*

principiò solidis partibus Hæctica.
 [Si quidem in Ephemera, cordis spiritus iam incaluerunt, humores verò ac solidæ partes dumtaxat calent: In putrida humores incaluerunt, & permanentem fixumque obtinent calorem.] Triplicem istam substantiam Auicennas incalescenti comparat solidam lebeti, humidam aquæ lebete contentæ, spirituosam vaporibus ex aqua elato.

D. Etsi Galenica februm diuisio, ab earum subiecto sumpta, multis iam seculis increbuit, & à celeberrimis authoribus valde celebrata est; Ferneliana nihilominus ex caloris præternaturam differentis deprompta, multò videtur illustrior & perfectior, ut quæ omnes febrium species ambitu suo complectatur. Hanc igitur recense & persequere:

Ferneliana februm diuisio, ex caloris præternaturam differentis deprompta.

C. Tria febris, ut caloris præternaturam, prima summæque genera à Fernelio statuuntur, simplex, putrida, & pestilens. Simplex febris dicitur cuius calor elementarius solo incremento naturæ limites excessit: Putrida, cuius calor ex illuue putrida emerfit: & pestilens, quam venenata.

perniciosaque exspiratio intulit. Simplicis verò febris tres species, solo caloris subiecto distantes, Ephemera, Synochus & Hæctica: Putrida autem febris, ex putrescentis humoris specie atque ex situ, duplex constituitur, continua & intermittens. Continua iterum duplex, una primaria, (conclusa nuncupatur,) quam accendit putrescens humor in vasis maioribus: altera symptomatrica, quæ partis cuiuspiam putredinem quasi comes insequitur, siue ex visceris cuiusvis erysipelate fiat, quæ typhodes appellatur; siue ex phlegmone, quæ phlegmonodes: siue citra inflammationem à coërcito in visceribus humore putrescente oriatur, quæ nonnunquam acuta, sæpius lenta est. Continua primaria duplex: una sine remissione, Synochus putris dicta, ὁμοῦτος, ἐπακμαστικὴ, ἢ παρρημαστικὴ, à sanguine ex quatuor humorum æquabili permissione constituto, benèque temperato, in maioribus vasis in putrescente genita: altera statis periodis remittens, quæ ex vincentis humoris natura, triplex perhibetur:

Tertiana continua , sub qua causus continetur, ex sanguine bilioso: Quotidiana continua , ex sanguine pituitoso: & Quartana cōtinua, ex sanguine melancholico, in maioribus vasis putrescente.

Intermittens febris alia simplex, alia composita , alia confusa. Simplicis tres differentiae : Tertiana ex bile flaua extra venas maiores putrescente; Quotidiana ex pituita putri; Quartana ex atra bile pura ac seorsum putrescente. Composita febris , vt Tertiana duplex, Quartana triplex, & Hemitritæos, quæ ex quotidiana continua , & tertiana intermittente, constat. Confusa febris non ex humore syncero , verum ex pluribus vno extra maiores venas loco confusis, pariterque putrescentibus emergit , cuiusmodi est Tertiana notha, ex bile atque pituita pariter corruptis.

Pestilens febris non vno calore, sed maligna perniciæ aliàs spiritus, aliàs humores, aliàs pattium substantiam contaminat. Hinc differentiae exurgunt.

D. Erudite Candidate, cum ad agrum pristina sanitati restituendum vocaberis, quibus notis dignoscas an febricitet; & si febricitat, quo febris genere laboret?

Quibus
notis di-
gnosca-
tur fe-
bris.

C. Si pulsus celer ac frequens percipiat, calor intus ac foris molestus, sitis ingens adsit, virium languor & imbecillitas, cum spontanea corporis grauitate aut dissolutione, ægrotantem febricitare prædicabo.

Epheme-
ra.

Ac si repentè quidem præhendit febris sola euidentium causarum vi, sine rigore, horrore atque frigore, æqualisque est & ordinatus pulsus, calor tactu mitis & halituosus, vrina minimùm à naturali distat, nullaque sæua symptomata comitantur, laborantem Ephemera febre tentatum iudicabo.

Putrida.

Sed si pulsus inæqualis est & inordinatus, respiratio difficilis, calor acer & mordax, & qui tangentis sensum acriter feriat, vrina penitus cruda, ac neutra corporis constitutio præcessit, Putrida febre correptum esse affirmabo.

Hætica.

Sin autem calor primùm ac per se in propriam partium solidarum sub-

stantiam infigitur, à vehementibus
causis eidentibus, vt ab iracundia,
mœrore, ingenti æstu, improbo la-
bore, diuturniori inedia, aut immo-
dica venere ortus; exactoque triduo
aut quatrduo, cum Ephemera am-
plius dici nequeat, febris perleuerat
æqualis, citra insignem vel minutio-
nem, vel additionem, nisi horâ vnâ,
duabûsve ab ingesto cibo, Hectica
tum perhibebitur; quæ simul ac hu-
midum primigenium depopulatur,
clarius innotescit ex manifesta cor-
poris colliquatione, immodica ocu-
lorum cauitate, extrema temporum
macie, plumbeo faciei colore, cutis
ariditate ac duritie, ventris depres-
sione, pulsu duro, debili, paruo ac
frequenti, vrinisque pinguibus.

DE EPHEMERARVM

Februm curatione.

D. Quotuplex est Ephemera febris?

C. Duplex: vera, & spuria.

Quotuplex
Ephemera
febris.

*D. Quanam vera tibi videtur Ephe-
mera?*

*C. Quæ à causis procatarcticis
corpus per se excalfacientibus &
exiccantibus infertur, vt à solis æstu.*

Quæ vera
Epheme-
ra.

vehementi corporis aut animi motu, inedia, vel immodica venere. Hæc enim pura & legitima Diaria est, nec unquam diem naturalem prætergreditur.

D. *Quam Ephemera vera curationem adhibebis?*

Cur veræ
Ephemere
curationis
indicatio
simplex.

C. Cum pura Ephemera sit simplex febris, simplicem mihi proponam curationis indicationem, à morbi essentia petitam, alterationem nimirum, quæ completur refrigerantibus & humectantibus.

Quomodo
causa
externa
contrario
propel-
lenda.

Contrarium nihilominus causæ externæ, à qua fuerit orta, remedium adhibebo. Ut si à solis ardore profecta sit, iulepum præscribam violatum, aut rosatum, Alexandrinumve, cui succus limonum sit affusus, ad sitim compefcendam.

Quinetiam oxyrhodinum fronti & temporibus imponam, ad placandum capitis dolorem.

Si ab ira, præsidii refrigerantibus & humectantibus, bilis feruorem contemperabo.

Si ab immodica exercitatione, quietem imperabo.

Si à lassitudine, mollibus frictionibus artuum dolorem mulcebo.

Si à vigiliis immodicis, somnum hypnoticis conciliabo.

Si ab inedia, aut immodica venere, cibum decernam euechymum & eupeptum, vt hordei cremorem, iusculum carnis boni succi, refrigerantibus herbis alteratum, cum vitellis ouorum. Pro potu ptisanam, vel pomaecum, vel vinum album, tenue, benè dilutum, vt parum calfaciat, ac vrinas & sudores promoueat.

D. Quanam spuria censetur Ephemera?

C. Quæ à cruditate ex nimia alimentirepletionc, vel ab excernendorum retentione contrahitur, & ad plures dies nonnunquam extenditur, adeò vt grauis metus sit, ne in Synochum deq̃ generet:

Quæ spuria Ephemera.

D. Quam Ephemera spuria curationem institues?

C. Quoniam Ephemera notha gignitur à vitiosa materia, vel aliunde suggesta, vel ab excernendis in corpore retentis profecta, duplex mihi ante oculos obuersabitur curandi in-

Curatio Ephemeræ curandæ indicatio duplex.

dicatio, materiæ morbificæ euacuatio, & febris alteratio.

Itaque si Ephemera intra 24. horas sudore, madoréve non solvatur, imò auctior; ac calor pro miti acer euadat: ne in Putridam transeat, venæ sectione & purgatione causam eius antecedentem rescindam, calidamque & siccam intemperiem refrigerantibus & humectantibus alterabo.

Si à crapula & ebrietate procreata sit Ephemera, refrigerantem ac longè tenuissimam dietam institutam, atque vomitionem, aut alui deiectionem procurabo, tandem ventriculum sumptis & admotis roborabo.

Si ex retenta fuligine ob adstrictam cutem, balneo aquæ dulcis cutem reddam laxiorem, liberéque transpirabilem.

Si à suppressis hæmorrhœidibus, aut mensibus, illis ciendis prorsus incumbam.

DE HECTICARVM

Februm curatione.

D. Ab Ephemera protinus ad Hecticam progrediamur, quia inter utramque magna intercedit necessitudo.

Transitus
ab Ephe-
mera ad
Hecticā.

Dic mihi ingenuè, an Febris Heëtica tibi videatur curabilis?

C. Distinguo. Heëtica incipiens, Heëtica quæ curabilis. curabilis est: confirmata verò, quæ *μα-εγορῶ* ins dicitur, prorsus est incurabilis. Quæ in utriusque medio collocata est, difficillimè curatur. Cùm enim febris Heëtica primum gradum non excessit, haud difficulter curatur; quia alimentarius humor roris instar effusus, quem calor febrilis in solidis partibus accensus depopulatur, idoneo alimento resarciri potest.

Cùm verò secundum magnitudinis Quæ curatu difficilior. gradum iam attigit, aded ut calor increescens carnem absumat, quæ inania refercit spatia inter simularium partium fibras, non ita facilem curationem admittit nequaquam tamen incurabilis, quia carnosa substantia instaurari potest.

Sed cùm tertium magnitudinis gradum adepta, & iam ad marasum perducta, humidum radicale depascitur, penitus immedicabilis. Per hanc enim spiritus insitus, atque calor nativus qui in eo humore radicali residet, omnisque hinc prodiens facultas Quæ prorsus incurabilis.

magnam fecit virium iacturam. Hinc
 & corporis vires omnes marcescunt
 & languent, omnesque functiones
 intercidunt: Præterea cum febris He-
 ctica non est simplex, sed composita,
 ut quæ putridam febrem longè acutis-
 simam excipit, quia putredinem ha-
 bet coniunctam, exigua salutis spes
 affulget. Nam cum sit ex putrida fe-
 bre profecta, putredinis etiânnun-
 particeps est. Itaque vix ullus curatio-
 ni relinquitur locus, quia indicatio-
 nes inter se pugnant. Putrida enim fe-
 bris cui complicatur, euacuantia re-
 quirat, quæ in Hectica noxia sunt.
 Item si Hectica febris sit symptoma-
 tica, ut ea quæ pravam partis cuius-
 piam affectionem consequitur, velut
 vlcus pulmonum, empyema thoracis,
 phlegmonem iecoris, lienis, ventri-
 culi, renum, vel intestinorum, præsen-
 te morbo, cuius symptoma est, curari
 non potest. At quantò pars, à qua ori-
 tur Hectica, ignobilior est; tantò tar-
 diùs Hectica mortem infert; quantò
 verò nobilior, tantò citiùs iugulat.

*D. Quenam observationes sunt in cura
 februm Hecticarum animadvertendæ?*

C. In cura Hecticæ imprimis obseruandum, num primaria sit, vel symptomatrica, id est à praua viscerum affectione, vt symptoma, dependens. Si primaria, num simplex sit, aut complicata cum febre putrida. Si symptomatrica sit, dirigenda sunt remedia ad particularem morbum, à quo oritur.

Observationes
in cura
Hecticæ
febris
animad-
uertende.

Si sit complicata cum putrida febre, aperiendæ sunt obstructions, putredo emendanda, & putridus humor purgatione & venæ sectione vacuandus, non neglecta tamen febre Hectica, cui simul est occurrendum suis propriis remediis.

D. Quomodo simplicem Hecticam curabis?

C. Si Hectica simplex & solitaria sit, nullique alteri affectui copulata, vnicus erit curationis scopus, nempe alteratio. Partes enim solidæ præter modum exsiccatae & extenuatae, nec venæ sectione, nec purgatione amplius desiccari postulant, sed idonea victus ratione refici debent. Itaque ad Hecticam simplicem curandam, febris qualitatem alterabo. refrige-

Quamodo
rhodo
Hectica
febris cu-
randa.

rantibus & humectantibus tum intro sumptis, tum admotis, & extenuatum corpus alimentis euchymis instaurabo.

D. Quam igitur vi<rationem Helicafebre laborantibus instituendam censes, particulatim exprime?

Vi<
ratio He-
&icis in-
stitu<da.

C. A<r cubiculi sit modic< frigidus. Si fuerit calidus, arte refrigeretur, ne ex calida inspiratione cor magis accendatur. Somnus sit nec longior, quia viscerum calorem auget, dum externarum partium calor foris intro repit; nec breuior, quia corpus magis exsiccat. Minus tamen incommodi ex paulo longiore, quam ex plus iusto breuiore oritur; quod in hac febre summa sit viscerum & partium solidarum ariditas, quam humectat somnus. Vitetur omnis vehemens motus tum animi, tum corporis, ut qui calorem febrilem & siccitatem augeat. Exhilaretur ager quantum fieri poterit. Nutriatur alimentis refrigerantibus & humectantibus, & cito alentibus, ut iusculis comparatis ex decocto pulli, caponis, vituli, veruecis, &c. in quibus hordeum sine

cortice, lactuca, & portulaca coxe-
rint, ex vitellis ouorum, carne vituli,
porcelli, phasian, cuniculorum, le-
pusculorum, & similibus. Præferan-
tur elixa assis. Assa enim facilius in-
flammantur, & in bilem vertuntur,
elixa magis humectant. Si tamen æ-
ger assis delectetur ea minus coquen-
da sunt, ut minus exsiccent, & tem-
peranda succo limonum, citrii, aran-
tiorum. Commendantur etiam pis-
ces, quia refrigerant & humectant,
sed saxatiles, tenera carne præditi, qui
in mari aut aquis puris viuunt. Aues
item montanæ. Vitentur verò palu-
stres, omnia denique calida sicca, ut
allium, cæpe, item salsa & piperata,
& quæ glutinosum excrementitium-
que sanguinem generant. Inter fru-
ctus poma conceduntur, quia frigi-
dum sanguinem gignunt, dulcia gra-
tiora sunt, acida magis refrigerant.
Conueniunt pyra cocta, & passulæ.
Nocent ficus, quia prauum sangui-
nem gignunt, ut & amygdalæ, nuces,
& quæ facile inflammantur, ut buty-
rum & mel.

D. Sunt qui contendunt infirmam esse

Contro-
uersia
proponi-
tur.

Hecticis attracticem & coctricem facultatem, ratione siccitatis, quæ non modò partes inualidas reddit ad attrahendum & coquendum; sed & alimenti distributionem impedit: ob id Hecticis liquidiora alimenta præscribunt, quòd facilius concoquantur & distribuuntur. Nonnulli contra censent Hecticis ob infixum in solidis partibus calorem, attrahendi facultatem validam esse. Satis (inquiunt) calfacta corpora attrahunt, sed quod attraxerant, statim absumunt. Ob id præscribunt Hecticis alimenta solidiora & viscosa, ut extremas animalium partes, videlicet pedes vituli, veruecis, porci, carnes limacum, ranarum, cancrorum. Has enim carnes (inquiunt) cum sint viscosæ & humida facile agglutinantur partibus hectico calore obsessis, nec facile dissipantur ab ardore febrili. Præterea siccitatem solidarum partium diutius remorantur. Alij verò hac alimenta reijciunt, quia agrè concoquuntur, ac ventriculo negotium facessunt. Quomodo hanc litem dirimes?

Soluitur.

C. Hanc controuersiam ita soluo. In incipiente Hectica, dum adhuc robusta & facultas coctrix, conueniunt hæc solidiora alimenta viscida & hu-

mida: At in confirmata, quia partes naturales sunt imbecilliores, non sunt exhibenda, cum difficulter concoquantur. Sed quoniā vires sunt prorsus deiectæ, æger nutrirī debet gelatina, expressis carniū euechymarū, destillatis restauratiuis, sic dictis, quia vires fractas restaurant; necnon & clysteribus nutrientibus.

D. Destillati restauratiui formulam exhibe?

C. ℞. decocti capi cum herbis refrigerantibus alterati ℥b. i. micam panis vnius albi in lacte infusi ℥b. β. destillentur alembico vitreo in balneo marino. Destillati liquoris libræ vni adde sacchari albi ℥. iiij. cinnam. ℥. β. Colentur per manicam hypocraticam.

Destillati
restaura-
tiui for-
mula.

D. Clysteris nutrientis formulam prescribere?

C. ℞. decocti pulli, vel carnis vitulinæ, vel capitis veruecis quart. iiij. in quibus dissolue sacchari albi ℥. iiij. vitellos ouorum n. ij. fiat clyster inuiciendus horâ pastui dicatâ. Nec mannâ, nec cassiam addidi, ne viâ expultricem exstimularet. Parua

Clysteris
nutrien-
tis for-
mula.

item enematis quantitas à me præscripta; quia maior cōpressis intestinis vim expultricem prius stimularet, quàm ad iecur facta sit attractio.

D. *Quòdnam Hecticis alimentum tibi videtur longè conuenientissimum?*

Cur lac
Hecticis
alimentū
sit conue-
nientissi-
mum.

C. Cūm Hecticis alimentum concoctu facile, euchymum & multum nutriens conueniat, idque liquidum & tenue, vt meatus corporis ob siccitatem contractos faciliè subeat, & ob febrem nonnihil refrigeratis: lac autem his omnibus dotibus præditum sit, Hecticis certè inter omnia alimenta conuenientissimum est. Lac enim faciliè coquitur, laudabilis alimenti multum præbet, humectat & reficit, suoque sero nonnihil refrigerat.

Quòdnam lactis genus eligendum?

Quod la-
ctis ge-
nus eli-
gendum.

C. Cūm multa sint lactis genera, eligendum præ cæteris muliebre, quia naturæ nostræ magis cognatum est, & familiare, magisque nutrit, ac utilius erit si ex ipso vbere sugatur; & ita calens è mammillis in ventriculum descendat. At quia multi ab eo lacte abhorrent, in eius locum vacci-

no vtendum, vel asinino, aut caprillo. **Vaccinum**, quia crassissimum est, plenius nutrit; ideo si à butyro expurgetur, non erit inutile. Nam id à quo butyrum extractum non est, facile ratione butyri inflammatur. Præferatur tamen asinum, id enim cum sit tenuissimum & liquidissimum, utpotè casei & butyri minus particeps, non ita facile coagulatur in ventriculo; & ratione suæ tenuitatis, facile quoque versum distribuitur, seroque suo calorem febrilem temperat. Minus tamen nutrit quàm muliebri & vaccinum: Vt autem asinum lac plenius nutriat, asina in stabulo retinetur, aliturque hordeo excorticato & secali. Sic enim redditur crassius & minus ferosum, minusque aluum turbans: Caprillum tamen magis temperatum, ideo minus flatum gignit, minusque aluum soluit. Capra enim adstringentibus magna ex parte vescitur, ut arborum extremitatibus. Lac autem cuiuscumque animalis sit, debet esse optimum & laudabile.

D. Quibus notis optimum & laudabile lac internoscitur?

Notæ la-
ctis opti-
mi & lau-
dabilis.

C. Optimi & laudabilis lactis hæ notæ sunt: Crassities moderata, ita vt instillatum in vnguem nec tardius nec citius effluat, color albus, odor grat^o, sapor nec amarus, nec acidus, nec falsus, sed dulcis. Si animal à quo mulgetur floreat ætate. Iunioris enim animalis lac liquidius est, senioris siccius. Si sanum item sit animal, non morbosum.

D. Quomodo morbosum cognoscitur?

C. Morbosum dignoscitur ex pili raritate, ex tuberculis per cutem erumpentibus ex impetigine, scabie & cibi penuria.

Sunt qui lac nigri animalis præferant lacti albi.

D. Quæ in lactis usu cautiones adhibendæ?

C. Lac non debet exhiberi Hecticis, qui valdè febricitant.

Cautiones in lactis usu adhibendæ.

Lac enim ab igneo febris calore facile affatur & corrumpitur, adeoque febrem auget. His etiam Hecticis non debet præscribi, quibus hypochondria mutantur, & qui capite dolent. Vaporosum enim cum sit, caput facile replet; & his qui diarrhæa laborant. Quibus autem prodest, danda est

est opera, ut inducta in cubiculum asina, illud quam recentissimè mulctum, & calens adhuc, è mammillis hauriatur. Nam cum tenui substantia sit præditum, si in aëre, vel minimùm, moretur, facilè corrumpitur.

D. Quomodo corrumpitur?

C. Lac dupliciter corrumpitur, aliàs assatum, aliàs acescens.

Assatur ab adurente ventriculi calore. Acefcit verò & cogitur ab imbecillo eiusdem calore.

D. Quomodo assari in ventriculo percipies?

C. Ex ructu nidoroso, simili ei qui ex ovis frixis malè in ventriculo coctis erumpit; & ex pulsus mutatione, qui languidior, tardior, & rarior euadit.

D. Quomodo acescere & cogi cognosces?

C. Ex acido ructu, ex inflatione & distensione ventriculi, & torminibus intestinorum.

D. Quomodo utriusque vitio occurritur?

C. Si vritur in ventriculo, incoquenda aquæ portio cum lacte: sin cogatur & acescat, saccharum lacti admiscendum; non autem, mel aut

sal; licet vtrúmque lactis concretio-
nem impediat, ac celeriores lactis
in intestina descensum efficiat, quia
mel & sal Hecticis noxium est.

*D. Satis superque de lactis qualitate
differuisti: nunc de eius quantitate, bibe-
ndique modo & tempore, aliquid dicendum?*

Quantitas
lactis,
eiusque
bibendi
modus ac
tempus.

C. Primis diebus periculum fiat
mensuræ lactis conuenientis, datis
primùm eius vncijs quatuor, quas si
probè concoquat, sensim augeatur ea
quantitas ad 3. viij. & sic deinceps.
Vsq̃ue ad lb. j. Offerri autem debet
mane, & vacuo ventriculo, quem pu-
rum requirit, non solum ab omni ex-
cremento, sed etiam ab omni cibo.
Nam cibus mistum, facilè corrup-
p̃itur.

D. Sumpto lacte, quid agendum?

An lacte
hausto
dormien-
dum, vel
deambu-
landum.

C. Nonnulli super dormiendum
esse censent, quia sic magis humectat
& nutrit. Alij somnum obesse putant,
quòd eo superueniente lac in nidorem
facilè vertatur, & tardiùs digeratur,
caputque magis repleat. Itaque lacte
hausto leuiter deambulandum esse
contendunt, vt citiùs in intestina de-
scendat.

*Quam lætis bibendi rationem Hæcti-
cis utiliore sentias, breuiter complectere?*

C. Lac quod dabitur Hæcticis mul- Recta læ-
tis bi-
bendi ra-
tio sum-
matim
exprimi-
tur.
ceatur in cyathum, qui in alio vase
aqua calida pleno cõtineatur, ne lac
tepidum suum calorem deponat, & in
cyathi fundo, sacchari albi aut rosati
conueniens portio ponatur; deinde
lac linteo mundo transmittatur, & ad-
huc tepidum quàm ocysimè hauria-
tur, tanta quantitate, quantam co-
quere ventriculus potest; idque manè,
ieiuno stomacho, aluóque exonerata.
Æger post eius haustum decumbat
in lecto ad duas aut tres horas, neque
tamen dormiat. Postea se exerceat leui
deambulatione per cubiculum, nec
prandeat, donec lac probè coctum à
ventriculo secesserit.

*D. Hactenus interna recensuisti reme-
dia quæ sunt Hæcticis exhibenda, nunc quæ
sunt extrinsecus adhibenda persequere.*

C. Inter externa auxilia celebran-
tur balnea aquæ dulcis tepidæ, in qua
remollientia & refrigerantia fuerint
decocta. Tandiu in singulis manebit
æger, quandiu vires ferent.

A balneo exiens superiniecto toti

Balnea
hæcticis
cõueni-
tia.

corpori linteo in lecto collocandus. Dein molliter linteis calidiusculis detergendus est. Postea inungendus oleo violarum, amygdalarum dulcium, cum butyro insulso. Mox illi iusculum propinaudum, aut vitellus oui porrigendus; quo sumpto, si possit, somno indulgeat.

Quid à balneo molendum.

Admouentur etiam hepati & lumbis epithemata refrigerantia & humectantia.

D. Si febrem Hecticam alui fluor, aliave grauia symptomata comitentur, quid molendum erit?

Epithemata quæ & ubi adhibenda. Quomodo alui fluor hectice superueniens, sit compescendus.

C. Si febris Hectica alui fluorem habeat comitem, ille adstringendus erit usu syrupi cydoniorum, & rosarum siccarum, carnis cydoniorum saccharo conditæ, oryzæ in lacte coctæ, & lactis præbulliti, in quo ferum candens fuerit extinctum. Si alia molesta occurrant symptomata, accommodatis remedijs erunt profliganda.

DE SYNOCHON CVRATIONE.

D. Hactenus de febribus, quæ spiritibus ac solidis partibus insident: ad eas nunc transeundum, quæ in humoribus accen-

duntur, inter quas prima occurrit Synochus. Quotuplex est Synochus?

C. Duplex: una simplex, altera putrida. Quotuplex Synochus.

D. Quid Synochi simplicis nomine intelligitur?

C. Febris, quæ fit à sanguine duntaxat efferuescente, & in maioribus venis ebulliente, nullam adhuc putredinem adepto. Vnde imputris nuncupata est. Quid Synochus simplex.

D. Quid Synochus putrida?

C. Febris à sanguine in maioribus vasibus non modò incalescente, verum etiam putrescente, contracta. Quid Synochus putrida.

D. Quibus signis dignoscitur ab imputris?

C. Morbi magnitudine & symptomatum vehementia, urinis crassis, turbis ac turbidis, atque caloris acrimoniâ. Synochus quippe putris causam habet eandem, quam imputris, sed validiorem; quæ non solum sanguinem excalfacit, sed præterea corrumpit. Quibus signis Synochus putris ab imputris dignoscitur.

D. Vnde utraq; gignitur?

C. Ab obstructione meatuum, præ sanguinis plenitudine, cuius causis & A qua causa utraq; excitetur.

notis manifestè se prodit.

D. Quinam Syncho maximè obnoxij?

Qui Syncho
obnoxii.

C. Qui bene temperati naturà sunt, sed intemperanter viuunt, geniòque indulgent.

D. Quotuplex in Synochi curatione proponitur scopus?

Quotu-
plex cu-
rationis
scopus.

C. Duplex: primus in plethora, febris causa demenda consistit: alter in calore febrili alterando.

D. Quenam ad utrùque pertingendum adhibenda sunt remedia?

Maxima
Synochi
remedia.
Cur in
Syncho
mittendus
sanguis.

C. Duo præstantissima traduntur à Galeno: sanguinis missio, & aquæ liberalior potio. Necessaria quippè venæ sectio ad febris causam tollendam, internum incendium extinguendum, sanguinem ebullientem à putredine vindicandum, & inuadentem putredinem arcendam.

D. Quantum sanguinis mittendum esse censet?

Qua quã-
titate.

C. Galenus ad animi deliquium vsque, sanguinem euacuari iubet: si vires ferant, & ætas permittat.

Quomo-
do.

D. Nos tamen ad animi deliquium vsque, sanguinem nequaquam mittimus af-

fatim, sed quantum satis visum fuerit, tantum principio detrahimus: quod defuit, interiectis sex, aut octo, aut duodecim horis, iteratione supplemus; quia ex Hippocrate, Aph. 51. lib. 2. τὸ ἰσὶ πλεὺ καὶ ἑξαπίνης πένυν, σφαλερὸν τὸ δὲ καὶ ὀλίγον, ἀσφαλές: plurimum atque repente euacuare, periculosum: sed quod paulatim fit, tutum est.

Adde quod euacuatio ratione superflui tantum fiat, (ut ait Auerrhois;) adeo ut superfluus duntaxat sanguis euacuari debeat. At in euacuatione ad animi deliquium usque, naturalis sanguis detrahatur. Satius autem est, ut caloris præternaturæ aliqua portio relinquatur, quàm caloris nativi iacturam facere. Quando mittendus sanguis est?

C. Statim, quacumque hora fuerit accersitus Medicus, etiam noctu; quia Et quando. metus est ne sanguinis copia ægrum suffocet, aut in partem aliquam principem irruens, phlegmonem in ea excitet, aut putredinem accersat. Sed, cum optio datur, matutinum tempus opportunius est.

D. Pergamus ad alterum remedium à Galeno præscriptum.

Cur liberalem frigidæ potionem tantoperè commendat?

Cur aqua
in Syno-
cho libe-
raliter
exhiben-
da.

C. Quia largo frigidæ potu calor igneus extinguitur, ac solidæ partes adeò roborantur, ut inutiles humores, per aluum, vel per urinas, aut per sudores protinùs excernant.

Obie-
ctio.

D. At Hippocrates 3. de victus ratione, frigidam tardè meare perhibet; ideoque nec aluum, nec sudorem mouere, sed potiùs adstringere.

Respon-
sio.

C. Respondeo: Eam non nisi per accidens vacuare, solidis scilicet partibus roboratis. Partes enim solidæ humectatæ & refrigeratæ vaporem emittunt, è quo fit sudor. Sic quotidie videmus post liberalem aquæ haustum, sudorem è toto corpore erumpere, & aluum fluere.

D. Quando frigida potio in Synocho exhibenda?

Quando
frigida
potio in
Synocho
ex usu sit.

C. Exhibenda frigida est, si Galeno credimus, cum declinat Synochus, manifestis signis in urinis & pulsu apparentibus, quod non ante quartum morbi diem contingit. Eius quippè usum priùs non concedit; ne humorem, qui febrem facit, refrigeret, in-

erasset, & coctu difficiliorem reddat.

D. At nos experientia edocti, coctionis signa non expectamus; quia interea ager periclitatur, & serius futurum sit auxilium: sed primis diebus largum eius usum ijs concedimus, quibus nec tumor, nec obstructio insignis, aliave prava diathesis in visceribus subest. Quanam in eius exhibitione cautiones observanda?

C. Nō dāda iis qui crassis humorib⁹ abūdāt, & viscera iādiu habēt obstructa, aut phlegmone obseſſa: Nec ijs quibus princeps aliqua pars præ peculiari quodam vitio infirma est: nec ijs qui exiguum sanguinem carnēque obtinent: nec ijs qui ab eius potu ladi consueuerunt. Protinus autē æger, vbi hausit aquam, operiatur multis stragulis, vt sudorem recipiendum cogatur; aut statim ab eius haustu, digito in fauces altè immisso, ad vomitum se prouocet. Cohibita enim tanta frigida quantitas summo periculo natium calorem cum febrili pariter extingueret, aut saltem hepatis functionem impediret, spirandi & deglutiendi difficultatem, tumorem, conuulsionem,

Cautio-
nes in fri-
gidę po-
tu adhi-
bendę.

& alia id genus symptomata inferret, quin & meatus obstruens, & morbi materiam impingens, morbum diuturniorem faceret.

D. *solane φλεβοτομία, & ψυχροπεία, Synochus tibi curanda videtur?*

Alia Synochi remedia.

C. Alijs etiam remedijs feruorem sanguinis temperantibus oppugnari debet, vt iulepis & apozematis refrigerantibus & humectantibus; epithematis ex rosarum, plantaginis, cichorij, & solani aquis, aceto rosato, ac puluere elect. trion-santalon, & camphoræ paratis, hepatis regioni adhibitis, atque frontalibus fronti & temporibus admotis, quæ tamen diebus criticis, vt 4. 7. 11. & 14. tollenda, ne hæmorrhagiam è naribus, quæ febrem soluere consuevit, impediunt. Emulsio etiam Syncho apprimè utilis.

D. *Emulsionis paradigma exhibe?*

Emulsionis formula.

C. ℞. 4. seminum frig. maior. recentium & mundatorum an. 3. ij. sem. lactucæ & papau. albian. 3. j. amygdalar. dulc. expurgat. in aqua rosarum maceratarum 3. ij. tundantur omnia pistillo ligneo in mortario.

marmoreo, affusa sensim lb. j. aquæ decocti hordei, fiat emulsio quæ dulcorabitur syrupi violati ℥. iiij. Idonea insuper viuendi lex accuratè obseruanda.

D. Quanam Syncho laboranti victus ratio instituenda?

C. Victus refrigerans, humectans, atque tenuis conuenit; quia magna sanguinis copia febrem excitat. Interdicendus ergo vsus vini, carnis, ouorum, & cæterorum alimentorum calidorum. Utatur æger iusculis ex herbis refrigerantibus, omphacio & butyro paratis, prunis acidis coctis, pomis coctis, hordeo mundato. Gelatina nihilominus exhibeatur, si adsit vitium imbecillitas. Potus sit aqua simplex cocta, vel cruda, in quam panis mica fuerit immersa, eademque crebrâ transfusione ab vno vase, in aliud vas attenuata, vel ptisana, vel pomaceû. In siti iulepus rosatus Alexandr. erit ex vsu, vel oxyfaccharum, ex aquæ præbullitæ lb. iiii. sacchari lb. j. aceti ℥. iiij. Minus tamen aceti ponatur, si eger sit gracilis & attenuatus; & quod maior est calor, eo

Victus
ratio Syn-
cho la-
boranti
conue-
niens.

minus sacchari adiiciendum est, ne in bilem vertatur. Si astrictior sit aluus, iniiciatur enema emolliens, refrigerans, & humectans: vel detur bolus à cassia, vel infusio rhabarbari & foliorum Oriental. in decocto radicum cichorij, oxalidis, oxylapathi, foliorum lactucæ, portulac. capil. Ven. seminum frig. maior. prunorum, tamarindorum & hordei.

D. Quomodo Synochus indicatur?

Quomodo terminetur Synochus putris.

C. Synochus simplex magna ex parte solo sanguinis fluxu per nares, interdum per venas hæmorrhoidales factò, tutò terminatur; idque intra 3. 4. 5. 6. & 7. diem, nisi mutetur in Synochum putrem. Tuta enim & commoda crisis ea est, quæ morbi materiam detrahit. Materialis autem Synochi causa est sanguis. Ergo solum sanguinis profluvium hanc febrem perfectè indicat. At Synochus putris non modò sanguinis fluxu, sed & copiosa sudorù profusione, & bilioso alui profluvio, vt aliæ febres putridæ, indicatur. Itaque diebus contemplatoriis & decretoriis naturæ conatus accuratè observandus.

Putris.

D. Quid à crisi molendum?

C. Si sanguis copiosè profluat è naribus, aut vberimus sudor erumpat, aut alui profluuium succedat, ægerque postea benè se habeat, signum est crisin fuisse perfectam, tuncque nihil moliri debemus, lege Hippocratis 20. lib. 2. Aphorif. Quæ iudicantur & iudicata sunt integrè, nec mouere, nec aliud quidquàm nouare, siue pharmacis, siue alijs crethismis, sed sinere, oportet. Tantùm victu euchymo, & quiete vires collapsæ reparandæ. Quòd si crisis fuerit imperfecta, & aliqua sit recidiuæ suspicio, præscribenda erit purgatio humori peccanti accommodata; quia quæ relinquuntur in morbis post crisin imperfectam, recidiuas facere consueverunt, vt habetur Aph. 12. l. 1.

Quid post
crisin
molien-
dum.

D. Nōne Synochus quandoque tibi visa maculis purpureis aut alio colore præditis stipata?

C. Persæpè. Verùm illa nequaquam simplex, sed venenati aëris & malignitatis particeps est.

Synochus
purpureis
maculis
comitata.

D. Quibus auxilijs huic venenata lues obsteres?

Quibus
præfidiis
oppugnā-
da.

Cardia-
corum
formulæ.

C. Cardiacis remedijs tum intro-
sumptis, tum extrâ admotis.

D. Cardiacorum formulas exhibe?

C. ℞. aquarum cardui benedicti,
scabiosæ, vlnariæ, pimpinellæ, ana ℥.
iij. aquæ theriacalis ℥. iiij. succi ci-
triorum q. s. fiat iulepus quo sæpius
æger vtatur.

Aqua item theriacalis per se, vel
cum syrupo violato, vel de limonibus
exhibeatur.

Aquam verò theriacalem sic com-
ponerem:

℞. oxalid. M. ij. bugloss. borrag.
pimpinell. ana. M. j. rasuræ cornu
cerui ℥. j. fiat decoctio cum carne
capi ad ℔. j. deinde pone in alembico
vitreo, addendo theriac. ℥. iiij. mi-
thridat. ℥. j. β. conseru. buglos. bor-
rag. vetonic. ana ℥. iiij. aquar. scabio-
sæ, morsus cardui benedict. an. ℥. iiij.
fiat destillatio lento igne.

Extrinsècùs verò, cordis & hepatis
regioni, carpisque manuum ac fronti,
opiata ex conseruis rosar. violar.
ocellorum, theriaca, mitridatio, & si-
milibus, concinnata, super linteum ex-
tensa admoueatur.

D. Quid macula purpurea portendunt?

C. Cum die critico, coctionis signis concurrentibus, apparent rubicundæ maculæ, nec intrò remeantes citò disparent, sed persistunt, res ægri benè se habet, si cardiacis natura corroboretur, sudórque postea erumpat.

*Maculæ
boni
ominis.*

At si ante coctionis signa, die non critico maculæ se produnt, liuidæ, aut violacæ, aut subitò disparent, intròque recurrunt, perniciem minantur.

*Maculæ
mali
ominis.*

DE CONTINUA FEBRIS

Februm curatione.

D. Quomodo continua febris, quæ Græcis dicta, à continente, quam οὐλοχὴ vocant, discernitur?

C. Licet utrâque à sanguine in maioribus vasis accenso ducat originem, continua tamen plurimum à synocho discrepat; quòd in hac nulla statis periodis manifesta percipiatur ex-candescencia, nullâque feruoris remissio, donec omninò solvatur: illa verò periodicam habeat exacerbationem atque remissionem, vel singulis diebus, vel tertio, quartove die, aut inordinatè moueatur. Hinc continua quotidiana, vel tertiana, vel quarta-

*Quo dif-
ferat con-
tinua fe-
bris à synocho.*

D. Quinam sunt febris continua obnoxij?

C. Ut Synochus non nisi in natura temperata, quæ multo sanguine eoque mediocri abundat, & quæ carnosæ est habitu, gigni solet; ita & putrida continua, iis duntaxat obtingit, qui ab hac mediocritate desciscunt; nimirum biliosis, vel melancholicis, aut pituitosis.

Qui febris continua obnoxii.

*D. Sub qua febris specie, Ardens, Gra-
vis æquos dicta, comprehenditur?*

C. Etsi Causus perinde ac Synochus sine remissione assidue fatiget, sub continua tamen biliosa continetur: quod nunquam temperatis naturis; sed biliosis, iuuenibus, æstate, tertianæ instar, accidat. Verum deïrente calore, siti inextinguibili, aliisque sævioribus, quàm tertiana, symptomatis, est comitata; quia magnis vasibus cordi vicinioribus insidet: adeò ut putris humor accensus, aut vapor ex eo suscitatus, ipsum indefinenter attingat.

Sub qua febris specie Causus continetur.

D. Quotplex in putridarum continuarum curatione proponitur scopus?

C. Triplex: primus, ut putrescens in maioribus vasibus humor continuæ fe-

Quot curationis scopi.

bris author vacuetur: secundus, ut calor febrilis alteretur: tertius, ut grauiora febris symptomata mitigentur.

D. Quanam remedia sunt ad hos curationis scopos assequendos adhibenda?

Quibus
remediis
ad cura-
tionis
scopos
peruenia-
tur.

C. Phlebotomia tum ad humoris putrescentis vacuationem, tum ad febrilis ardoris refrigerationem, tum ad symptomatum mitigationem administranda; Purgatio ad cacochymiam educendam porrigenda. Vitus ratio refrigerans & humectans, ad calidam & siccam intemperiem corrigendam instituenda. Zulepia & apozemata calorem febrilem contemperantia, corpusque alterantia, praescribenda.

Epithemata refrigerando & roborando hepati admouenda.

Sauiora insuper symptomata peculiaribus auxiliis demulcenda.

D. Quando phlebotomia tibi videtur administranda?

Quo mor-
bi tem-
pore se-
canda ve-
rit.

C. Animaduerto hodie plerisque Medicos in omnibus morbi temporibus licenter phlebotomiam celebrare; an κτ' λόγον, faciant, tuum sit iudicium, Praeceptor obseruande, quia

40. annis Medicinam cum Proceribus nostri sæculi magna cum laude fecisti.

D. Hippocrates morbi quidem principio venam secare iubet : in vigore vero prohibet, hac aphoristica lige :

Ἀρχαίων ἔνιστον, ἢ τι δοκῇ κινεῖν, κίρει ἀκμαζουσὶν δὲ, ἰσχυρὴν ἔχειν, βέλτιόν ἐστι.

Si quidem in curandis febribus putridis administranda initio phlebotomia, ad plethoram remouendam, qua obstructionis, ac proinde putredinis, causa est. Cum enim id quod indicatur adest, tum datur occasio adhibendi id quod indicatur. At sanguinis plenitudo, qua morbi initio adest, sanguinis vacuationem indicat. Contraria quippe in curandi ratione contrariorum sunt indicantia. Contraria autem est sanguinis vacuationi, sanguinis plenitudo. Ergo morbi principio, sanguinis detractio conuenit, dum vires adhuc constant : sed non aliis morbi temporibus, in quibus nec plethora amplius adest, qua sola phlebotomiam indicabat, nec vires amplius ferunt.

Cur in principio administranda phlebotomia.

Vbi quippè iam progressa febris est, & incrementum coepit, maximè si ad statum peruenit, detractio sanguinis ab initio facta, tum victu tenui, tum vi caloris fe-

Non in vigore febris continetur.

brilis, non parum est imminuta, imò sublata omninò, illa sanguinis copia. Præterea plurimùm fracta sunt vires, morbi magnitudine, symptomatumque sæuitia: quia calor febrilis nativum calorem dissipat, spiritus exolvit, facultates corpus nostrum gubernantes labefactat, ideoque vires prostermit. Itaque eo tempore sanguinis missio maximè officit. Galenus insuper in vigore morbi naturam, quæ in humoris morbisifici concoctionem prorsus incumbit, nullis remedijs ab instituto auocandam esse perhibet, ne crisis impediatur. Longè igitur ab orthodoxa Hippocratis atque Galeni doctrina desciscunt Neoterici Medici, qui circa statum, vel quod gravissimum est, in ipso etiam statu sanguinem detrahunt; & cum augeri febrem animadvertunt, subinde phlebotomiam repetunt. Propterea minimè mirum, si apud eos rara sint morborum crises, aut nulla. Nihil enim ipsi natura permittunt, eisque vires frequenti ac intempestiva phlebotomia adèò imminuunt, ut nec coctionem moliri, nec sese aduersus nocentem materiam erigere queat. Celsus Græcorum Archiatrôn subscribens sententiæ, Si febris (inquit) vehemens urget, in ipso impetu

sanguinem mittere, iugulare est. At nullo tempore magis urget febris, maiorve est eius impetus, quam in ipso statu, & circa statum. Ut enim in principio & fine leuiores, sic in statu & circa statum grauiora sunt omnia symptomata, vel ipso Hippocratis testimonio.

Verum antequam ad vigorem progrediatur febris, si prior sanguinismissio, vasorum plenitudini non satisfecerit, iterabitur à basilica sinistra; si prius dextra secta est, habita criticorum dierum ratione. Sanguis enim bis, serue in plethoricis ad continuam febris curationem tuè mittetur? Sed quo die, & qua hora euacuatio molienda sit, aperi?

C. Tempus sanguinis missioni atque purgationi opportuniùs illud est, in quo æger se meliùs habet. Itaque dies eligendus ab exacerbatione liber. Hora verò matutina conuenientior est, vbi à meridie febris excandescit.

D. Ex te scire cupio utrum vena sectio purgationi, an purgatio vena sectioni sit premittenda?

C. Venæ sectio purgationem præcedere debet, quia ἡμωμονία continuae febris remedium est: nisi cacochymia

Quoties
vena se-
cari po-
terit.

Quo die
& qua
hora eua-
cuatio
molienda.

An san-
guinis
missio
purgatio-
ni, vel
purgatio
sanguinis
missioni
præmit-
tenda.

in prima corporis regione turgèat, quæ purgationem indicat venę sectioni præponendam, ne in venas maiores transferatur.

D. Quenam purgatio continua febre laboranti decernenda?

Quæ purgatio decernenda in principio:

C. Purgatio morbi initio præscribatur blanda, cuius vis primam regionem non trāscendat, qualis comparabitur è cassia, rheo, & foliis Orientalibus; nisi experientia didicerit Medicus, ægrotantis alium adeò solutu difficilem, vt non nisi valentiori pharmaco subducatur. In declinatione autem febris, morbifico humore cōcocto, validioribus cathartici ad reliquias demendas vti licebit.

In declinatione.

D. Quare in principio continuarum febrium benigniora cathartica validioribus præferuntur.

Cur morbi initio clementiora cathartica ex usu sūt.

C. Quia non enitendum primis diebus continentem febris causam radicitus tollere per cathartica, sed tantum antecedentem, quæ è prima corporis regione in venas maiores effertur, & obstructions venarum mesaraicarum, per quas postea concoctum humorem natura expurget, solvere.

D. *Cur morbi initio valentioribus catharticis uti non licet, ad impuritatem venarum maiorum exhaustendum?*

C. Quia vehementia cathartica morbi initio, præterquam quod de crudo adhuc humore sanguini misto minimum magnis ferè torminibus detrahunt; omnes humores exagitant & confundunt, iisque maiorem putredinem inducunt, calorem febrilem augent, naturæ coquentis coctionem, adeoque crisin interturbant, virésque atterunt. At ubi coctionis signa in urinis apparebunt, nihil tunc metuendum est. Si quidem legislator noster ut *ἀμὰ* prohibet; sic *νίπνοια* iubet insigniter *φάρμακένον*.

D. *Adhuc remedia quibus continua febris oppugnatur generatim proposita sunt: nunc qua methodo singula singulis morbi diebus speciatim administranda sint, distinctius exprime?*

C. Continua febris acuta est, vel peracuta. Si peracuta febris est, adeò ut intra septimum diem iudicari posse videatur, acceleranda remedia sunt. Quamobrem primo morbi die si plenitudo vasorum & symptoma,

Cur vehementiora initio non ceant.

Quomodo peracuta febris curanda sit.

tum scuitia postulet, vena secanda, iniecto prius clystere emolliente, refrigerante, & leniter detergente, ad sordida alui excrementa educenda, ne fœda illuuias inde in locum vacuandi sanguinis raptim traiciatur. Postridie purgatio imperanda, sed blanda, quæ duntaxat è prima corporis regione vitiosos humores eliciat. Tertio, si opus sit, venæ sectio repetenda. Quarto verò, qui criticus est, ab vtrâque euacuatione super sedendum; ne si crisis eo die futura esset, naturæ motus interturbetur: clysteribus tamen aluus mollienda, & iulepis apozematîsve apparandus, concoquendus & refrigerandus humor, vt quinto repetitæ vacuationi locus sit. Sexto enim die, qui in morbis tyrannidem exercet, & septimo qui peracutarum febrium iudicatorius est, melius est alterationi solum & concoctioni incumbere, aluo quotidie emollita. His criticis diebus, si grauia vrgeant symptomata, nihil ea demulcere prohibet, vt ingentem æstum, epithematis cordi & iecori adhibitis, oxÿrrhodino lumbis illito; nauscam

nauseam inanem cardiacis intrò sumptis, & topicis roborantibus ventriculo admotis; dolorem capitis, vt & vigilias, frontalibus fronti applicatis: cauendo tamen ne soporem aut destillationem proritent; delirium pullis gallinaceis, aut felibus calentibus, aut vernecis pulmonibus recens extractis capiti raso adhibitis; sitim gargarismatis acidulis & refrigerantibus, ptisana & similibus. Si crisis die septimo febrem iudicauerit aut sudore, aut hæmorrhagia, non alui profluuiò, nisi reliquus humor intrò remanens artificiosa purgatione dematur, recidua in propinquo est; ideòque octauo die medicamentum paulò quàm per initia validius, quia tunc humor magis concoctus est, tutò porrigitur; vt crassior humoris pars, quæ in præcordiis fortè propter obstructas vias subsistit, educatur.

Iam verò si acuta febris est, quæ ad diè decimum quartum, aut 17. aut 20. protrahi posse videatur, haud ita acceleranda remedia sunt, ne vis naturæ inferatur. Initio quidem vtrâque vacuatione opus est, eaque repe-

Quomodo acuta febris curanda.

tita. Sed primo diē satis est aluum clystere subducere. Postridie bolum dare expedit ex cassia recenter extracta, vel expressionem rhei, & foliorum Orientalium in decocto refrigerante & aperiente. Expurgatis primis viis, venæ sectioni, quæ proprium est continuarum febrium remedium, quia causa earum in venis maioribus continetur, tertio die locus est. Sanguinis autem detrahendi quātitatem, virium robur, magnitudo morbi, & sanguinis qualitas, præfinient. Sequentibus diebus, accuratè animadvertendum num repetenda sit venæ sectio, vel purgatio; an cunctandum, dum natura se per crīsim exoneret. Quod sic intelligetur: si sanguis primò detractus valdè putris fuerit, eiusque in venis magna copia superesse videatur, repetita venæ sectio magis conferet; sin cacochymia præpolleat, blanda purgatio tutiùs repetitur. Verum, cum plethoræ, quæ in venis erat, per sanguinis missionem erit satisfactum; & cacochymia, quæ primam corporis regionem obsidebat, per purgationem, reliquo tempore ad cri-

sim vsque, in virium custodiam, interni incendii refrigerium, humoris morbifici concoctionem, & viarum apertionem incumbendum, quod victu euchyino, iulepis, & apozematis præfatis, præstabitur. Et si malignitas subest, quæ dignoscitur ex nausea, inquiete maxima, frequentibus animi deliquiis, pulsu minimo & intermittente, & summa virium imbecillitate, his cardiaca erunt adiungenda: & inter 7. & 14. diem, si coctionis signa in vrinis appareant, medicamentum purgans repetendum; & nisi febris 14. die soluta est, rursus inter 14. & 17. diem, aliud exhibendum. Hac arte minuta morbi materia, minor fiet perturbatio in die critico. Si vigesimo die, febris disparuit manifesta euacuatione antegressa; ad tollendas reliquias, impediendamque reuersionem, purgatio iterum molienda.

At si restincto feruore, leuatisque symptomatis perseverat, fiatque continua, quam vocant ex decidentia; paulò validioribus catharticis humor contumax trahendus, & præparatione maiore attenuandus & con-

quibus
medica-
mentis
continua
febris ex
deciden-
tia, sit eu-
randa.

coquendus est, Interim si in hypochondriis sit tēſio, aut durities sine inflammationis suspicione, commodè illi nuntur olea roborantia, attenuantia, & flatus discutientia, qualia sunt olea rosarum, absynthii, capparum, amygdalarum amararum, rutaceum, & à fotu admouebuntur sacculi comparati ex radicibus, herbis, seminibus, aperientibus, incidentibus & attenuantibus. Hic remediorum vicissim repetitorum continuatus vsus febrem continuam extirpat.

D. Victus qualitatem omnibus febricitantibus communem supra comprehensam minutius explica, eiusque quātitatem imprimis peracutè, mox acutè febricitanti conuenientem, persequere.

Qualis victus continua febre laboranti sit instituendus.

C. Victus sit refrigerans & humectans. Iuscula carniū boni succi herbis refrigerantibus alterata conceduntur, & iura feruore consumpta, gelatina, liquidior carnis aqua vaporario elicitā, expressus carnis assæ succus, sed citrij, aurantiæve succo, aut omphacio admixtus, oua item tremula. Potus sit ptisana, pomaceum, aqua feruefacta, sacchari momento con-

spersa. Si summus adsit ardor & ingens sitis, metusque ne æger nimis exarescat, danda frigida, qua nihil ad extinguendum calorem validius, cuius quantitas ex tempore, regione, ætate & consuetudine, metienda est.

Si febris peracutissima ultra quartum diem non producat, statim dum incipit vigorem attingens, exquisita diæta Hippocratis præcepto instituenda est. Recentiores nihilominus, ne vires inedia conuellantur, quotidie acutissimè febricitantes alunt, sed tenuissimè.

At si peracuta febris sit, ad septimū diem usque excurrans, cibo non tam exquisitè tenui sustinendæ vires, ut facile & venæ sectionem & purgationem ferre possint.

Si verò sit acuta, quæ in diem 14. produci posse videatur, initio paulo pleniori victu vires conseruandæ, ne ante vigorem deficient; ut & morbum coquere, & euacuationes spontaneas atque artificiosas ferre queant. Sed sensim minuendus cibus, dum febris suum vigorem attingat, in quo tenuissimus dandus; ne natura à morbi co-

Quis vi-
sus per-
acutè fe-
bricitanti
cōueniat.

Quis acu-
tè febric-
itanti;

ctione, ad cibi coctionem reuocetur.

D. Quando nutriendus ager?

Nutrien-
di tem-
pus.

C. Hora nutriendi conuenientissima est, in qua ager se melius habet: nempe cum remittit febris. Vbi verò exacerbatur; à cibo abstinendum, nisi fortè aut ætas, aut virium imbecillitas prohibeat.

D E F E B R I V M

Symptomaticarum curatione.

D. Quo discrimine Symptomatica febris à primaria discluditur?

Quo dis-
crepat
sympro-
matica
febris à
continua
primaria.

C. Et si utrâque febris continua est, Symptomatica tamen à primaria, situ discrepat, quòd continentem causam habeat non in venis maioribus perinde conclusam, sed cuiusdam parti impactam, è qua putrescens humor in cor obrepit, aut putrem de se vaporem in ipsum emittit. Symptomatica insuper febris à primaria ut plurimum termino distat.

Hæc quippe tertiâ ad summum hebdomadâ finitur; nisi errore commisso, naturæ conatus interrumpatur: quia hoc temporis spatium natura solet putredinem, quæ febrem committit, venis maioribus coercitâ mitigare,

concoquere, & humores morbificos putridos per aluum, aut vomitum, aut sudorem, aut insensibilem transpirationem excernere. At Symptomata febris in longius sapè tempus protrahitur; quia nunquam soluitur, nisi percurato morbo, à quo dependet.

D. Quotuplex est febris Symptomata?

C. Duplex: vna partis cuiuspiam inflammationem, altera obstructiōnem, putredinēve sequitur: illa acuta, hæc verò, nisi affatim fiat, lenta, quæ diuturna esse consuevit.

quotuplex febris Symptomata.

Prior Symptomata non nisi ephemera est, si externa aut distans est inflammatio, quòd solus calor partium continuatione in cor subeat: sed putrida febris est, si visceris cuiusquam est phlegmone, vel erysipelas. Sic à phrenitide, ab angina, peripneumonia, pleuritide, hepatitide, splenitide, & à nephritide febris fit phlegmonodes, ab erysipellate typhodes; eò quæque grauior, quòd pars affecta nobilior, cordique vicinior.

Symptomata acuta.

D. Quomodo febris hæc Symptomata à continua primaria discernitur, cum

utraq̃ue acuta sit, & putredinis notas exhibeat?

Quis Sym-
ptomati-
ca acuta à
primaria
internof-
catur.

C. Symptomatica hæc ex eo dignoscitur, quòd nullis statis periodis exacuatur, urina nullum putredinis indicium habeant, nisi ex affecta sede putredo forsan obrep̃at in venas, si non statim initio, mox tamen inflammatae sedis indicia se proferant, rarò vel septimo vel decimo quarto die aliisve decretoriis iudicio solvatur: In primaria verò febre continua hisce contraria appareant omnia.

D. Quomodo febris symptomatica à viscerum inflammatione curanda est?

Cur fe-
bris fo-
miti sit
adhiben-
da cura-
tio.

C. Quoniam viscerum inflammatio, continens febris consecutariae causa est, curatio iecoris, lienis, alteriusve visceris inflammationi debetur, quâ sedatâ protinus febris consecutaria discutitur.

Febris quippè Symptomatica, quæ partium internarum phlegmonem consequitur, ut non prius integrè desinit, quàm inflammatio conquiescit: sic consecutarius ardor extinguitur, simul ac perfecta fomiti fuit adhibita curatio.

D. Unde Symptomatica lenta oritur sui causam ducit?

C. Symptomatica febris lenta non ex visceris cuiusquam inflammatione oritur, sed è latente obstructione & putredine, quæ visceri contumaciter adhærescit, ad eò ut eius substantia plerumque labefactetur. Putredinis portio nonnunquam in venas effusa sanguini permiscetur. Tunc notas præ se fert Symptomaticæ eius, quæ aut phlegmonodes, aut typhodes appellatur.

Symptomatica lenta.

D. Quotuplex est Symptomatica lenta?

C. Duplex: una mitior, altera gravior.

Quotuplex sit.

D. Quæ febris lenta mitior?

C. Quæ à coërcito humore in viscere aliquo sensim putrescente oritur.

quæ febris lenta mitior.

D. Quomodo internoscitur?

C. Haud difficulter distinguitur ab altera, quia æger nullo gravi symptomate premitur; sæpè nec se ægrotare putat. Putredinis tamen notæ interdum elucet in urinis; pulsus frequens, celer & inæqualis, non tamen magnus aut vehemens; vires imbecillæ & languidæ collabuntur; ut ne

Signa febris lentæ gravioris.

progredi quidem æger possit Corporis moles, etiam si alimentum sumitur, sensim liquefcit. Diuturna etiam hæc febris est, quæ reliquarum continuarum terminos prætergreditur, nec vigesimo, nec interdum quadagesimo, soluta.

D. Cur febris lenta in tam longum tempus producitur?

Cur febris lenta
sit chronica.

C. Diuturnitatis causa est contumax iecoris aut lienis, alteriúsve visceris impuritas in venas maiores sese quotidie exonerans, qua fouetur febris; quæ non priùs integrè euanesceat, quàm frequenti catharsi impuritas ipsa viscerum sublata sit. Idcirco formes accuratè inuestigandus, vt instituatür victus viscerum affectioni, quæ febrem protrahit, accommodatus.

Cur formes
è vè-
ligio
quæren-
dus.

D. Vbi febris lenta sedes perquirenda?

In qua
parte cõ-
stat.

C. Vt plurimum in iecore, aut liene, interdum in ventriculo, vel mesenterio, nonnunquam in pulmonibus, cuiusvis humoris putredo cummulata, hanc excitat. Sedulò igitur obseruanda sunt hypochondria, & hypogastrium, num in his tumoris cuiusdam sensus insit. Sæpè etiam vel in

cachexia, vel in fœdis virginum coloribus, serosæ pituitæ in corpus effusæ levis putredo illam protulit.

D. Quibus notis dignosces iccoris obstructionem esse morbi formitem?

C. Si præcessit tertiana intermit-
tens, vel continua; si icterus est con-
spicuus, si in dextro hypochondrio
tensio, aut durities tangenti occurrit,
aut oris amaror fatigat, inestque car-
nis inappetentia, iecur obstructum,
fortè etiam calidius & siccus, morbi
fomes est.

Qui di-
gnosca-
tur an
morbis
fomes sit
in icco-
re.

D. Quibus signis dignosces lienem male affectum febris esse fomitem?

C. Si quartana præcessit, si sini-
strum hypochondrium tensum, du-
rum, ac condolens, lienis impuritas
in venas irrumpit, morbumque fouet.

An fomes
sit in lie-
ne.

*D. Ut autem lenta febris interdum a-
cuta succedit, nōne & acuta quandoque
evadit?*

C. Maximè. Ea siquidem quæ len-
ta per initia fuerat, accenso humore
ferociam aliquando adipiscitur.

Ut lenta
febris in
acutam
interdum
degeneret.

D. Quæ febris lenta gravior?

C. Illa profectò periculiosior, quæ
non solum ex impacti humoris, ve-

Quæ fe-
bris lenta
gravior.

rumetiam ex visceris, cui insidet, corruptione, putredineque emergit. Cerebri, pulmonis, iecoris, ac lienis, interdum etiam renis, distantiorumque partium corruptela, simpléxque putredo, tametsi nullo putri humore comitatur, quoniam tamen expiratione graui cor assiduò laceffit, continuam febrem non aliter quàm putridus humor suscitatur, eamque symptomatìcà, ac omninò lentam. Hanc plerique rerum affinitate ducti hectìcam dixerunt.

D. Quibus notis se prodit?

Quibus
notis di-
stingua-
tur.

C. Internoscitur ex eo quod sensim edatur, multòque tempore procedat, aliis ferè morbis succedat, nihil vel minimùm vacuatione mitescat, nullis cedat remediis, sed iis sæpè exaspere-
tur, vires plurimùm offendat ac debilitet, leuìque occasione syncopen accersat, sensim ac plerùmque sine sensu hominem extenuet, & marcore conficiat. Hoc genus est febris quæ phthisi comitatur. Hectica quippè nò est, sed putrida, ex putrescente pulmonum substantia.

D. Quæ febris lenta curatio adhibenda?

C. Febris continua lenta, quæ obstructiones viscerum consequitur, ex quibus materia ad eius continuationem in dies suppeditatur, alias per se oritur, alias alijs acutis febribus succedit, cum humor represso ardore crudorum usu, aut immodico frigida potu, ita retundit, ut nec citò concoqui, nec exardescere possit.

Febris
lentæ di-
stinctio.

Quæ per se oritur à viscerum obstructione sensim aucta, utraq; evacuatione, nempe venæ sectione & purgatione primis diebus gaudet; dein, ubi venarum plethoræ, sanguinis missione, & cacochymia purgatione satisfactum erit, reliquum curationis consistit in idonea victus ratione, in humorum concoctione, & viarum præparatione, catharsi semel aut bis in hebdomade repetita: hæc tamen cautione adhibita, ne vel calidorum remediorum usu humoraceensus febrem exasperet, vel victu nimis refrigerate ita incrassetur & impinguatur, ut curatio sit longior.

Quomodo
curanda
febris
lenta, quæ
per se
oritur.

Quod si fortè post diuturnum & methodicum remediorum descriptorum usum, febris nihilominus perse-

ueret, agrumque sensim exsiccat, & tabefaciat, sola conuenienti victus ratione oppugnanda, remedium intermissione facta. Sæpè enim morbus tandiu persistit, quandiu medicamenta exhibentur, sub quibus fatigatur natura: quæ deinde intermissis remediis vires resumens, morbi causam concoquit, & concoctam expellit.

D. Quomodo febris lenta acuta succedit?

C. Id ferè fit aut *Ægri errore*, aut *Medici imperitia*.

Errore quidem, cum nimio frigida potu, vel crudorum esu, æger humorem febris causam nimis refrigerat & impingit. Medici verò inscitia, cum coquendi & purgandi noxios humores occasionem non arripit; siue quod febrem, quæ sine crisi manifesta, sola coctione finitur, post vnam aut alteram vacuationem, naturæ committit.

D. Quomodo curanda febris lenta, quartiana atque quartana febris succedit?

C. Idonea victus ratione potissimum.

D. Quis victus in febre lenta ab obstructione iecoris instituendus?

C. Si iecoris imbecillitas sit in cause,

Quomodo febris lenta acuta succedit.

Quomodo curanda febris lenta quæ alteri succedit.

potus minuendus, circuncidendaque magna ex parte sorbitio, potus sit vinum aquosum & tenue. Sin iecur sit calidius & siccus citra imbecillitatem, victus sit frigidus & humidus, ea tamen moderatione, quæ cruditatem & obstructionem non ingeminet. Refrigerantibus ergo & humectantibus iusculis aperiencia inferantur. In locum vini detur pomaceum, aut ptisana, aut oxysaccharum. Vescatur carne vitulina, pullis gallinaceis aut columbinis elixis, non assis, gelatina, & aliis id genus.

Quis vi-
tus len-
ta febril-
is iecoris
obstru-
ctione
conueniat?

D. Quis victus in febre lenta ab obstructione lienis instituendus?

C. Si lienis obstructio certis signis conspicua est, nempe tumore sinistri hypochondri, dolore graui ad sinistram clauiculam protenso, anhelitus difficultate, decubitu in sinistrum latus molesto, sputatione frequenti, rugitu & murmure totius infimi ventris, palpitatione arteriarum, & colore faciei pallido ad nigredinem vergente; idem ferè victus, qui Quartanæ conuenit. Vinum quippè conceditur, sed tenue & dilutum, incoquenda perinde sor-

Quis len-
ta febril-
is lienis ob-
structione
conueniat?

bitionibus quæ validè aperiunt, vt radices petroselini, asparagi, graminis. Tantùm ab ijs abstinendum quæ nimio calore, nimiaque siccitate, vitiosum humorem in venis maioribus superstitem torrefaciunt, & feruorem ferè extinctum rursus accendunt. Ergo miscenda sunt cum calfacientibus & aperientibus refrigerantia; ne, dum crudos humores concoquere volumus, noui feruoris & exacerbationis febrilis occasionem suppeditemus. Præterea ita reliquum incendium refrigerantibus restinguendum, ne magis ac magis impingatur humor, geminetur obstructio, & augeatur cruditas, vnde febris diuturnitas. Præter victum diligenter præparatio adhibenda per ea quæ aperiunt, attenuant, concoquunt, & quantum opus esse videbitur, refrigerant, quæ dabuntur forma aut apozematis, aut electuarij vel pulueris. Semel etiam aut in hebdomade repetenda, donec viscerum & vasorum impuritati ita prospectum sit, vt ager febris omnis profus sit expers.

D. Quæ curatio lenta febris à squalore

Quæ siccitate debetur?

C. Quæ in viscere aliquo focum habet, si eius causa sit squalor & siccitas, procuranda alteratio per refrigerantia & humectantia, tam intrò sumpta, quàm extrinsecus adhibita. Itaque nutriendus æger cremore hordei, iusculis ex carne decocta cum herbis refrigerantibus. Imperandus lactis asinini vsus. Syrupus violaceus, qui lenit, humectat & refrigerat, ex aqua hordeacea exhibendus; Dorsum & pectus oleo violaceo illinendum. Sed præcipuum remedium est balneum aquæ dulcis, ex decocto remollientium, ut radicum althææ, & liliorum, seminum lini & psyllii, foliorum malvæ, violarum, parietariæ, & similium. Idèd sæpiùs id repetendum, sed citra sudoris profusionem. Cùm adstricta fuerit alvus, purgabitur æger per clysteres, per cassiam, catholicum, & alia lenientia cathartica.

D. *Qua ratione curari debet febris lenta, in foedis virginum coloribus, in leucophlegmatia & cachexia frequens?*

C. Quoniam hæc febris lenta species non à siccitate viscerum, sed à ni-

Quæ curatio lenta febris à squalore & siccitate adhibenda.

Qui lenta febris in pravo corporis habitu curanda sit.

mio humore calorem obterente proficiscitur, curatio perficienda sicco tenuique victu, remediis eiusdem facultatis, ac catharticis benignis.

D. Quibus remediis curanda febris lenta, qua Melancholici hypochondriaci plerumque tentantur, ad eam accedens qua virgines foedis coloribus laborantes committatur, ferociam tamen maiorem exhibēs, quoties vel humor melancholicus calidis alimentis, aut exercitiis vehementioribus irritatur, vel cruditas ex cibo aut potu contrahitur, vel aliquod animi pathema gravius urget?

Quæ remedia conveniunt lentæ febri, qua Melancholici hypochondriaci tentantur.

C. Ad huius febris lentæ curationem interdum calida & attenuantia remedia imperantur, cum humor melancholicus frigidus est, crassus & terrenus: nonnunquam refrigerantia & contemperantia, aut saltem temperata, cum humor melancholicus vi caloris non naturalis torrefactus est.

Quæ curatio febri lentæ, ex pulmonum substantia vitiosa putrique procedit?

D. Quenam curatio adhibenda febri lentæ, qua ex pulmonum substantia vitiosa putrique procedit?

C. Hæcticæ febri haud abfimilis.



DISPUTATIO II.

DE FEBRIBVS
intermittentibus.

DOCTOR II.

HActenus de febris continuis, tum
primariis, tum symptomaticis, dis-
seruimus; nunc ad intermittentes trans-
eundum. Quo discrimine intermit-
tem à continua seiungis?

CANDIDATVS.

Medicinæ Proceres vno consensu
omnes id discriminis inter vtrâmqve
statuunt, quod illa cum rigore, aut
horrore, vel frigore, inuadat, ac inter-
mittat statis periodis; hæc nullo præ-
fatorum symptomatum prægresso
corripiat; nec antequam omninò sol-
uatur, desinat. Fernelius insuper
contra veterum sententiam, & ma-
teriâ & materiæ situ intermittentem,
à continua differre acriter contendit.

*Quæ fe-
bris in-
termittens à co-
tinua se-
cernatur.*

*D. Veterum de hac controuersia sen-
tentiam recense.*

Veterum
opinio de
febris in-
termittē-
tis mace-
ria, & eius
actu.

C. Vetus iam opinio increbuit, hu-
morem, qui continens est, intermit-
tentis febris materia, in solo corpo-
ris habitu & extra venas computres-
cere: hunc accessionis initid è venis
maioribus, in quibus conditus erat,
sanguini permistus, in minores, ex
hisque in corporis partes, quarum
exquisitor est sensus, ferientis hu-
moris occutso vel rigere, vel inhor-
rescere. Eum mox sensim illic inca-
lescere, inflammari ac putrescere:
tùm demùm extenuatum caloris vi
vniuersum dissipari in sudores: sic
accessionem finiri, dum noua simi-
liter recurrat.

Sed Fernelius hanc opinionem
fraudentam, atque perniciosam hu-
manæ saluti fuisse, constanter asserit.

*D. Sigillatim refer quæ in eam opinio-
nem tot annorum authorumque numero
confirmatam Fernelius contorquet.*

Veterum
opinio
conuelli-
tur à Fer-
nelio.

C. Intermittentium febrium con-
tinentem causam non esse in habitu
corporis, nec antecedentem in ma-
ioribus venis, Fernelius quàm pluri-
mis rationibus longè grauissimis ful-
tus demonstrat: prima, quòd non om-

nes morbifici humores in venis maioribus contineantur, sed plerique in prima corporis regione congerantur, ac computrescant, ex quibus febres intermittentes oriuntur, ut ex illis continuæ fiunt:

Secunda, quod tam repente nequeat noxius humor sanguini permixtus, præsertim verò crassa lentaque pituita, aut bilis atra, à puriore sanguine prorsus secerni, & quasi momēto in extimas corporis partes, in manū pedūque digitos, & in nasum, protinus extendi:

Tertia, quod in continuis febribus peccanti materiæ in vasis maioribus conclusæ, portio quædam in corporis molem trequenter effusa, sæpè rigorem efficeret.

Quarta, quod in horrore atque rigore febrium intermittentium, urinæ micantur albæ, tenues, & crudæ, quæ bilem tum flauam, tum atram, intrò potius, quàm foras, compelli apertè indicant. Ac tum temporis molestia etiam sit suffocatio, tussis plerumque sicca, oscitatio, anxietas, præcordiorum distensio, ac sæpè dolor vehemens:

ab his nausea, & sub rigoris finem biliosa vomitio : accessionis verò progressu, multòque magis declinatione, omnia mitescant, & urinae euadant crassae, citrinae aut rubrae, quae argumento sunt; tum temporis bilem, ut in urinas, ita & in corporis summa, contendere. Hisce verò contraria omnia obtingerent, si accessionis initio bilis in summa corporis irrueret.

Quinta, quòd interdum toto febris intermittentis decursu, animaduertatur urina colore, substantia, hypostasique laudabilis, quae nullam in venis putredinem adesse testatur.

Sexta, quòd in exquisita tertiana leuiori, ubi non rigor, sed extremarum partium frigus solum percipitur, bilis flaua in corporis molem effusa, frigoris causa haberetur, licet calida acrisque ea sit.

Septima, quòd melancholia admodum rarò peccet in vasis maioribus, rariùsque multò putrescat, vnde quartana continua omnium febrium rarissima : quartana autem intermittens sit admodum frequens; adeò ut melancholia rarò in venis vitiosa, ex

his non possit tam copiosa suffici, aut tam crebro in corporis habitum pelli, quæ tot gignendis intermittentibus quartanis sit satis.

Postrema, quòd si antecedens febris intermittens materia in venis maioribus tota consisteret, vna venæ sectio, quæ hanc promptè demit, illius curatio foret. At hæc febrem intermittentem nequaquam tollit.

D. Qua sit intermittantium febrium materia, & qua illi sedes in corpore, ex Fernelij mente luculenter expone?

C. Materia intermittantium febrium à Fernelio perhibetur non venarum succus alendo corpori destinatus, sed humor superuacaneus, qui è iecoris sanguine prolectus in propria conditur receptacula, antequàm is iecur transcendat. Tertianæ materia bilis flaua affinis ei quæ in fellis cysti conditur: Quartanæ melancholia in lienem refusa: Quotidianæ pituita, mucosa & superuacanea, quæ in ventriculo intestinisque plurima colligitur.

Quæ intermittantium febrium materia statuitur à Fernelio.

Omniū propria sedes & origo in prima est corporis regione circum

Quæ illius sedes.

præcordia, circum ventriculum, diaphragma, iecoris caua, lienem, pancreas, omentum, aut mesenterium. Hæ siquidem partes sunt quasi publica corporis sentina, in quam omnis confluit cumulatûrque humorum colluuiæ.

D. Perge Fernelyj sententiam de frigore, horrore & rigore, intermittentis febris præcursoribus, aperire, eorum causam reddere, quæ inter se differant, & quomodo è prima corporis regione suscitentur, perspicuè docere.

Frigus, horror, & rigor, quo pacto corpus afficiant.

C. Frigus, horror atque rigor intentione & remissione distant: frigore summa corporis inalgescunt, horrore id vniuersum leuiter concutitur, hic enim ceu diminutus rigor est. Rigore vsque eò contremiscit concutitûrque, vix vt cohiberi possit.

Vnde ortus sui causam ducant.

Omniùm eadem causa, caloris nempe, frigoris, rei pungentis, aut quouis pacto molestæ, vehemens incurso in sentientes corporis partes confertim facta.

Quæ ratione inter se differant,

Differuntque solum inter se, aut vbertate causæ, aut vehementia, seu acrimonia, aut motionis impetu.

Vt

Vt enim aëris aut aquæ frigidioris
occurso corporis frigescit, & inter-
dum horret, atque etiam riget. Præ-
cordia autem & partes quæ circum
hæc sunt, quia mēbranis sepiūtur ner-
uōsq; sentientes suscipiūt, è sexta cere-
bri cōiugatione, eximio tāgendī sensu
sunt præditæ. Magna etiam societate
tum principibus, tum externis corpo-
ris partibus cōnexæ sunt, iisque adeo
consentiunt, vt affectæ mox principes
partes, vniuersūque corpus in con-
sensum trahant. Sic enim vinum me-
racius liberaliūque sumptū, tametsi
è ventriculo nondum elapsum est,
mox tamen vulnerati cruris, aut ar-
thritidis dolorem exasperat. Sic & fri-
gidæ potus liberalior corpus vniuer-
sum frigore, horrorēque concutit.
Bilem vomiturus, rigescit. Cui mor-
dax medicamentum ventriculum
præcordiāque ferit, non minùs etiam
rigescit, quàm si nudam cutem, aut
vlcus acrius compungat. Horrescit
demum & cui pus interiore abcessu
collectum irrupit in membranas.
Ac certè bilis putrescens in febre
acrem malignāque qualitatem

adipiscitur: eaque accessionis initio quasi turgens impetu fertur, affatimque irruit in præcordiorum membranas, idcirco rigorem concitat.

Citrina porro illa & prassina cæruleave bilis, quæ syncera sæpè vomitione prorumpit, propria intermittentis febris materia hinc esse dignoscitur; quod dum tota liberaliter rediditur, febrem omnem penitus extirpat, atque soluit. Ea sanè nunquam tam syncera possit è venis amandari citra exitium, sed duntaxat è præcordiis quæ illius sedes sunt. Hoc quoque vel inde constat, quod si accessionis initio humidi foci aptè calentes præcordiis imponantur, maximè verò lieni in Quartana, iecori in Tertianâ, aut alii cuicumque sedi fomes inesse deprehendetur, horrorem rigoremve leniant, quia nimirum ipsum mali fontem demulceant.

Cur putris humor pleuramque frigus solum, nonnumquam horrorem aut rigorem inducat.

D. Clarius demonstrares velim, cur putris humor interdum frigus duntaxat, aliquando horrorem, quandoque rigorem excitet; & quare febris modò lenior, modò gravior sit?

C. Calidus ac putris humor extra

venas quauis in sede conditus, quandiu conquiescit, corpus raro exagitat: at verò dum quasi efferatus illinc præter naturam impetu dimouetur, id variè concutit affligitque. Si paucus est, vt in leuioribus Tertianis, aut eius parua acrimonia, vt pituitæ putrescentis, motusque lentus ac languidus, solum frigus inuehit, calore quidem ac spiritu ab externis partibus intrò quasi in opem & subsidium aduocatis. Sin copiosior est, aut acrior, aut eius motus impulsusque concitator, horror inuadit. Cùm verò plurimus, isque vehementer acer ac mordax magno impetu in præcordia excussus, rigor verus inducitur. Hæc præterea rigoris, febrisque materia circum præcordia hærens; ex se tanquam è fomite malum vaporem in omne corpus effundit; qui & altera frigoris, horroris, rigorisve causa est. Hic enim teter vapor ex eo foco excitatus, in cor primum per cæcos ductus effertur, atque illinc quoque uersum per arterias effusus, omne corpus implet. Ac in tidi-
or offundens pulsum contrahit &

obscurat, cerebrumque implens aggrauat consopitque, omnes denique artus velut obtundit. Postea in corpus quasi aura quædam disiectus, sensim incalescit & inflammatur, ac tum febris ardorem, eiusque symptomata mouet. Tandem supra modum extenuatus, tum impetu proprio, tum impellente natura dissoluitur, interdum manifestè in sudores, interdum obscure sensimque per cutem.

Cur febris plerumque leuior:

Atque hæc quidem pura, leuiorque intermittentis species existit, in qua urinae plerumque toto morbi decursu, calore, substantia, sedimentoque laudabiles apparent, quia nimirum nihil bilis peccantis è præcordiis irrumpit in venas.

Quandoque grauior.

Nonnunquam verò inuasionis impetu humoris vehementius impulsæ una portio insilit in ventriculum, quæ biliosam vomitionem mouet, eamque ferè sub rigoris horridiue finè: altera portio tenuiore eo ipso impetu ex eodem foco per iecur venasque maiores in omne corpus irrumpit, tumque grauior est accessio, sub cuius finem urinae crassæ redduntur, atque flauæ,

his longè dissimiles quæ paulò ante accessione fuerat. Atque multò etiam grauior euadit febris, cùm ex eo ipso foco portio maior penetrat in venas. Accessione siquidem soluta, nonnunquam febrilis quædam manet inæqualitas, nec pura sequitur intermissio.

D. Ut frigoris, horroris, atque rigoris, intermittentem febrem antecedentis originem patefecisti, sic sudoris eandem consequentis scaturiginem persequere.

C. Sudores non è solo corporis habitu, sed & interdum è præcordiis moueri, hinc sciri potest, quòd qui vel exercitatione, vel solis ardore, exæstuat, si frigidam liberalius bibat, mox totus sudore diffluit, non mercede aqua in corpus dissecta atque fusa, (diu enim postea sentitur huc & illuc fluctuare in ventre;) sed eius habitus ab æstuantibus præcordiis in omne corpus effuso, qui demum in sudorem concreuit. Id præterea obseruatione dignum, quòd is, cui iecur aut lien ætate morbové inaruit, vel magna obstructione vel scirrho obduruit, vt in hydrope, in ictero, aut in cachexia,

Sudorum
prima scaturigo.

510 *N. Ab. Frambosarij*
nulla vi possit, ne per febres quidem,
in sudores induci, etiamsi reliquum
corpus humore multo perfundatur: is
verò, cui iecur atque lien calore hu-
moreque naturali abundant, quavis
ex causa sudore diffluat. Hinc igitur
conspicuum esse potest, primam su-
dorum scaturiginem è præcordiis de-
riuari.

*D. Adhuc quid de intermittentium
materia & eius sedo, & quid de frigoris,
horroris & rigoris efficiente causa, sudoris-
que origine Fernelius sentiat, accuratè re-
censuisti: superest ut Mercuriali, eius sen-
tentiam, cuius es assertor, refutare conanti,
respondeas.*

*Sic argumentatur aduersus Ferne-
lium:*

Mer-
curialis ob-
iectio in
Ferneliũ.

*Si febres interpolata fierent à synceris
humoribus in hypochondriis putrescenti-
bus, putredo esset in ipsis visceribus, aut ex-
tra viscera.*

*Si in ipsis visceribus, interpolata febres
essent perpetuò coniuncta cum aliqua in-
flammatione viscerum:*

*Sin extra viscera putredo contrahere-
tur; putris materia necessariò aut unica
accessione discerneretur, aut diu duraret*

sine ulla interpolatione.

C. Respondeo: Nunquam Fernelio
in mentem venisse putrem intermit-
tentis febris materiam in visceribus
contineri, quòd ex ea febris continua
oriatur symptomata, phlegmonodes,
aut typhodes non intermittens: Respon-
sio.

Sed circum præcordia, ut circa Ven-
triculum, iecur, lienem, aliave viscera,
putredinis focus esse contendit.

D. Ergo unica accessione discuteretur
putris materia, ait Mercurialis:

C. Concedo. Sed simul ac discussa
est, noua in foco colligitur, ex qua
quotidie, vel tertio, quartove die no-
uus renascitur paroxysmus, simili ty-
po repetens, quousque febris fomes
prorsus fuerit extinctus.

D. Aut diu duraret sine ulla inter-
polatione, inquit.

C. Nequaquam. Vbi enim super-
uacaneus humor satis copiosus in
parte affecta cumulatus est, ad excre-
tionem proripitur natura.

D. Urget nihilominus hoc argumento
Mercurialis:

Ubi in aliqua parte putrescit syn-
cerus humor, seu perpetuò sympto- 2. Obie-
ctio.

512 *N. Ab. Frambesarij*
mata sunt conspicua.

Ergo si circa viscera synceri humores
putrescerent , graua semper apparerent
in interpolata febre symptomata.

Quod experientia non comprobatur.

Respon-
so.

C. Id (inquam) pernego. Quid ?
Nōne intermittentium febrium ini-
tium , vnā cum rigore , horrorēve , suf-
focatio , tussis , anxietas , præcordio-
rum distentio , nausea , dolor vehe-
mens , animi deliquium , & alia id
genus immania symptomata frequen-
ter ægrotantem affligunt ?

Sed Mercurialis validis hisce ra-
tionibus victus , ad pacem cum Fer-
nelio faciendam inclinat. Sic enim
suos iam discipulos affatur : Vt sta-
tum totius causæ intelligatis , nec Ga-
lenus , nec nos negamus interdum
fieri interpolatas febres ex putredine
circa viscera , siue ibi coaceruata sit
per influxum , siue per congestionem :
sed quod semper hac ratione fiant , il-
lud est quod negamus.

At si ingenuè fatetur febrem inter-
mittentē grauiorib⁹ symptomatis sti-
patā , à biliosis humoribus circa visce-
ra putrescentibus fieri ; cur eandem

negat leuioribus symptomatis comitatum, à biliosis vaporibus ex eodem putredinis foco manantibus, ortus sui causam ducere?

D. Sed aliam Mercurialis acutiorem ^{3. Obiectio.} sagittam è sua pharetra eductam acriter eiacularur in Fernelianum de frigoris, horroris & rigoris causa placitum;

Si frigus, horror, rigorue fiat, è quòd vel humores vel vapores putridi membranas viscera vestientes feriant, non tantum initio contingeret, sed & in augmento & statu, quo tempore multò maiores, & acriores attolluntur.

C. Ictum haud difficulter auertemus, ac telum in Aduersarium retorquemus. Initio si quidem intermittentium febrium, dum frigus, aut horror vel rigor infestat, maiorem in prima corporis regione putris humoris vaporisque inde manantis copiam & acrimoniam esse asserimus, quia tum temporis tota putredinis materia illic continetur. Postea verò ubi eius portio quædam in ventriculum excussa est, altera in venas maiores, indeque in corporis habitum irrupit, tetèrque vapor per vniuersum corpus quo-

quoverfum diffusus est, minor in foco remanet putredinis copia & acrimonia. Id autem in augmento & statu contingit. Ergo speciosa Fernelij sententia manet illæsa & incolumis.

D. Quoniam omnes Mercurialis obietiones in Fernelium, ingeniosè diluisti, profer deinceps intermittentiū febrium differentias?

Intermittentium
februm
differentias,

C. Intermittentiū februm alia à pituita sunt; alia à bile flava, syncera vel mixta; alia à melancholia, naturali, vel aduentitia. Quæ à pituita oriuntur, Quotidianæ sunt: quæ à bile flava, Tertianæ, simplices aut duplices, legitimæ vel spuria: quæ à melancholia, Quartanæ, simplices aut duplices vel triplices, exquisitæ, vel nothæ. Quæ quidem omnes à circuitus ordine nomen sortitæ, quia statis periodis, Quotidianæ quotidie, Tertianæ tertio, & Quartanæ quarto quoque die, simili typo redeunt, Typicæ merito dicuntur; ut quæ incerto tempore recurrunt, Erraticæ.

D. Quid statum febris circuitum mon-

Que statum
circuitus
causa sit.

C. Concitati cuiusque humoris ne-

dum quantitas, sed & propria qualitas à putredine contracta, paroxysmum stato circuitu renouat.

D. Ad patefaciendam periodi causam, cur putrescens pituita quotidie, bilis tertio, melancholia quarto quòque die, impetum faciat, apertius explica?

C. Multi putant pituitæ satis quotidie, bilis flauæ non nisi tertio, & melancholiæ non nisi quarto die satis cumulari posse, ad proritandam naturam, ciendúmque paroxysmum. Sed solertissimus Fernelius non solam humoris copiam, sed aliam quamdam vim maiorem necessariò vnumquemque humorem stato tempore impellere contendit. Hanc autem contractæ putredinis qualitatisve proprietati, quam Græci apto nomine *ἰσχυροπραΐαν* appellant, acceptam refert. Ut epilepsiæ insultus, non humoris genus, sed qualitatis natura in humore sita excitat: & menstruam mulierum purgationem statis periodis mouet non sanguinis exuperantia duntaxat, (nam siue paucus, siue multus est in muliere, mensibus tamen singulis, nisi quid naturæ ordinem in-

Quid humorum motus efficiat.

terpolet, erumpit;) sed vis ortæ qualitatis : ita & vis quædam seu qualitas in humore genita efficit, vt putrescens pituita quotidie, bilis flaua tertio, atra quarto die, impetum faciat. Humor autem superuacaneus plenior cumulatus, quia vix naturæ beneficio & calore regi potest, corrumpitur, & quodam modo putrescit: ac tum qualitatem eam adipiscitur, quæ hunc illūve motum impetūque habet. Atque vt sua est cuiusque humoris species, ita & sua cuiusque putredo, vel qualitas, suus cuiusque motus. Aliam igitur qualitatem, aliūque motum, pituita, alium bilis flaua, alium melancholia putredine contrahit.

Qua ratione recurrat ordine paroxysmus.

Hac autem ratione accessio ordine recurrit. Cū febris inuasa est, humor in suo quasi foco coërcitus. cōcitur, & quasi turgescens excandescit, ipsōque impetu & multū de se tetrum vaporem quoquoersum in corpus diffundit, & interdum exiguam sui portionem eructat, excutitque in præcordia, vt in ventriculum; nonnunquam & per iecur in maiores venas:

eaque manet accessio, dum sedetur impetus, & dum quicquid è foco excussum est, calore crematum dissipetur, aut in sudores abeat. Hinc succedit intermissio, eòusque cessans, dum alio humoris motu, & nouo quasi furore alia recurrat accessio. Recurret autem stasis periodis typo simili, nisi quiddam ordinem interpolet.

D. Quid circuitum ordinem formamque mutat?

C. Multa febres ordinem tenere prohibent, efficiuntque, vt paroxysmi vel anticipent, vel cunctentur.

Anticipant præter consuetudinem, vel cum subiecta eorū materia augetur, vt ex impuro vitiosoque cibo, & excrementorum suppressione; vel cum nimio perè extenuatur, vt aromatum, aliorumve calidorum tenuatiumque usu: vel cum motu exagitur, vt exercitatione, balneis, æstu, animi excalescentia.

Cur paroxysmi anticipent.

Cunctantur verò, dum contrariis ex causis materia vel minuitur, vel crassescit, pigrior ignauiorque redditur.

Cur cunctentur.

Quoties verò tanta circuituum mutatio apparebit, vt nullo ordine procedant; humor aut in alterius naturam commigrat, aut alterius generis permistione confunditur.

Cur longi.

Accessiones porrò longæ euadunt, cùm humor effusus, eiùsque vapor multus, crassus & viscosus est. Hic enim non nisi multo tempore inflammarì, absumique potest; & cùm meatuum est adstrictio, aut virium imbecillitas. Hæ siquidem dissolutionem prohibent.

Cur breues.

Breuitatis verò causæ sunt, humor paucus ac tenuis, viarum amplitudo, viriùmque robur.

D. *Quibus signis prænosces num longiores an breuiores futurae sint febres intermittentes?*

C. Pro varia viscerum, humoris dominantis, & anni temporum constitutione, victùsque ratione, longiores aut breuiores fore iudicantur.

Quæ febres longiores fore præsumant.

Longiores quippè & contumaciores sunt, si praua adsit iecoris aut lienis affectio, si corpus abundet humoribus melancholicis aut pituitosis, si Autumnus aut Hyems dominetur, si

æger copioso alimento se sustineat, si potu multo calorem opprimat.

Contrà verò, breuiiores sunt & securiores, si bonus sit totius corporis habitus, si viscera benè sint affecta, si Ver aut Æstas adsit, si æger in ediam ferat, aut parcè bibat.

Quæ breuior
uiorta.

Quinetiam febres intermittentes interdum continuæ euadunt, cùm humoris putredo è prima in secundam corporis regionem commigrat. Nonnunquam aliæ aliis singulis anni temporibus succedunt.

D. Quo pacto sit febrium intermittentium permutatio?

C. Febrium intermittentium commutatio contingit per temporum vicissitudines, cùm morbificus humor in alterius naturam commigrat. Nam Vere, ac magis Æstate, omnia excrementa bilescunt: Autumno verò in melancholiam degenerât, Hyemè in pituitam. Nec enim alia ratione febris Tertiaria, quæ Æstate inuasit, accedente Autumno in Quartanam facessit, quàm quòd bilis flaua in melancholiam mutatur. Nec aliam ob causam Quartana, quæ Autumno &

Quæ &
quando
intermit-
tentium
febrium
permuta-
tio fiat.

tota Hyeme afflixerit, Vere in Tertianam transit, quàm quòd melancholia incalescens bilescat.

Pituica venas obstruens & bilis exitum prohibens diuturnitatis febris occasio est, sed rarò primaria competitur efficiens febris causa, quòd nunquàm bilescat.

Potest tamen in melancholiam degenerare, & Quartanas facere, cum illa siquidem frigiditate sua consentit.

Quocircà in continentem febrium intermittantium causam radicitus extirpandam toto animo & studio omni incumbendum,

D. Cur tam accurata febribus intermittentibus curatio adhibenda?

Cur intermittens febrili cura sit magni momenti.

C. Febrium intermittantium cura est tanti momenti, ut eà neglectà, nisi naturæ beneficio criticè solvantur, in longissimum tempus protrahantur, & in varios morbos aut acutos aut diuturnos degenerent, aut colicis doloribus quàm atrocissimis finiantur, quos in quibusdam excipit Paralysis brachiorum & crurum, ea tamen imperfecta, quàm illaso sensu motus perimitur.

D. *Quotuplex est febrium intermittentium crisis?*

C. Duplex : vna singularum accessionum, altera totius morbi.

Quotuplex illarum crisis.
Quomodo singularum accessiones solvuntur.

Accessiones singulae sudoribus optime finiuntur, interdum sed imperfecte insensibili transpiratione, nonnunquam & papulis labiorum imperfecte iudicantur. Saepè initijs accessionum vomitiones urgent, quae licet humore multo detracto naturam exonerent, non tamen criticè, sed symptomaticè fiunt, neque morbum rectè iudicant. Vt enim continuarum febrium initiis, cum cruda sunt omnia, vacuationes omnes non naturae vi, sed morbi potius impetu & symptomaticè contingunt : sic quae per initia accessionum febrium intermittentium contingunt, turgentis materiae acrimonia naturam irritante, proprioque morbi impetu, non solius naturae victricis robore fiunt.

D. *Quomodo febres intermittentes perfecte iudicantur?*

C. Febres intermittentes perfecte iudicantur solo alui profluvio bilioso. Cum enim ipsarum focus sit vel in

Quomodo febres intermittentes perfecte iudicantur.

cysti fellis , vel in mesenterio , vel in liene, etiam si quæ singulis accessibus ex eo effertur exhalatio in habitum corporis irrepens, vel sudoribus, vel insensibili transpiratu, vel papulis discutitur, manet tamen crassamentum, quod nisi beneficio naturæ vel medicamentorum per aluum expurgetur, obstructionum contumacium, icteri, & si illinc in abdominis membranas effundatur, sæuissimorum ventris cruciatuum causa esse solet.

Adeò ut, qui à febre intermittente conualescunt, nulla excretionem biliosa per aluum facta, accommodatis pharmacis egeant, ad crassiorem humoris partem in præcordiis stabulantem detrahendam, ne fiat recidiva. Sola enim spontanea aut arte facta bilioforum deiectione à febris reuersione liberat.

DE TERTIANARVM intermittentium Curatione.

D. Præmissa vniuersali febrium intermittentium doctrina, singularum aggradienda curatio est, ducto à Tertianis exor-

dio, quòd omnium frequentissima sint.

Quotuplex est Tertianæ intermittentis curanda indicatio?

C. Tertianæ intermittentis curatio triplicem habet indicationem: vnam à febre sumptam, alteram à causa, postremam à symptomatis quæ febrem sequi solent.

Quotuplex sit Tertianæ curandæ indicatio?

D. Quid febris indicat?

C. Febris refrigerationem, & humectationem requirit.

Vnde febricitanti victus refrigerans & humectans instituitur.

Quæ à febre sumitur?

D. Quid causa indicat?

C. Causa euacuationem demonstrat, quam debet præcedere materiæ præparatio, & viarum per quas fluat apertio.

Quæ à causa?

D. Quomodo materia præparatur?

C. Coctione & alteratione, vt refrigeratione & humectatione.

D. Quomodo via per quas debet fluere materia aperiuntur?

C. Attenuatione & deterfione humoris craffi lentique, vias obstruentis.

D. Quomodo materia euacuatur?

C. Venæ sectione, purgatione per

524 N. Ab. Frambesarij
aluum, per vomitum, sudorum pro-
vocatione.

D. Quid symptomata postulant?

Quæ à
sympto-
matibus.

C. Lenitatem per ea quæ humoris
acrimoniam obtundunt.

D. Quo pacto uniuersa hæc remedia
singulis periodis aptanda sint, deinceps
explanandum. Quæ prima accessioni
sit adhibenda curatio in primis expri-
me?

Quid ad
primæ
accessio-
nis cura-
tionem
requira-
tur.

C. Prima accessio blanda cum sit,
nulla remedia postulat, præter exa-
ctam diætam. A cibo quippè absti-
nendum, dum prorsus quieuerit. Si
tamen sitis vrget, extinguenda est
potione refrigerante & bilis feruo-
rem obtundente, succo limonum
cum sextuplo ptisanæ, vel hydrosac-
charo, vel iulepo Alexandrino, aut
pomaceo. Sub finem accessionis sor-
bitio refrigerans & humectans, ex iu-
re pulli aut carnis vitulinæ, lactuca,
portulaca, oxalide & similibus alte-
rato, exhibenda.

Si quidem in febris Tertianis, ve
& aliis intermittentibus, extra acces-
sionem cibo locus est.

Cur in accessione non est alendus ager?

C. Quia in febris exacerbatione dum corpus vniuersum tetro vapore perfunditur, cibus recens sumptus labefactatur, & magna ex parte corrumpitur, vnde excandescencia maior euadit. Adde quòd natura mortifico humori concoquendo prorsus intenta, noua cibi concoctione auocanda non sit, vt monet Galenus. Ideò in paroxysmo cibum porrigere prohibet Hippocrates. *Aphorism. 2. sect. 1.*

Cur in paroxysmo prohibeatur cibus.

D. Quòd si paroxysmus adeò longus, vt vires tandiu sufficere nequeant, nonne agrum alere licebit? *Obiectio.*

C. Si æger ob imbecillitatem deficere videatur, nullo non accessionis tempore erit alendus: sed minore periculo aletur desinente, quàm incipiente febre; & crescente, quàm vigente. Verùm intermissionis die securius cibatur: nisi quatuor aut quinque horis ante succedentis paroxysmi inuasionem, quo tempore subtrahendus cibus est, vt febris inani ventriculoprehendens, minus negotij facessat. *Responsio.*

D. Nihilne inter primam & secundam accessionem corpori indendum, præter

526 *N. Ab. Frambesary*
alimentum quod assumitur?

*Quid po-
stridie ac-
cessionis
facien-
dum.*

C. Maturinâ aut vespertinâ horâ,
longè à pastu, iniiciendum est ene-
ma, ex catholici & diacassianæ ana ℥. β.
& mellis rosati ℥. iij. in feri lactis, vel
decocti remollientis ℥b. i. dissolutis
comparatum. Mel non admiscetur
simplex, quòd in bilem facilè verta-
tur. Olea non adiiciuntur, quia ca-
lorem & putredinem facilè concipi-
unt, nec proinde biliôsis febribus
conueniunt.

D. Quid ad secundæ accessionis curationem molendum?

*Quid in
secundæ
accessio-
nis cura
molien-
dum.*

C. Secunda accessio grauioribus
symptomatis comitata est, quibus si-
gillatim peculiaribus auxiliis opitu-
landum. In ea autem nihil tentandum
est. Poterit tantùm accessionis feruo-
re ad ardorem leniendum hepatis re-
gioni admoueri epithema, ex aquarum
cichor. rosar. plantag. ana. ℥. iij. aceti
rosar. ℥. ij. camphor. ℥. β. pulu. elect.
trion-sant. ℥. ij.

Sed cauendum ne hic liquor hypo-
chondrio infideat, dum imminet su-
dor. Eius enim eductionem inhiberet:
qui si sponte erumpat, operimentis

mediocribus excipiendus ; & nisi præcordia multo potu turgeant, iulepo aliquo iuuandus, vt syrupo capillorum veneris & limonum cum aqua cocta dissoluto ; aut si nulla phlogoscos viscerum suspicio, vino albo tenui quàm dilutissimo. Id quippè sudores & vrinas mouet. Quòd si beneficio naturæ non erumpat, non est aut multis vestibus, aut aliis calorificis admotis prouocandus.

D. Quid postridie accessionis agendū ?

C. Mittendus erit sanguis è basilica dextra, cautione tamen adhibita, ne vacuatione immodica dissolutæ vires succedentis exacerbationis impetum ægrius perferant.

Quid in
intermis-
sione,

D. Sed quid confert Tertianæ phlebotomia, cum de continente febris materia, quæ est in prima corporis regione, nihil tollat ?

C. Quia materiæ morbificæ portio, & ab ea elati vapores, è prima corporis regione in venas maiores effunduntur, à quibus sanguis in ipsis contentus corrumpitur, vtiliter secatur vena, maximè si plethora adsit, & symptomata febris grauissimè infestent.

D. Cur inter secundam & tertiam accessionem celebranda tibi videtur phlebotomia, cum alij complures ab hac ante quartam accessionem abstineant?

C. Quia magna remedia & τὸ ἀπὸ τοῦ, non & τὸ ἀπὸ τοῦ præcepto Hippocratis administranda. At quarta accessio plerumque morbi vigor est, quo maxime tempore omnia exacerbari solent.

D. At non alia de causa illi vena sectionem tandiu differunt.

Metuunt enim ne perturbatio quæ in vigore ab insito calore turgentem humorem concoquente contingit, prægressæ phlebotomiae adscribatur.

C. Legitimæ curationis ordinem ob vulgi calumnias pervertere nefas. Prædicenda potius morbi exasperatio multò maior futura, nisi sanguis missus fuerit.

D. Quæ curatio tertia accessionis die ac postridie instituenda?

Quæ tertia debeaturationi curatio.

C. Tertia accessio sæpè vehementioribus symptomatis comitata est, quæ eodem die accommodatis remediis lenienda sunt. Postridie verò accessionis, catharticum leniendo & refrigerando

frigerando purgans dandum, vel forma boli, aut potus.

Exempli gratia:

℞. cassiæ recenter extract. ℥. j. seminis melon. mundat. contusi. ℥. j. fiat bolus, die intermissionis exhibendus: vel
 ℞. rad. cichor. oxalid. gram. asparag. an. ℥. β. folior. endiu. scariol. pimpinell. capill. ana M. β. flor. cordial. an. P. β. semin. melon. mund. ℥. j. fiat decoctio pro dosi, infunde in vna parte fol. sen. mund. ℥. iij. caryophyll. n. iij. in altera rhabarb. el. ℥. i. β. cinnam. ʒ. β. in expressa colat. dissolue syrupi capill. ℥. β. fiat potus.

Quæ intermis-
sionis.

D. Cur syrupus rosarum pallidarum non additur?

C. Quia syrupus rosarum pallidarum, licet mitis sit & gratus, sola tamen serosa excrementa detrahit. Itaque nullum locum habere debet in biliosis febribus, nisi seroso humore æger scateat. Alioquin detracto sero bilis freno, sitis, ardor, & siccitas magis efferantur. Adde quòd benigniorum medicamentorum actionem sic præcipitat, ut ea fine suo frustretur.

D. Cur diaprimum, aut elect. de succo

rosarum non admiscetur?

C. Quia scammoniata bilem acrius accendunt, febrémque biliosam exasperant. Itaque ab illis hîc abstinendum.

D. Quæ curatio, quarta exacerbationis & intermissionis die, tentanda?

Quæ
quartæ
periodi
curatio.

C. Quartâ accessio, morbi vigor est, horrendis sæpè symptomatis se prodens, quibus sigillatim occurrendum peculiaribus remediis postea dicendis. Quòd si singulæ accessiones sudoribus solvantur, & urinae sanis proximæ sint, spes est accessione septima febrém solutum iri: sin contraria adsint, in longum tempus protrahetur, maximè si Autumnus proximus sit. Itaque si per initia, venæ sectio omissa fuerit, vel si detractus sanguis valdè putris apparuerit, postridie accessionis quartæ repetenda erit phlebotomia, ut humorum in venis maioribus contentorum putredo arceatur, sicque febris intermittens in continuam transitus prohibeatur. Post quartam accessionem si sudores naturæ beneficio non erumpant, sudorificis prouocabuntur.

D. Quæ cura quinta accessionis & intermissionis habenda?

C. Quinta accessio si quibusdam adhuc grauibz symptomatis sit comitata, danda enixè opera vt idoneis remediis illicò demulceantur. Si nausea fatiget initio paroxysmi, ad vomitum prouocandus æger, maximè si facilè vomat, nec habeat thoracem angustum, pulmonem imbecillum, collum gracile, nec vnquam sanguinem vomuerit, aut spuerit.

D. Quid ad ciendum vomitum dandum?

C. Oleum cum vino albo, aut cum aqua tepida mistum, ita vt ad ℥. vj. liquoris sint ℥. iij. olei. Datur etiam ℥. j. radicis asari puluerisati, dissoluti cum ℥. vj. vini albi: aut serum lactis in quo decē asari folia fuerint infusa. Vulgus oui crudi luteum in ℥. iij. omphacij dissoluit. Quòd si tardiùs vomitorium operetur, digitus gulæ immittatur, quàm altissimè fieri poterit, aut penna oleo illita fauces tussillentur. Erit profectò vtilissimum emeticum, si sine magno conatu ingentem bilis & pituitæ copiam detra-

hat. Quòd si semel datum, febrem non discussit, repeti potest, interiectis præparantibus & purgantibus.

D. Sunt qui vel primis accessionibus vomitorium propinant?

C. Maximè. Sed alij non nisi post quartam accessionem propinandum esse contendunt, quod ante id tempus humor adhuc crudus non facilè sequatur medicamento impetum.

Quod si per initia purgatio neglecta fuerit, postridie accessionis quintæ, purgatorius potus antea præscriptus erit exhibendus. Saltem clyster emolliens & detergens iniiciendus.

D. Quæ remedia sexta accessionis curationi adhibenda?

Quæ remedia
sextæ accessionis,
atque intermissionis
die præscribenda.

C. Si molesta quædam symptomata supersint, sextam accessionem comitantia, peculiaribus antidotis profliganda.

Apozema deinceps instituendum, quod refrigerando, aperiendo, & concoquendo, morbi materiam ad purgationem præparet, hoc modo:

℞. radic. cichor. gram. oxalid. ana ℥. j. radic. petrosel. & fœnicul. in aceto macerat. ana ℥. β. capill.

omnium bugloss. borrag. hyssop.
 agrimon. hepatic. ana M. j. semin.
 4. frig. maior. ana \mathfrak{z} . ss. florum iij.
 cord. an. P. j. fiat decoctio ad lb. j.
 in colat. \mathfrak{z} . viij. dissolue syrupi de ci-
 chor. syrupi de pomis an. \mathfrak{z} . j. fiat apo-
 zema clarif. aromatiz. \mathfrak{z} . ij. santal.
 citr. pro ij. dosibus; quarum vna ma-
 nè, altera vesperi, pridie accessionis
 septimæ exhibeatur.

D. Quid septima periodo præstandum?

Quid se-
 primæ ac-
 cessionis
 die agen-
 dum.

C. Septima accessionis die, quies-
 cendum, ac diligenter obseruandum
 quid molietur natura. Quamuis au-
 tem Tertianæ soluta sit, nihilominus
 tamen æger, si non contigerit sponta-
 neum alui profluium, recidiuæ metu
 postridie repurgandus est hoc potu :

quid po-
 stridie.

\mathcal{U} . decocti ex apozemate relictī \mathfrak{z} .
 iiij. infunde in vna parte fol. Oriental.
 \mathfrak{z} . ss. cum caryophyll. vj. in altera
 rhab. el. \mathfrak{z} . ij. cum cinnam. \mathfrak{z} . ss. &
 agaric. recent. trochisc. \mathfrak{z} . ij. in ex-
 pressa colatura dissolue syrupi de ci-
 chor. \mathfrak{z} . j. fiat potus, manè sumendus.
 Licet enim sudore, aut insensibili
 transpiratione finita sit hæc febris,
 crassior tamen bilis in præcordiis re-

manens, nisi naturæ beneficio prorumpat, reciduum morbum facit.

Transitus
Tertianæ
legitimæ
ad spur-
riam.

D. Adhuc fuit Tertianæ legitimæ intermittentis curatio minutatim exposita, nunc ad Tertianæ nothæ curationem transfundendum. Sed imprimis quæ inter se distinguantur, aperi?

Quæ inter
se distin-
guantur.

C. Tertianæ legitimæ à spuria distinguitur, quod illa in septem periodis quàm tardissimè iudicetur, ut Hippocrates adnotavit Aph. 59. l. 4. hæc verò diutius perseveret.

D. Cur illa breviori, hæc verò longioris tempore terminatur?

C. Quia legitima Tertianæ, à bile simplici profecta est; spuria verò à bilis permissione cum pituita aut melancholia, unde contumaces oriuntur obstructions, quæ hypochondriorum tactu, faciei colore, & aliis signis deprehenduntur. Illa proinde febris, μονοειδής, hæc verò ποικίλη διάθεσις est.

At αἱ ποικίλαι διαθέσεις αἰεὶ χρονιάτεραι γίνονται ἢ μονοειδῶν, ἀδυναμίας δὲ καὶ ἀλγούτων τῆς εὐσεως ἐν ὀλίγῳ κατεργάζεσθαι τὰς πολλὰς διαθέσεις: Multiformes affectiones semper dururniores fiunt, quàm quæ sunt unius formæ: quia scilicet natura

exiguo tempore multiplices affectio-
nes ſubigere & concoquere nequit,
vt præclarè *Galenus com. in Aph. 40. l.*
4. ſcriptum reliquit.

*D. Quanam remedia Tertiana notha
curationi adhibenda?*

C. Quæ potentiùs aperiunt, & cru-
dos humores concoquunt deligenda,
qualia ſunt ſimplicia, ex quibus con-
ſtat hoc apozema: ℞. radic. cichor.
℥. ij. radic. apij, petroſel. fœnic. in
aceto macerat. an. ℥. j. radic. enulæ
campan. polyp. an. ℥. ſ. glycyrrhiz.
paſſul. an. ℥. vj. fiat decoctio ad ℔. j.
ſ. addendo ſub finem capill. omnium,
bugloſſ. borrag. hyſſop. an. M. j.
florum cordial. epithym. abſyn-
th. vulg. an. P. j. in colat. diſſolue
ſyrupi capill. Ven. & ſyrupi bizan-
tini an. ℥. ii. fiat apozema, pro iiii.
doſibus, bis in die exhibendis.

Quæ re-
media ad
Tertianā
notham
proſtigā-
dam deli-
genda,

Concocta morbi materia, eodem
detrahatur apozemate, cui ſol. Oriē-
tal. ℥. ſ. cum zingib. ℥. ſ. infuſæ fue-
rint.

Si tenſio ſit in præcordiis, præſcri-
batur hic fatus emolliens, attenuans
& roborans:

Z iij

℞. rad. althææ, semin. lini an. ℥. ij.
 rad. cyperi, enulæ campan. calam.
 aromatic. semin. fœnic. anis. an. ℥. β.
 fol. absynth. menthæ, agrimon. scolo-
 pend. origan. hyssop. an. M. j. flor. cha-
 mæmel. melilot. aneth. rosar. rubr. an.
 P. j. includantur duobus sacculis, qui
 coquantur in aqua, addendo vini ru-
 bri quartam partem, & aceti ℥. ij. ut
 altius remediorum vis deducatur, nec
 fotu iecur incalascet. Post fotum illi-
 natur hypochondrium oleo de absyn-
 thio, de capparibus, vel chamæme-
 lino.

A fotu & litu rursus purgatio de-
 cernenda, quæ præparatum humorem
 eximat, atque bis saltem in hebdoma-
 dereperenda, donec omninò sit pro-
 fligata febris, exhaustaque morbi sen-
 tina.

Victus interim attenuet, incidat, &
 in calore & frigore sit temperatus.
 Iusculis incoquantur petroselinum
 & hyssopus. Vinum detur album,
 aqua temperatum.

*D. Hac curandi ratio maximè mihi
 probatur, à quocumque humore vitioso fe-
 bris oriatur: sed si contumax adeò fuerit,*

ut hisce non cedat remediis, nullane alia sunt ad eam profligandam usurpanda?

C. Si ultra 14. accessionem febris extendatur, accuratiùs peruestiganda diuturnitatis causa, num humor melancholicus, atrabilariùsve, aut pituitosus sit cum bile mistus: an prava quædam iecoris, aut mesenterij, alteriùsve visceris affectio, sit illius fomes. Ad vitiosum humorem internoscendum, considerandus est faciei color, & totius corporis habitus.

D. Quibus notis dignosces num humor melancholicus sit?

C. Si melancholicus humor est, color faciei fuscus & nigricans conspicitur, mores ad mœrorem & terrorem inclinant, tactu percipitur in hypochondrio sinistro tensio & renixus.

D. Quibus remediis curationem tentabis?

C. Iteranda phlebotomia è basilica sinistra, nisi venarum plenitudo sit exhausta. Bis in hebdomade peccas humor præfato apozemate denuò præparatus, repurgandus erit potione comparata ex radicibus & herbis hepaticis & spleniticis, cum quibus de-

Quid in cura Tertianæ notæ diligenter animadvertendū.

Quibus signis dignoscat. an melancholia cum bile sit Tertianæ diuturnæ causa.

quibus remediis instituentur cura.

coquatur rad. ellebori nigri nostratis
præparati ʒ. ſs. pro quâque doſi : Cly-
ſteres frequenter iniiciendi.

Suprà , comprehenſi fotus & litus
iterum adhibendi.

Balnea deinceps ex uſu erunt. Nihil
enim æquè craſſum & contumacem
humorem attenuare, concoquere, &
emollire poteſt, atque balnei uſus die-
bus intermiſſionis, horâ matutina ac
veſpertina repetitus. In cuius ingreſſu
æger hauriat ʒ. iiij. apozematis ex ra-
dice enulæ, abſynthio, & aliis idgenus,
parati. Sed quarto quoque intermiſ-
ſionis die, intermiſſo balneo, purgans
medicamentum repetatur. Quòd ſi
humor melâcholicus, frigidus & ter-
renus extiterit, balneum ſit paulò cali-
dius, in quo etiam leuiuſculus ſudor
ſinatur effluere. Sin autem atrabila-
rius fuerit, tepidum duntaxat bal-
neum ſit, nulluſque ſudor promouea-
tur. Melancholicum enim humorem
ad concoctionem calfacere, attenuare
& incidere oportet. Atrabilarium ve-
rò à flaua bile genitum, humectare, &
temperatè mitigare. Idcirco victus
in Tertiâna notha à bile & melancho-

lico succo mistis, mediocriter calfaciens & attenuans esse debet: ab atrabilario autem humore, refrigerans & humectans.

D. Omnium, quæ recensuisti, remediorum, ut efficacissima, ita & periculosissima sunt cathartica, ex elleboro comparata, nisi aptè præpararetur: profer igitur securum eius præparandi modum, ut citra noxam possit exhiberi?

C. Contunditur primùm elleborus, dein maceratur super cineres calidos in aqua buglossi & rosarum, cum quarta acetì parte, & nucis moschatae momento. Tandem igne lento ferueat, dum liquor omnis sit absumptus.

Quomodo præparetur elleborus.

D. Quibus signis dignosces num pituita cum bile redundans, diuturnitatis Tertianæ febris causa sit?

C. Si phlegmaticus, crudusque humor cum bilioso exuperet, immoderatus præcessit aquæ aut ptisanæ potus, facies subpallida & subtumida cernitur, pedes quibusdam vesperitument, aliæque adsunt cruditatis & imbecillitatis nativi caloris argumenta.

quibus signis dignosce-
tur, an pituita cum bile, sit diuturnæ febris causa.

*D. Qua methodo Tertianam ab hac
causa procreatam curabis?*

Qua me-
thodo
molienda
curatio.

*C. Victus imprimis calfaciens &
exsiccans instituendus.*

Parcissimè bibendum. Pro potu v-
tendum vino tenui & oligophoro,
quod per vrinas promptè secedit.
Rondeletius hanc ptisanam com-
mendat: ℞. hordei mundat. quart.
j. iuiub. passul. mund. cicerum rubr.
ana ℥. j. glycyrrhiz. ℥. ss. fiat decoctio
in aqua ad lb. ij. Colatura transfun-
datur per manicam hypocraticā, cum
℥. iiij. sacchari, & ℥. ij. cinnamomi.

Abstinentum à sorbitionibus & li-
quidis omnibus, imò & ab elixis, si
assis æger vti potest. Hoc enim tenui,
siccante & calfaciente victu, crudus
humor natiui caloris beneficio vel
concoquitur & in alimoniam cedit,
vel attenuatur & insensibili transpi-
ratione effluit, sicque obstructions
soluuntur. Intermissionum etiam
diebus exercendum corpus, vt crudi
succu citiùs concoquantur, & atte-
nuentur.

Interim foueantur hypochondria
hoc fove:

℞. rad. ireos Florent. enulæ, cyp-
ri, calam. odorati, semin. anis. fœnic.
an. ℥. j. fol. betonic. rutæ, hyssop. o-
rigan. absynth. an. M. j. flor. chamæ-
mel. melilot. aneth. stœchad. an. P. j.
duobus sacculis contineantur, qui
bulliant in vino albo, pro fotu hypo-
chondriorum.

A fotu exsiccata illinantur oleo de
absynthio.

Parandum item apozema ad acce-
lerandam crudi humoris concoctio-
nem, ex radicibus aperientibus, rad.
enulæ, foliis absynthij, hyssop. pras-
sij, meliss. artemis. verben. agrimon.
in quo dissoluatur syrupi capill. Ven.
& de hyssopo.

Aliquod subinde catharticum, quod
pituitam & bilem detrahat, præscri-
bendum, solida potius quàm liquida
forma, ne nimius humor imbecilliori
vim inferat, quarto quoque die inter-
missionis exhibendum.

Non priùs hîc balneum vsurpan-
dum, quàm tumores œdematosi dis-
paruerint, redundansque cruda pi-
tuita cocta sit. Tumenim si quid for-
tè aliud obduruit, quod nulla ratione

emolliri, attenuari, & cōcoqui potest, balneū supra positum conducet tepido paulō calidius, citra tamen insignem sudorum profusionem. Prædicta curatio continuata (factis tamen interuallis, ne natura nimium fatigetur,) omnem Tertianam febrem, quæ à vitioso humore orta est, extirpat.

D. Quo pacto curabis Tertianam, quæ à prava iecoris, aut mesenterij, aut alterius visceris affectione, fouetur?

Quæ ratione curanda febris Tertianæ, quæ à prava viscerum affectione fouetur.

C. Hæc febris communia plerūque spernit remedia. Prava enim qualitas, quæ in viscere remanet, humorem nouum quotidie accumulat, qui accessiones fouet. Sic sæpè obseruatum, in multis qui sicco & squalido essent corporis habitu, & omnino biliosi citra tensionem viscerum, & citra humoris copiam, tres, quatuorve menses, calido præsertim anni tempore Tertianam afflixisse.

Hic valida purgantia, valdè aperientia & calfacientia nocent, satiusque refrigerante & humectante victu, & iulepis, apozematis aut syrupis simili facultate præditis, seruatō ta-

meniecoris robore, affectionem pravam demulcere ; & quem colligit humorem, mollientibus clysteribus, & catholico, ac similibus lenientibus, detrahere. Fetus tamen emollientes & roborantes iecori & mesenterio adhiberi possunt. Balnea etiam aquæ dulcis mirificè profunt, quæ calidam & siccam affectionem deculent, & extinguunt, si in ea æger semel intermissionis die consideat, citra sudorum profusionem.

Quod si his remediis, per vnum aut alterum mensem continuatis, febris non cedat, cæli aut loci mutatio, rusticatio, animi oblectatio, & voluptas vndecunque capta, sæpè melius opitulantur. Quamobrem ne diuturno remediorum usu, partium naturalium robur dissoluatur, instituto victu idoneo, maiora remedia intermittenda esse sentio, syrupo hepatico aluum bis terte in mense soluere contentus, dum recreatis naturæ viribus morbus repetita curatione funditus tollatur.

D. *Quid Tertianas adeò longas facit ?*

Quid Ter-
tianas
producit.

C. Interdum pluuiosus aëris status diu perseuerans, quia corpus excrementis frigidis replet, vnde conduplicantur obstructions: quandoque calida & sicca viscerum constitutio, quæ bilem efferat, & prauam quandam affectionem relinquit bili generandæ aptam, quæ materiam nouam quotidie suppeditat, donec praua illa qualitas fuerit extincta.

D. De Tertianâ simplicis tam legitime quàm spuria therapia quidem satis: superest Tertianâ duplex, quo pacto curanda sit, aperi?

Quomo-
do Ter-
tiana du-
plex cu-
randa.

C. Tertianâ duplex, quodd ab eodẽ humore oriatur, à quo Tertianâ simplex, eadem victus ratione, iisdemque omnino remediis curatur. Sed exhibendi cibi, & medicamenti purgantis occasio præceptus est, idèd cum sese offert accipienda. Exempli gratia, si accessio quotidie inuadat hora septima matutina, nec desinat ante mediã noctem, sub finem accessionis reficiendus æger leui cibo, qui facilè coqui & citò distribui queat: quatuor abhinc horis catharticum porrigendum, vt eius actio completa sit, ante-

quàm subsequens paroxysmus recur-
rat. Si enim seriùs exhiberetur, inchoa-
tam vacationem supprimeret.

Quòd si priùs quàm vna desierit ac-
cessio, alterius horror inuadat, sta-
tim à vigore accessionis, cibo aut me-
dicamento locus est. Præstat enim in-
clinâre, quàm incipiente aut vigente,
morbo, alterutrum moliri.

*D. Cur Tertianæ sæpè ex simplici du-
plex, & ex duplici simplex euadit?*

C. Cùm bilis non nisi tertio die satis
in corpore cumulatur, vt naturam
proritet, Tertianæ oritur simplex: vbi
tàm multa deinde coaceruatur, vt na-
turam quotidie stimulet, ex simplici
duplex fit. Si postea bilis ita immi-
nuatur aceruus, vt alternis duntaxat
diebus naturâ prouocet, circuitumq;
moueat, Tertianæ ex duplici simplex
euadit.

*D. Quam fidem adhibes vulgaribus
remedijs, quæ mulieres in primis accessio-
nibus Tertianarum applicare solent carpi?*

C. Hæc, si non profunt, non nocent;
modò caustica non sint.

Huc accedit, quòd vulgi opinionem
explemus, qui pleròsque existimat ad

Cur sim-
plici du-
plex, &
duplici
simplex
Tertianæ
succedat.

Vulgaria
remedia
ad Tertia-
narum cu-
rationem
carpi ad-
hibita.

sanitatem perductos horum remediorum usu, cuiusmodi sunt: Sonchus, plantago, sambucus. Teruntur cum sale & aceto, & carpis alligantur. Sunt qui puluerem fuliginis ex furno, & saluam contusam milceant cum oui albo, & apponunt carpis.

Alij eandem fuliginem cum allijs, capis, albo oui miscent, acetum affundunt, admovent carpis. Radix ranunculi teritur, & alligatur carpis, crediturque sua caliditate humorem morbificum foras trahere.

DE QUARTANARVM

intermittentium Curatione.

D. Unde Quartana intermittens ortus sui causam ducit?

A quo humore Quartana intermittens oritur.

C. Quartana intermittens fit ab humore melancholico in liene, mesenterio & hypochondriis contento putrente.

D. Quotuplex est Quartana?

Quotuplex fit.

C. Cum duplex sit melancholicus humor, vnus frigidus & crassus, veluti sanguinis limus, qui propriè melancholia dicitur; alter calidus multò tenuior, vel ex adusta sanguinis fæce, vel ex flaua bile, vel ex pituita salsa mul-

am bilem admixtam habente contractus, qui propriè atrabilis nuncupatur; duplex Quartana intermittens statuenda est: vna ab humore melancholico frigido, vi ignei caloris torrefacto genita, quæ legitima & exquisita Quartana vocatur; altera ab humore atrabilario, quæ notha & spuria appellatur.

D. Quomodo Quartana legitima distinguitur à spuria?

C. Haud difficulter inter se discernuntur, quia exquisita primò & per se, nulla alia febre antegressa, corripit; eosque potissimum in quibus melancholicus humor redundat.

quo pacto ex-
quisita
Quartana
discernatur à no-
tha.

Notha verò nunquam ab initio, & ex se ipsaprehendit, sed aliis succedit febribus, continuis vel intermittentibus non integrè solutis, quarum causa intus remanens adustione, atræ bilis naturam subit, & putrens subiecta fit Quartanæ materia. Symptomata insuper sæuiora profert, quàm exquisita, sitim maiorem, flauiores vrinas, acriorem caloris æstum, & vehementiorem inquietem, adèd vt ad Tertianæ febris sæuitiam propiùs accedat.

Quinetiam posttridie accessioneis æger se malè habet, nec benè appetit, nec sine grauibus insomniis dormit, sentitque lassitudinem, ob relictæ caloris vestigia.

Ideò spuria Quartana simplex multo facilius in duplicem, triplicem & continuam degenerat, cum morbificus humor iritatur. Sed ut molestior quàm legitima, sic minùs diuturna est.

D. Quæ utrique Quartana sit adhibenda curatio, deinceps expone?

Cur exquisitæ ac spurie curatio diuersa.

C. Cum legitima, atque spuria Quartana, à diuerso humore oriantur; diuersam viuendi rationem, diuersaque, ad causam morbi extirpandam, remedia postulant.

Diuersitas enim causæ, diuersitatem curationis indicat.

D. Quæ in exquisita Quartana victus ratio instituenda?

Quæ in exquisita Quartana victus ratio conueniat.

C. Humor morbificus cum frigidus & crassus sit, calefieri & extenuari desiderat. Itaque in hac febre, calida & extenuante victus ratione opus est. Maior enim indicationis vis ab humore sumitur, quàm à febre, quæ

refrigerari & humectari vult ; quia calor febrilis biduo intermittens, nec impensè vehemens , non tantoperè vrget : humor autem , febris causa, frigiditate & crassitie assiduò vires premit, viscerumque temperiem lædit. Idcirco præcipuum Medici consilium ad causam morbi dirigitur.

Abstineat igitur Quartanâ laborans, à frigidis, crassis & flatulentis cibis, à pane azymo, à carne suilla, bubula, ceruina, leporina, auium palustrium, anatum, à caseo quolibet, nucibus, castaneis, leguminibus, à fructibus crudis, cucumeribus, melonibus, brassicis. Utatur verò carnibus euchymis, quas intingat cōdimentis ex pipere, zingibere, cinnamomo, caryophyllis, vel nucemofchata. Plerique carnes elixas assis, ac sorbitiones solidis epulis præferunt; quia morbificus humor crassus & siccus humido victu dilutus, haud ita solutu difficilis est. Alij carnes assas elixis anteponunt, ac sorbitiones rescindunt, victumque siccum decernunt, vt superuacaneus humor ab-

ſorbeatur. Pro potu utatur vino albo, vel rubro, benè maturo, non craſſo, nec turbido. Si verò ſit abſtemius, hydromelite ex vna parte mellis, & decem aquæ factò, vel aqua cum anifo, fœniculo vel cinnamomo cocta. Victu autem tenui alatur æger, parcèque bibat, quia cruditas huius febris perpetua comes eſt: ni hil autem magis cruditatem auget, quàm cibi præfertim humidi, potùſque copia. Iuſcula medicata conferunt, quibus incoquantur cappares, radices petroſelini, aſparagi, & aliæ incidentes & aperientes, folia bugloſſi, borraginis, hyſſopi, thymi, & ſimilia. Nonnulli acètum, omphacium, aliàque acida prohibent, quia facillimè in humorem melancholicum vertuntur. Alii verò ea commendant, quòd craſſum humorem incidunt, & attenuent. Sunt qui concedunt cape, allia, porrum, ſinapi; verùm, eorum ut & ſalſorum, parciffimus ſit uſus.

Secunda menſa conveniunt pomæ perfectè cocta, anifo aut fœniculo conſperſa, pruna cocta, paſſulæ.

Exacerbationis die nihil sumendum cibi est, nisi ubi febris declinauerit; aut si quid dari corporis necessitas cogit, id sit perexiguum & liquidum.

Qui intermissionis die exhibebitur cibus, subsequentem accessionem quatuor aut sex horas præcedat.

Hilaritas modis omnibus concilietur, iocis, confabulationibus, deambulationibus, quæ non parum profunt ad crudorum concoctionem. Vitetur mœstitia, ut & solitudo, atque ignauia.

D. Sufficitne idonea victus ratio ad huius febris curationem?

C. Nequaquam. Humor quippè morbificus necessariò educendus est: educi autem nequit imparatus & incoctus.

Cur præparantia insuper ac purgamenta requirantur medicamenta.

D. Quo pacto preparabitur & concoquetur?

C. Si calfacientibus, eius frigiditas temperetur; & aperientibus ac incidentibus, crassities attenuetur. Sine qua præparatione, inanis erit humoris crudi & pertinacis, purgantibus pharmacis irritatio.

D. Præparantia hîc usurpanda minutim recense.

Medica-
menta in-
terna hu-
morem
morbifi-
cum præ-
parantia.

C. Ad præparandum humorẽ me-
lancholicum, syrupi capillorum Ve-
neris, de fumaria, de stœchade, de
artemisia, in primis idonei.

Oxymeli simplex & scylliticum æ-
què accommodatum.

Syrupi.
Oxymeli.
Apoze-
mata.

Apozemata dein conueniunt, ex
radicibus enulæ, apij, petrosel. fœ-
nicul. asparag. asari, rubiæ maioris,
corticibus cappar. & fraxini, infusis
in vino albo, ex folijs saluiæ, artemi-
siæ, maioran. organ. calamint. thy-
mi, puleg. absynth. tanaceti, scolop-
pend. chamædryos, chamæpytios,
feminibus anisi, dauci, carui, ameos,
feseleos composita, quibus è præfa-
tis syrupis dissoluatur aliquis.

Vina me-
dicata.

Vina item medicata conficiuntur
longè efficacissima, quale absynthi-
tes, & enulatum, hoc modò paratum:

Catapo-
tia.

℞. vini albi lb. j. rad. enulæ per ta-
leolas sectæ ℥. iiij. cortic. rad. cappar.
℥. j. radic. angelic. ℥. ij. comarum
absynth. vulgar. sicci P. ij. Omnia si-
mul in lagena vitrea per quatrimum
tepido loco maceranda relinque, co-
latum

latum deinde vinum frigido loco recondatur; ac octo abhinc diebus, intermissionis tempore, ad ℥. iij. exhibeatur, manè & vespèri. Deglutitis priùs quatuor pilulis ex hac massa, ut utròque remedio in morbifici humoris concoctione conspirante, breui magnus accedat profectus:

℥. aloës ℥. j. mithridat. ℥. iij. radic. Catapota,
asari, gentianæ, bryoniæ siccæ, ana
℥. ij. aristoloch. rotund. ℥. j. β. myrrhæ, croci, ana. ℥. j. cum syrupo de artemisia fiat massa. Cui chalybis ritè præparati pulvis addi poterit.

Fiunt etiam opiata ex conseruis saluiæ, betonicæ, anthos, violar. borrag. pulvere diamargarit. frigid. cum syrupo capillorum Ven. Opiata;

Si quis in hypochondriis sentiatur renixus, obstructionis index, adhibeatur focus per sacculos ex radic. foliis & seminibus in apozemate commemoratis, additis remollientibus herbis. Externa remedia,
Focus,

A focu pars exiccata illinatur oleo capparum, liliorum, absynthij, chamæmeli, addito ammoniaco, quod in aceto dissolutum fuerit, atque colatum. Liqua;

A a

A litu superponatur hoc empla-
strum :

℞. styracis, benioini, calami aro-
matic. ana \mathfrak{z} . ij. gummi pini \mathfrak{z} . j. β .
ammoniaci in aqua scolopendrij li-
quati & colati \mathfrak{z} . j. rad. ireos in pulue-
rem redactæ \mathfrak{z} . j. malaxentur simul,
addita sufficienti quantitate ceræ, fiat
emplastrum.

Hiscæ remediis internis & externis
præparatus humor, semel aut bis in
hebdomade, purgantibus medica-
mentis detrahendus.

D. Quæ purgantia hîc deligenda?

*Quæ pur-
gantia hîc
conue-
niant.*

C. Purgantia medicamenta per
initia debent esse benigna, qualia sunt
senna, rhabarbarum, cassia, catholi-
cum, &c. quod clementer cum Quar-
tana agendum sit, principio morbi;
quia morbificus humor contumax &
expulsione rebellis, nisi abundè præ-
paratus fuerit, à validis catharticiis
irritatur, & irritatus ferocius exul-
tans, pro simplici duplicem Quarta-
nam profert.

Vbi tamen concoctus fuerit mor-
bus, validiora cathartica conueniunt,
qualia sunt turpetuin, radix ellebori

nigri, confectio hamech, & alia id genus.

D. Quando catharticum in Quartana exhibendum?

C. Nonnulli ipso accessionis die, Quando ex usu sint. quatuor, aut quinque horis, ante horrore catharticum exhibent; quod eo tempore humor turgens & agitatus facilius expellatur. Quorum sententiam alij improbant, duabus de causis: vna, quod in accessione nullum ægri cibandi tempus occurrat opportunum: altera, quod superueniens horror inchoatam vacuationem, magno ægri incommodo intercipiat. Adde quod commotus eo tempore humor, non cathartico, sed emetico forsan è suo foco facilius euellatur; cum ad ventriculum, non ad alium viam affectet. Itaque pridie accessionis commodius atque tutius assumitur pharmacum, vt cibo relinquatur locus, & actio medicamento sit completa, ante subsequens paroxysmi inuasionem.

D. De phlebotomia nullum adhuc verbum fecisti, nonne Quartanariis tibi videtur administranda?

C. Si per initia febris Quartanæ, Quando secunda vena.

556 *N. Ab. Frambesary*
languinis copia venæ turgent, præ-
gressa purgatione celebranda phle-
botomia est.

Repetenda insuper venæ sectio, cum
inualescente calore, metus est, ne lu-
xuriâs in prima corporis regione ca-
cochymia, inde in venas maiores
transferatur, ac Quartanæ succedat
continua febris, aut alius gravis mor-
bus; vel, ne peccans humor in venis &
arteriis lienis incalescens & putref-
cens, inflammationem lienis accer-
sat.

Cur hæ-
morrhoi-
dôn pro-
vocat
suspecta.

Sunt qui venam secant ipso acces-
sionis die, quinque vel sex horis ante-
quam inuadat; Alii verò pridie acces-
sionis id præstant, quia eo tempore
vires sunt vegetiores.

Sunt qui ad humoris melancholici
euacuationem, hæmorrhoidas prouo-
cent. Quod alij non probant; quia ne-
que facile euocari possunt, neque
semper id tutò fit; quòd immodica
plerumque succedat hæmorrhagia,
quam virium languor, & tandem hy-
drops consequitur.

Hæc continuata præfatorum reme-
diorum vicissitudo, febris Quartanæ

causam extirpabit, si diligens adsit perseverantia.

D. Si tamen morbi causa ita contumax & rebellis fuerit, ut his non mitescat, quibus deinceps armis oppugnanda erit?

C. Vomitoriis utendum erit, ut aqua tepida cum oleo mista, succo raphani, mediano iuglâdis arboris cortice arefacto, tritôque ad 3. j. cum iure pingui sumpto. Vulgus asari folia decem contusa, in sero lactis macerat, expressumque hauriendum præbet; aut 3. j. radic. asari in vino albo dissolutam.

Quibus
emericiis
utendum.

Sunt qui vomitoria pilularum potius quam potionis formâ præbent; hac ratione impulsî, quòd Quartanæ causa non in ventriculo resideat, sed in venis lienis aut mesenterii, aut in cysti fellis delitescat: vnde vomitoria potio, quæ sæpè reiicitur, priusquam vim suam exerat, vix quicquam eliciat nisi violentis medicamentis constet, quibus non nisi coacti utimur: Pilulæ verò duabus horis ante horrorem sumptæ, non ante sesqui horam, aut horas duas vomitum cient, tâtôque intervallo in altiores partes vim

suam transmittunt, unde humorem potentiùs eliciunt. Miscent ergo 3. j. asari, cum 3. ß. mithridatii, & cum syrupo violarum formant pilulas. Repetiautem potest semel in hebdomade emeticum, meatibus ad iecur & lienem pertinentibus, priùs per præparantia reseratis.

D. Quando emeticorum usus tibi videtur tempestivus?

Quando
vsurpan-
da sint.

C. Veteres in febre Quartana, melancholia hypochondriaca, aliisque morbis chronicis, vomitum à cibo mouerunt, quod & Neoterici imitandum censent, quia morbificus humor mistus faciliùs expellitur. Adde quòd transuersæ ventriculi fibræ cibo & potu humectante, ruptioni minùs sunt opportuna.

Quia verò eo tempore sumpta vomitoria nihil morbificæ materiæ, quæ non stomacho, sed alibi stabulatur, detrahunt; sed tantùm pituitam & quicquid in ventriculo fluitat; danda potiùs ea duabus horis ante accessionem, aut in ipso accessionis initio, vel fine, quia tunc humor commotus faciliè sequitur.

Quodd si ante haustum emetici, æger sumat pingue aliquod iusculum, minori cum perturbatione & violentia succedet vomitio.

D. Num quid præterea ad pravam humoris qualitatem, contumaciámque domandam, præstandum?

C. Nonnulli aquam stillatitiam ex radic. gentianæ, aristoloch. asari, corticibus capparis & fraxini, theriaca & mithridatio, in vino albo maceratis, per alembicum vitreum eliciunt, eiusque ℥. ij. in accessionis horrore porrigunt, cum ℥. β. syrupi capillaris, ad melancholicum succum frigidum & crassum concoquendum, attenuandum, ægrumque ad purgationem & vomitionem præparandum.

Peculiaris remedia ad contumaciam humoris coëccata.

Sunt qui duabus horis ante accessionem dant theriacæ ℥. i. aut castorii vel myrrhæ ℥. β. cum vini albi ℥. iiij. aut quid simile attenuans, incidens, calfaciens & concoquens.

Alii folia rorismarini, aut saluix in vino albo infundunt, & horrore initio colaturæ ℥. ij. propinant.

Alii frigoris tempore grana s. pipetis integra deglutiunt, mox vini

Aa iiij

560 *N. Ab. Frambesarij*
generosi ꝑ. iij. hauriunt.

Sed magna cautio adhibenda, ne frequentiori eorum remediorum usu, hepar & reliqua viscera, humoresque vrantur. Itaque hæc non nisi frigidis naturis, ac senibus crudiore succo scatentibus, conueniunt.

Topica
ad horro-
rem dis-
cutien-
dum.

In frigidis insuper, humidisque naturis, in quibus nec calida iecoris intemperies, nec renum inflammatio metuitur, instante horrore, ceruix & tota dorsi spina, ad ignem rectò fouetur vino rubro, in quo decocta fuerint folia pulegii, calaminthi, origani, hyssopi, lauri, absynthii, menthæ, saluiæ, rorismarini, & rutæ: ac subinde inungitur oleis calfacientibus, & attenuantibus, nucum, de piperibus, de castoreo, iuniperi, abrotoni, rutæ, saluiæ, rorismarini, cum aqua vitæ. Horrorem enim discutiunt, humorem frigidum concoquunt, & sudores mouent, impediuntque paralysem, quæ interdum Quartanæ superuenit, ob crassos humores netuis impactos.

Ad prohibendum etiam horrorem æger valdè se exerceat, cum paroxys-

mus ingruet; Sic enim remissior multò horror futurus est: vel lectum petat duabus horis, antequàm inuadat accessio.

In horrore verò, sacculi herbis, floribus & seminibus calfacientibus & attenuantibus pleni, in vino rubro feruefacti, hepatis & lienis regioni admoueantur, pedumque plantis lateres calidi vino perfusi, & linteolis conuoluti: ita tamen vt succenso calore tollantur.

Nec omittenda sunt balnea aquæ dulcis, quæ paulò tepidis calidiora esse debent, ita tamen vt copiosum sudorem non eliciant.

Sunt qui vrgente febre, urinas & sudores mouent, & ad id decoctum Gaiaci dilutiùs imperant. Verùm suspectus est illius vsus in omni febre. Vtiliter tamen sudor in fine accessionis excipitur. Imò quò sudor copiosior effluet, eò tardiùs recurrit sequens paroxysmus, & tempore intermedio æger meliùs se habet. Contrà, si non liberè prodeat, velut ex contusione grauitas in membris superest, nec febre prorsus immunis est.

D. *Peculiarem patefecisti legitimam Quartanae curationem : propriam spuriae curam persequere ?*

Remedia
ad Quar-
tanæ no-
thæ cura-
tionem
adhiben-
da.
Viæus
conue-
niens.

C. Spuria Quartana à bile flava re-
torrida suam ducens originem , ean-
dem curationem admittit, atque Ter-
tiana notha , ab atrabilario humore
profecta. Itaque victus non vt in
Quartana à melancholico succo cal-
faciens, sed vt in Tertiana refrigerans
esto, ad ardorem febrilem contempe-
randum. Calidus enim bilem retorri-
dam, addito nouo calore magis ac-
cendit. Sorbitiones igitur exhibean-
tur , ex iure carniū euchymarum,
quibus succus citrii aut arantii admif-
ceatur : eodémque succo condiantur
carnes, quibus aletur æger. Vinum
nonnisi oligophorum, & aqua dilu-
tissimum concedatur. Pomaceum
non quidem dulce , sed benè defæca-
tum conuenit , quia bilem retorri-
dam apprimè humectat. Bibat tamen
æger mediocriter. Nam potus copia
insitum calorem opprimeret. Ace-
tum confert ad præsentis incendii ex-
tinctionem , & appetentiam ex-
citandam. Vitentur salsamenta pi-

perata, & omnia acria. Somnus extra paroxysmum diuturnior iuat.

Interim præparetur & concoquatur humor, iis quæ bilis flauæ ardorem contemperant, & atræ bilis perniciem domant, & obstructions viscerum auferunt, quæ dabuntur hac iulepi vel apozematis formâ :

Medica-
menta in-
terna hu-
morem
in orbifi-
cum præ-
parantia;

℞. aquar. stillatitiarum bugloss. borrag. violar. ana ℥. ij. succi malorum curtipendulorum residentia depurati ℥. iiij. syrupi capill. veneris ℥. iiij. fiat iulepus, pro iiij. dosibus, manè & vesperti sumendis.

Iulepus;

℞. radic. cichor. oxalid. oxylapath. ana ℥. j. cortic. rad. cappar. & tamarisc. polyp. quern. rad. enulæ campan. glycyrrh. passul. mund. an. ℥. β. fol. meliss. agrimon. scolopendr. adiant. an. M. j. absynth. M. β. semin. iiij. frigid. maior. an. ℥. iiij. flor. iiij. cord. an. P. j. fiat decoctio, in colat. lb. ij. dissolue syrupi violat. & syrupi bizantini an. ℥. ij. fiat apozema clarificat. & aromatiz. ℥. iiij. trium, santal. pro iiij. dosibus.

Apoze-
ma;

Aa vj

Purgatio.

Corpore ita præparato, purgatio bis in hebdomade decernenda, pridie accessionis potius quam postridie; ex fol. Oriental. ℥. ss. cum anis. ʒ. j. & rhabarb. ʒ. ii. cum cinnam. ʒ. ss. in eiusdē apozematis decocto separatim infusis, in cuius colatura syrupi de pomis ℥. j. dissoluatur.

Venz sectio.

Sanguis subinde detrahatur è basilica dextra, si iecur febris dederit originem; vel è sinistra, si manifesta tensio in hypochondrio sinistro percipiatur; vel ex utraque, si sanguinis corruptela, & plenitudo postulent.

Vomitio.

Magnoprospectu vomitoria dabuntur, iis quibus iecur & lien in ventriculum se exonerare solent, si nausea accessionum initiis fatiget. Ad ciendam vomitionem exhibeatur pulvis asari ad ʒ. j. dissolutus in vino albo; isque, nisi desierit febris semel in hebdomade repetatur, interiecta præparatione & purgatione.

Si ne sic quidem febris contumax conquiescat, vel ob pravam quandam qualitatem in foco impressam, quæ accessioni materiam suppeditet,

vel propter humorem quempiam valde impactum, quem citra diligentem præparationem reuellere non liceat, hic conferet fots emolliens, attenuans, roborans, vtrique visceri adhibitus, ex radicibus althææ, liliorum, enulæ, cyperi, foliis maluæ, bismaluæ, parietar. absynth. organ. pimpinell. bugloss. borrag. feminibus lini, anis. fœnic. floribus chamæmel. melilot. aneth. & similibus in aqua & vino albo decoctis.

Externæ
remedia.
Forts.

Dein litus ex oleo lilior. rosato, chamæmelino, irino, de absynth. cum gossipio, aut lana succida.

Litus.

Multoque magis balneum aquæ dulcis, in qua emollientia & leniter digerantia fuerint incocta, præsertim in siccis & calidis naturis.

Balneum.

Hoc enim viscerum & bilis atræ siccitatem temperat, feruorem obtrundit, malignitatem domat, dura emollit, purgationis vias reserat & relaxat, & crudos humores concoquit.

Purgato igitur corpore, diebus intermissionis, manè & ante cœnam, æger in balneum descendet, in eoque

desidebit spatio vnus horæ, nulla aut
quàm minima sudorum profusione;
ne detractò sudoribus sero, atræ bilis
crassamentum in visceribus restitet In
ingressu balnei præparantia haurien-
da, inter quæ primas tenet decoctum
è radice enulæ & foliorum absyn-
thij.

Hoc enim omnibus contumacibus
humoribus præparandis aptissimum.

Spuria autem Quartana, si iusta vi-
tæ lex accuratè obseruetur, & accom-
modata remedia diligenter adhibean-
tur, multò citiùs curabitur, quàm ex-
quisita.

D. *Cur Quartana notha breuior esse
solet, quàm legitima?*

Cur
Quartana
notha
breuior,
quàm ex-
quisita.

C. Quia atrabilarius humor, à quo
gignitur, calidus ac tenuis cùm sit, fa-
ciliùs celeriusque discutitur, quàm
succus melâcholicus frigidus & cras-
sus, à quo fit legitima. Adde quòd
Æstate grassetur, quo tempore humo-
res vi caloris attenuantur & per mea-
tus patefactos promptè dissipantur:
Exquisita verò Autumno, quo vigen-
te crassiores humores intus remanent,
meatibus corporis frigore occlusis.

Hinc ratione & experientia edoctus Hippocrates, Æstivas Quartanas magna ex parte breues, Autūnnales verò præsertim quæ Hyemem attingunt, longas esse prodidit, *Aphor. 25. l. 2.*

Absoluta Quartanarum curatione, scire cupio num curabiles tibi videantur omnes?

C. Nequaquam. Quartanarū enim Quartana
salutaris. alia salutaris, alia lethalis.

D. *Quomodo salutare à lethali inter-
nosces?*

C. Si æger iuuenis sit, nec vitiosis vescatur cibis, nec liberaliore potu sitim expleat, sed iustam viuendi legem obseruet, nec Medici præscripta negligat, nec hepatis aut lienis scirrhus laboret, Quartanam audacter salutarem fore prædicam.

D. *Quomodo salutaris Quartana finitur?*

C. Aliàs per insensibilem transpirationem, humore morbifico paulatim digesto, vel intus à calore concocto & absorpto: aliàs manifesta crisi, cum multus humor superest, ob artificiosas euacuationes neglectas. Quæ res
minetur.

D. *Crisis est repentina mutatio, qua nec*

Quartana, nec alij chronici morbi soluntur. Quid igitur per crisin intelligis?

Quid crisi-
fis nomi-
ne hic in-
telliga-
tur.

C. Crisis nomen hîc significat excretionem naturæ robore factam, & symptomatica, quæ vi morbi contingit, distinctam.

D. Quanam sunt manifesta Quartanarum crises?

Quæ
Quartana-
rum
crises.

C. Copiosa sudorum profusio & in singulis accessionibus & extra accessiones: vrinarum crassarum, alias nigrarum, excretio, per aliquot hebdomadas perseverans: nigrorum humorum vomitio, vel initiis accessionum repetens, vel inordinatè etiam extra accessiones prodiens: nigrorum excrementorum deiectio per aluum aliquandiu continuata, quæ omnium optima censenda est, si manifestum alleviamentum afferat.

D. Nonne hamorrhagia cum criticis excretionibus annumeranda?

Cur
Quartana
hæ-
morrhagia
non
soluan-
tur.

C. Minimè. Symptomatica enim est, nec Quartanas unquam solvit. Crassus quippè & frigidus humor per nares euacuari nequit, quia nec ascendit facilè, nec in venas narium retruditur. Cum ergo in Quartanis, è

naribus fluit sanguis, secta basilica, semper cohiberi debet, è qua putris emanat, vt purus è naribus, nullo tamen profectu.

D. Quomodo lethalis perhibetur Quartana?

C. Cum ex simplici sit duplex, atque triplex, ac tandem in continuam transit, vel exitiosum aliquem morbum accersit, vt scirrhum, & à scirrho hydropem, pleuritidem, epilepsiam, cancrum. Quod contingit iis qui conuenientem victus rationem, & vacuationes necessarias prætermittunt, humore exusto, vel in maiores venas translato, vel hepatis aut lienis substantiæ penitus impacto, vel ab hepate vel liene in thoracem transmissio, vel in cerebrum, vel in cutem excusso.

*Quartana
lethalis.*

*DE QVOTIDIANARVM
intermittentium Curatione.*

D. Quotuplex est Quotidiana febris?

C. Quæ quotidie corripit febris, vna est, cuius materia similis ei, quæ tertio vel quarto quoque die accessiones facit, sed adeò multa vt sufficiat quotidianis exacerbationibus. Vnde

*Quotuplex febris
quotidie
intermittens.*

Quæ pro-
priè Quo-
tidiana
dicatur.

Tertiana duplex, aut Quartana triplex nuncupatur, quæ iisdem ideò remedijs, similiter vsurpatis, atque simplex curatur. Altera verè Quotidiana dicitur, ex pituita putrescente genita, quæ omnium febrium rarissima est.

D. Quis in Quotidiana febre victus est instituendus?

Quem vi-
ctum exi-
gat.

C. Præscribatur victus incidens, attenuans & aperiens, vt crassus humor incidatur & attenuetur, obstructionesque aperiantur, accommodatus potius ad febris causam, quàm ad febrem, quia ab ipsa causa grauius periculum imminet.

Æger cibus vtatur euchymis, pro potu vino tenui, tam albo, quàm rubro in pastu, extra pastum hydromelite.

D. Quid prætereà ad perficiendam Quartana curationem præstandum?

Quo pa-
cto eius
perficia-
tur cura.
No.

C. Præparanda pituita apozemate, è decocto ꝑ. radic. aperientium in vino albo maceratarum, folior. maioranæ, saluiæ, organ. calamint. pulgij, hyssopi, absynthij, florum anthos, stœchad. & syrupo bizantino, & capillor. Veneris comparato.

Præparata verò phlegmagogis pharmacis, vt agarico, zalapo, diaphænico, diacarthamo, purganda est.

Quodd si vrinæ rubescant, aliique adsint mittendi sanguinis scopi, secanda vena est.

Interim roborandus est ventriculus, qui in hac febre grauer affligitur, tam intrò sumptis, quàm extra admotis.

Quæ remedia ad robur ventriculi adhibenda.

Ex conseruis florum stœchad. roris-
marin. & saluiæ, cortice citrij con-
dito, & puluere aromatic. rosat. cum
syrupo de mentha parabitur opiata,
qua vtatur mane.

Interna.

Nonnunquàm duabus horis ante
accessionem, 3. j. theriacæ vel mi-
thridatij dabitur cum vino albo.

Extrinsècùs adhibebitur fots cum
sacculis plenis radicibus, herbis & se-
minibus calfacientibus & discutienti-
bus, in aqua & vino albo decoctis.

Externa.

Et à fotu litus ex oleo mastichino,
rosarum, cydoniorum, myrtill. de ab-
synthio, de mentha, & pulueribus
cyperi, nucis moschatae, carophyll.
cinnamomi.

Tandem admouebitur scutum ex

cerato Gal. stomachico, mastiche, galanga, cinnamomo, pipere, cum oleo de absynthio subactis.

DE ERRATICARVM februm Curatione.

Transitus
à Typicis
febris,
ad Erra-
ticas.

D. *Intermittentes febres, quæ stasis periodis simili typo redeunt, omnes sunt explanata: supersunt Erratica, quæ nullum statuum tempus, nec ullum accessionis & remissionis ordinem seruant. Abditam earum causam aperi?*

Erratica-
rum fe-
brum
causa.

C. Februm incerto tempore recurrentium causa, est humor diuersi generis, in variis infimi ventris partibus putrescens, isque magna ex parte melancholicus, atrabilariusve, & pituitosus.

D. *Quinam Erraticis febribus maxime obnoxij?*

Quos ma-
ximè cor-
ripiant.

C. Qui crapulæ indulgent, falsisque ac piperatis eduliis humores torrent, aut frigide potu & fructuum usu, crudorum humorum copiam congerunt.

Quæ re-
media
hic con-
ueniant.

D. *Quæ remedia ad harum februm curationem adhibenda?*

C. Eadem remedia his conueniunt, quæ febri Quartanæ, aut Tertianæ

nothæ, alterantia scilicet & purgantia vicissim repetita, vt primarum venarum obstructions tollantur, adcoque morbi sentina prorsus exhauriatur. Quinetiam phlebotomia, si plethora adsit. Sed earum febrium maturanda curatio.

D. Cur adeò præcepta earum therapia esse debet?

C. Quia degenerant in Quartanã, si Autumnus proximus sit; vel in Tertianam, si Ver, aut Æstas immincat. Interdum & in Continuum, humore è primis corporis sedibus in venas maiores translato.

Cur citissimè adhibenda sint.

D. Quòd si præparantibus, purgantibus, & vena sectione, opportunè adhibitis, non cedant, quid præterea moliendum?

C. Balneum tunc vsurpandum, quod duntaxat erit tepidum, si humor ad bilis retorridæ naturam accedat; paulò verò calidius, & cum maioris perfusione, si pituitæ & sæculentæ melancholiæ particeps est.

Quale balneũ hinc ex vsu sit.

D. Sed unde oritur febris illa, quæ plures dies perseverat, totidem deinde intermittit, ac incerto nihilominus tempore recurrit?

Quomo-
do Errati-
ca pluriū
dierum
contin-
gat.

C. Si febris duos, tres, quatuorve dies exerceat, ac postea plures dies intermittens nullis certis circuitibus, eodem modo repetat, primæ sentinæ sedes è visceribus est; è quibus tamen portio in venas maiores irrepens ac putrescens, febrem fouet, dum discussa sit, ac tandem similis è foco in venas rursus effusa, reciduum affectum proferat.

D. Quomodo hæc plurium dierum febris Erratica curatur?

Quibus
remediis
curetur.

C. Eadem postulat remedia, quæ illa Erratica, cuius accessio vnum dumtaxat diem durat; nisi quod venæ sectionem magis requirat, vt detrahatur humor, qui è prima regione in maiores venas irrepsit.



DISPUTATIO III.

DE PESTILENTIVM

Febrium curatione.

DOCTOR III.



ΙΣΣΑ' ἔθνεα πυρετῶν, duo februm
genera statuuntur ab Hippocrate:

ἓ μὲν κοινὸς ἅπασιν, καλεόμενος λοι-
μὸς, unum ab aëre vitiatō, omni-

bis eum pariter haurientibus commune,
quod Pestis appellatur; ὁ δὲ διὰ πνιγμῶ
διαίταν ἰδῆναι τοῖσι πνιγμῶς διατεταμένοις
ζηόμενος, alterum à prava victus ratione,
qua privatim unusquisque utitur, geni-
tum. Singula huius generis species Græcis
σποράδες, id est sparsim grassantes dictæ,
quod singulos separatim corripiant, huc us-
que sunt expositæ. Pestilens febris superest,
omnium perniciosissima. Quibus notis à
cæteris distinguatur, aperi?

Februm
genera ab
Hippo-
crate tra-
dita, lib.
de flatu-
bus.

Transitus
à febribus
sporadi-
cis ad Pe-
stilentem.

CANDIDATUS.

Pestilens à cæteris febribus discre-
pat, quod contagiosa sit, atque mali-

Qui di-
stingui-
tur ab aliis.

gna, populariter in obuios quosque nullo delectu sæuiens, bubone & carbunculo aut exanthematis se prodens; nisi fortè deuicta natura, ipso morbi initio succumbat, aliorum denique Epidemiorum morborum perniciem superans.

D. Pestilentis febris causas minuitim explica?

Pestilen-
tis febris
causæ.

C. Pestilens febris oritur ab aëre corrupto & venenato, qui sine sēsu intra corpus per os & nares spirādo, & per corporis porostrāspirādo se insinuat. Huius corruptelæ & venenidux sunt causæ; vna superior, interior altera. Causa superior est maligna qualitas cælitus in aërem demissa, quæ quasi furibunda passim inuolat in vulgus. Ut plurimum, ex temporum tempestatūque inordinatis exuperantiis procedens, quæ aërem alterat & labefactat. Causa verò inferior, vapor est, & halitus putris, è terræ visceribus ortus, aut ex aquis lutulentis & desidentibus haustus, aut ex infectis paludibus, lacubus, antris, specubus, speluncis, latrinis, animantium cadaueribus, aut excrementis, aut aliis rebus grauco-

graucolentibus contractus, quia aërem inquinat & inficit.

D. Quot sunt Pestilentium febrium differentia?

C. Pestilentium febrium alia simplex, alia putridæ coniuncta. Illa spiritibus primò insidet, dein ad humores solidamque corporis substantiam progreditur. Siquidem pestilentiae semina aëri inspersa, inspiratione perspirationeque intrò subeuntia, cor primùm inuadunt, inde arteriarum spiritus, postremò humores corpūsque vniuersum labefactant.

Pestilentium febrium differentia,

D. Quibus notis Pestilens febris simplex dignoscitur?

C. Cùm Pestilens febris simplex est & solitaria, citra putridam; pulsus toto morbi decursu inconstans, inæqualis & inordinatus est, ob naturæ & veneni duellum, ac modò huius, modò illius in alterius perniciem agentis dominium: nunc obscurus, parvus, languidus & intercidens percipitur, cùm venenum cor conculcat ac comprimit; nunc plenior, validior, firmior, frequentior & celerior, cùm cordis robur alimento aut medica-

quibus notis distinguatur Pestilens febris simplex.

mento cardiaco vegetius factum, in venenum insurgit, illudque superare & propellere nititur. Vires omnes corporis, sed præcipuè vitales statim concidunt, quia cor membrorum validissimum & nobilissimum oblæditur. Frequens animi defectio, ac interdum syncope territat, urget nausea, & cardiogmos; quia ventriculus affecto cordi consentit.

Inquies, corporis iactatio, vigiliæ molestæ, mors plerùmque inopinata, & sine doloris sensu obrepit.

Si fortè validior natura diutiùs obstitit, labes interim altiùs permanat in humores, eosque contaminat, febrémque infert carbunculo, vel bubone, vel exanthematis, stipatam.

Quanquam autem humores veneno ferè labefactantur, non tamen semper putrescunt; unde sæpè nec turbidæ, nec confusæ spectantur urinae; sed substantia, colore, sedimentoque laudabiles. Nec magnum adest incendium, nec sitis vehemens, adcoque mitis calor febrilis sentitur, ut ægrotans interdum se febricitare perneget.

Hæc autem febris Pestilens simplex esse solet, cum populariter grassante Pestilentia, venenata pernicies in corpus, nec plethoricum, nec cacochymum, sed purum & bene habitum inuadit.

D. Quibus notis Pestilens febris putridæ implicita decernitur?

C. Cum Pestilens febris solitaria Pestilens putridæ coniuncta; non est, sed putridæ permixta, commemoratis signis accedunt grauis capitis dolor & in somnum propensio, deinde delirium, spiratio difficilis & graueolens, sitis inexhausta, deiecta appetentia, assidua vomitio, interiorum æstus vehemens, & extremorum frigus, vrina cruda, turbida ac fœtida, fœda & graueolens alui proluuies, ac plurima epigenemata, quæ pro varia corporis humorumque constitutione alia alios exercent. Hæc enim constitutionis varietas, causa est cur vix duos vsquam videas eadem contagione inquinatos similibus premi symptomatis. Pestilens febris putridæ implicita sæpè incidit in corpus, quod iam vel plethoricum, vel cacochymum, vel obstructum est. Vnde mixta

signa edit. Siquidem aliàs aliam partem magis laceſſens , varia præfert ſymptomata , quæ non ex peſtilenti labe, ſed ex putrida permiſſione fiunt.

D. Quibus notis prænoſces num febris Peſtilens ſalutaris, an lethalis futura ſit?

Salutaria
febris
Peſtilen-
tis ſigna.

C. Vbi aliquis Peſte correptus eſt, ſi noctu dormit , ſi cibum concupiſcit, ſi facilè ſpirat, ſi febris non vehemens eſt, ſi tumor peſtilens craſſus & latus, coloréque ruber, vel citrinus exiſtit, longèque abeſt à corde, ſcire licet hæc ſecundæ valetudinis futuræ indicia eſſe.

Lethalia
ſigna.

At cùm vehementes vomitus vi-
reſcentes vel nigricantes accidunt,
frequens animi deliquium , defectus
& fœtor anhelitus, hydropiſis ſubita,
ſudor frigidus & fœtidus circa caput
& collum, cibi faſtidium, febris vehemens & qui diu durat , carbunculus
niger & ſiccus, bubo prædurus à ſup-
puratione alienus, aut qui intus retra-
hitur, horrenda facies , aſpectus incô-
ſtans & incertus, vox rauca, balbuties,
pulsus formicans, vrina turbida, fœti-
da , nigra , alui excrementa liquida,
pinguia & graueolentia ſunt. Hæc

mortifera signa sunt. Siquidem mortem in propinquo esse denuntiant.

D. Quot in simplicis puraque Pestilentis febris curatione proponuntur scopi?

C. In simplici, legitimâque febre Pestilenti curanda, tres præcipui proponuntur scopi: primus, ut aura venenata cordi inserta excutiat: secundus, ut calida intemperies corrigatur: tertius, ut spiritus labefactati, dissipati que purificentur, recreentur, ac reficiantur; humorumque corruptela rescindatur. Interim danda enixè opera ut Pestilentium tuberculorum virus quàm citissimè extrahatur.

Quot curationis scopi.

D. Hanc febris purae Pestilentis curanda methodum ratione & autoritate confirmas?

C. Galenus, lib. 2. th. meth. exactam curandi methodum instituens, à prima indicatione auspicandum esse monet, hinc ad eam quæ deinceps sequitur transeundum, inde ad eam quæ proxima est, & ita continuandum, donec ad finem peruentum sit. Primam autem indicationem à causa petendam esse, his verbis innuit:

Ordo indicationum curandi rationem constituendum.

Vnde sumitur indicatio.
1.

In omnibus omninò morbis, in qui-

bus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est, *cap. 4. l. 4.*

At efficiens Pestilentis febris causa, est maligna & perniciofa labes vnà cum aëre, quem inspiramus, hausta.

Idem Galenus in *Aph. 19. l. 5.* Illa priùs curanda esse docet, quæ magis vrgent, hoc est quæ maius periculum afferunt.

At venenata labes, quæ intus turgens & oberrans omnia peruertit & deuaſtat, magis vrget, & maius periculum adfert, ſi negligatur.

Ergo indicatio quæ ab ea ducitur, primas tenet :

1. Secunda indicatio ſumitur à calore præter naturam in ſpiritibus & humoribus accenſo & cordi moleſto; non ardoris quidem vehementiâ, ſed pernicioſa malignitate, qua ſtatim iugulat. Sublata quippè cauſa, ad morbum ab ea excitatum, veniendum eſt,

eodem Galeno auctore, *c. 69. artis med.*

2. Tertia depromitur ab infectis venenata qualitate ſpiritibus & humoribus, qui veneni ſedes & vehicula habentur.

Particularis insuper curandi indicatio, à tuberculis erumpentibus, characteristicis Pestilentiae symptomatis petitur.

D. Quibus armis pestifera lues expellitur.

C. Alexipharmacis quæ specifica vi & occulta proprietate cor, aliasque principes intimasque partes propugnant & roborant, ut ad ignobiles & extimas venenum amendant atque propellant, sudoresque cient; ut per eosdem meatus, per quos intus illarum est virus, foras eliciatur & extrahatur.

Quibus
medica-
mentis
Pestifera
lues ex-
pellatur.

D. Sed multi statim initio febris Pestilentis in sudorum promotionem incumbendum esse negant, quod sudores in acutis morbis ab Hippocrate damnati sint, præterquam cum sponte diebus criticis ex universo corpore promanant: quod arte si provocentur, nimium resiccato excalfactoque corpore, omnia febris symptomata ingrauescant, viresque dissipatis spiritibus fatiscant: quod natura; cuius utiles progressus Medicus imitari debet, humores noxios primum concoquat, dein à puris & alendo corpori idoneis secernat, ut eostandem alius

Obie-
ctio.

profluuiio, vel sudoribus excernat : quòd denique vacuatio omnis spontanea, quæ morbi initio contigit, symptomatica & inutilis sit : quia furore quodam, violentoque morbi impetu & humoris orgasmo, non natura vittricis robore excitatur.

Atque his ex causis humor noxius prorsus crudus, & utili succo confusus atque permistus, natura imitatione sit prius arte coquendus, quàm vacuandus : aliòqui præpostera curatione natura rectè agens, ab officio auocaretur & interturbaretur, agerque in vita discrimen conijceretur.

Respon-
so.

C. Respondeo: Verissima quidem & rationi consentanea esse hæc omnia, sed quæ in febribus ab humoris putredine profectis locum duntaxat habent, non autem in Pestilentibus ac venenatis morbis, in quibus ferè omnibus orgasmum agnoscere cogimur. Per initia enim febrium Pestilentium nondum in humoribus corruptela inest; at statim initio venenata labes vnà cum spiritu hausta eiusmodi est, vt, si finitur, breui naturam opprimat & expugnet. Sudores igitur per initia statim promouere expedit, quibus cum venenata illa pernicies in vapo-

ribus & ichoribus residens expiret,
& in tenues auras dissipata prorsus
evanescat. Adde, quòd naturæ motus,
qui statim morbi huius initio è centro
ad peripheriam, intùsque foras fit,
sudorum eruptionem perutilem esse
doceat.

Quòd autem obijciunt calorem,
omniáque reliqua febris symptomata
sudoris profusione exasperari, id qui-
dem in aliis febribus verum est: at
verò nequaquam in Pestilenti, nisi vel
calidiore pharmaco prouocetur, vel
diutiùs excipiatur. Nam cùm Anti-
doto ægrotantis naturæ accommo-
dato blandè elicitur; quia venenatam
morbi perniciem, quæ totius mali
auctor est, è corde foras euocat, se-
cúmque rapit: multò maior est quæ
hinc accedit commoditas, quàm
quod proponunt incommodum.
Vita semel cum morte commutata,
nulla arte restitui potest; morbi verò
malignitate ac venenata pernicie
(quæ vel sola repentiè iugulare solet.)
vel Antidoto extincta, vel cum sudo-
ribus profusa, quod proponunt dis-
pendium facilè sarciri queat. Quòd?

verò aiunt concocta medicanda esse, non cruda, nostram hanc sententiam minimè conuellit: neque enim crassa & lenta corporis excrementa, quæ coctione indigent, antequàm vacuari possint, sudoribus euacuare studemus; sed serosa duntaxat, & turgentes ichores, quos citra coctionem purgare iubet Hippocrates, vnâque cum his malignam & venenatam morbi qualitatem, quæ vix vllam coctionem, vt neque aliud vllum veneni genus admittet. Serosis enim excrementis & vaporibus crassioribus, qui venenatæ ac pestilentis qualitatis sedes sunt, sudoribus resolutis, vnâ cum his venenatam peniciem exspirare, Pestisque vim horum profusione frangi ac hebescere necesse est.

D. Præstantiora Alexipharmaca sigillatim recense.

*Simplicia
Alexi
pharmaca
Pesti
propel-
lendæ di-
cata.*

C. Alexiteria propellendæ Pesti propria sunt, angelica, valeriana, gentiana, inula, scabiosa, tormentilla, pimpinella, zedoaria, aristolochia, dictamnus, carduus benedictus, oxalis agrestis, succisa, ruta, malum citrium, granatum, bolus Armena, os cordis

ceruini, scobs eboris, lapis Bezoardicus, & alia id genus simplicia, ex quibus multa componuntur Antidota longè efficacissima.

D. Unum aut alterum Antidotum ex his simplicibus confectum, exempli gratia prescribere :

C. ℞. radicū angelicæ veræ.

tormentillæ,

valerianæ,

inulæ,

gentianæ,

zedoariæ,

pimpinellæ,

dictami Cretensis,

glebæ Armeniæ, ana ℥. ij.

foliorū scabiolæ,

rutæ,

oxalidis sylvestris cum semine, an. M. ij.

citrea mala per taleolas secta n. iiij.

noces virides n. vj.

baccarū iuniperi,

scobis ebor. ana ℥. iiij.

Hæc omnia simul in lb. x. aquæ oxalidis agrestis macerentur per 24. horas, tum destillentur per vas æneū.

B. vj

1.
Antidotū
aduersus
Pestem.

In stillatio liquore adiciantur

cinnamomi,

gingiberis,

nucis moschatæ,

caryophyllorum leniter contritorum, ana ℥.ß.

Rursus destillentur per alembicum vitreum in balneo marino, aut super cineres calidos positum.

Dosis huius aquæ est ab ℥. iiij. ad ℥. vj.

Aliud Antidotum paratu facilius.

℥. radicum angelicæ,

valerianæ,

tormentillæ,

zedoariæ,

gentianæ,

dictami Cretensis,

boli Armen. ana ℥.j.

feminum citrei mali,

oxalidis sylvestris, ana ʒ.ij.

margaritarum,

scobis eboris,

santal. rub.

cinnamomi, ana ℥.ß.

Singula tenuissime trita miscéantur.

Datur hic puluis à ʒ. j. ad ʒ. iiij. cum
aqua scabiosæ, vel cardui benedicti,
vel melissophylli, aut cum conferua
rosarum, vel buglossi, aut cum syrupo
de limonibus, vel de granatis, aut cum
vino albo.

Duo insuper celebrantur aduersus 3. 4.
Pestem, omnéque veneni genus Anti-
dota, Theriaca & Mithridatium.

Alterũtrum datur à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ʒ.
cum iisdem aquis stillatitiis, vel con-
feruis, vel syrupis.

Sed ad Pestem extirpandam multò
efficacius erit Antidotum, si cum pul-
ueribus Alexipharmacis misceatur
hoc modo:

℞. theriacæ veteris, vel mithridatii 3.

ʒ. ʒ.

radicum angelicæ,

gentianæ,

glebæ Armeniæ, ana ʒ. j.

feminis citrei mali,

scobis eboris,

sacchari rosati, ana ʒ. j.

Datur à ʒ. j. ad ʒ. ij. cum vino albo,
aut aqua scabiosæ, aut cardui benedi-
cti.

D. Multiplex Antidotum expellende Pesti aptissimum descripsisti, sed tempus eius usum à te expecto.

Tempe-
rius An-
tidoti
usus.

*C. Simul ac Pestilenti feбри corripi-
tur homo, in lecto collocetur, mor-
bique initio, antequam venenum al-
tiores in corpore radices egerit, Anti-
dotum assumat bis in die matutinâ, ac
vesperinâ horâ, longè à pastu, ac
subinde trium horarum spatio (si vi-
res valent) rectè tectus sudorem è to-
to corpore manantem perferat, postea
pluribus linteis calidiusculis fœdus
sudor extergeatur. His ita confectis in
duobus vel tribus diebus venenum
eiicietur.*

Obie-
ctio.

*D. At ipso statim febris initio, vix
discernere poterit Medicus quantum-
vis peritus, an Pestilens sit, necne?*

Respon-
sio.

*C. Nihil refert. Sufficit ut explora-
tum habeat, ægrotantem Pestilenti
constitutione febricitare. Quod ex-
pulsu facilè percipiet. Cum enim
Pestilenti cæli statu febris aliqua in-
vadit, eam statim publicæ malignita-
tis esse participem arbitrari debet,
quam protinùs iustis Antidotis op-
pugnare multò sit satiùs, quàm expe-*

etare, dum salute deplorata, certis & indubitatis notis pestilentiae vim, impetumque prodat. Satis exploratum est pestifera aëris constitutione nullas ferè nisi pestilentes febres populariter grassari; aut si fortè per initia nihil pestilentiae resipiat morbus aliquis, in eam tamen communi aëris vitio & contagione celeriter degenerare. Adde in peracuto hoc morbo semel ereptam curandi occasionem, in vitae discrimen ægrotum ocysimè adducere. Præstat igitur primo statim die remedia vsurpare necessaria, quàm protrahere dum insertum intus in cor venenum omnia præsidia aspernetur. Si qua fortè febris minimè Pestilens post deprehendetur, non modò nihil nocuerit exhibitum alexipharmacum, sed etiam ad edomandam eius perniciem, naturæ vim confirmandam, arcendâque publicam aëris malignitatem mirè contulerit. Morborum minimè Pestilentium initiis & incrementis tutò adhiberi posse quæ supra recensui alexipharmaca, perinde atque ad Pestis præcautionem certum est, paucis exceptis, quæ

præ calore, quo pollent maximo, internis inflammationibus & febribus ardentibus noxia esse possunt. Prima igitur luce, cum primum anceps periculosusque morbus inuadit, stomacho cibis vacuo, è descriptis Antidotis quæ cormuniunt, conceptamque intra viscera contagionem depellunt & discutunt, aliquod minus calidum vorare, & aliquandiu in cubiculo deambulare oportet, dein in cubili ad excipiendos sudores sese componere, cauendo diligenter ne quid externi aëris intromittatur ante triduum.

D. Primum curationis scopum attigisti, in venenata Pestis qualitate Alexiterijs hydroticis depellēda: nunc quo pacto calida intemperies contemperanda, spirituumque dissipatorum iactura resarcienda sit, aperi.

Quod reliqua duo curationis capitula, una vietus ratione obineantur.

C. Ad utrāque metam peruenitur idonea victus ratione, quæ eucratis comparatur alimentis, quibus cum cardiaca quædam admiscantur medicamenta; quia utrūque ἐνδεκτικὸν ab aëris malignitate profectum est.

D. Promulga victus legem in legitima febre Pestilenti religiosè observandam, sum ad pristinam temperiem restituerem.

dam, tūm ad instaurandos spiritus exhaustos ?

C. Contagiosa febre correptus statim in conclaue se subducatur nitidum ac tepidum, æstuoso, rigidoue vento perflante vndique clausum; in quo aër, cuius inspiratione viuit, nec calidior sit, ne vires nimio perire fatiscant; nec frigidior, ne corporis meatus, quibus perspirare venenatam perniciem expedit, occludantur; sed temperatus atque purus.

Quo pacto sit instituenda, ad vtrumque finem confectum.

Si frigidior fuerit atque impurus, igni perpetuo collucens, atque suffitibus emendabitur & expurgabitur, retris halitibus & sæcum expirationibus absumptis.

Si nimium incaluerit, contemperabitur idoneis herbis virentibus oxycrato imbutis, per cubiculum sparsis; ac linteis oxycrato, aut aqua rosarum maceratis, loco peristromatum conclavi obtensis; magna tamen cautione adhibita, ne quod naturæ impetu in cutim expellitur emigratque foras, refrigerantium vsu introrsum repercutiatur, in ægri perniciem. Sic enim bubones, carbunculi & exanthemata

erumpentia, celeriter intro repulsa, exitium afferunt. Quoniam verò calor præter naturam in corde accensus, & ex eo in omne corpus effusus, non ut in aliis febribus, sic in Pestilenti legitima, maximè vrget; sed maligna quædam ac venenata labes spiritibus ac serosis excrementis insidens, cordi, que inserta, calori insito plurimum infensa deprehenditur, citra insignem caloris ac siccitatis excessum, victus ratio initiò decernenda calore temperata; quæ ut analogæ & affinis, innatum calorem veneno laceffitum, ac iam penè succumbentem, erigat ac recreet, simulque assiduam spirituum dissipationem resarciat: nec quæ humectet, sed contra quæ exiccet mediocriter, & noxios corporis ichores, qui venenatam labem facilè vel admittunt, vel alliciunt, exsorbeat. Et hæc quidem in genere de aëris, cibi & potus qualitate.

Quod ad victus quantitatem spectat, plenior in hac, quàm in aliis febribus esse debet: quia vires non solum maximo studio tuendæ ac retinendæ; sed etiam, quoad fieri potest,

roborandæ & augendæ; maximè verò vitalis, cui venenata ac pestilens pernicies peculiariter infesta est.

D. Quid? Morbis acutis tenuem victum deberi perhibet Hippocrates, ex quorum genere cum sit febris Pestilens, ut quæ reliquas omnes vehementia & celeritate prævalens superet, parcissimum & tenuissimum victum requirere verisimile est.

Obiectio.

C. Hæc Hippocratis de tenui victu sententia, non intelligitur de Pestilentibus, venenatisque morbis, in quibus protinus dissipatur spiritus, naturæque robur infringitur. Vult enim Hippocrates in morbis acutis considerandum esse, an æger cum instituto victu ad futurum usque vigorem peruenire possit: quod si prius eius vires deficiant, quam statum attingat, quamlibet acutus morbus sit, copiosiore alimento instaurandum esse; neque unquam committendum, ut eius penuria faciscant.

Responsio.

Quod idem ipse insinuat libris Epidemion, ubi testatum reliquit, constitutione quadam maligna, eos duntaxat euasisse, qui multum cibi sumpsisserent. Nec dubitavit Galenum cibum

in accessionibus febrium porrigere, si quāddò ægris animum morbi vis ademisset, vnde vel syncope obreperet, vel eius incuteretur metus: quæ sæpissimè incidunt in Peste. Nulla quippe quamlibet eximia antidotus exhaustos spiritus celerius refarcit, caloremque ingenitum magis erigit & corroborat, quàm optima victus ratio, opportuno tempore præscripta, ætatis, consuetudinis, temporis, regionis, & peculiaris cuiusque naturæ habita ratione.

Neque verò metuendum ne moderato cibo à morbi coctione auocetur natura, cùm præsertim quæcūque Peste correptis offerentur cibaria, non minùs alexiteria, quàm alimenta sint, coctūque adeò facilia, vt nō modo insitum calorem non onerent, verum etiam mirè augeant ac corroborarent. Nemini dubium est alimenti benignitate venenatæ causæ malignitatem mitigari, labascentemque naturæ vim erigi, eius denique facultates & dissipatos spiritus instaurari.

Cibandi
sempus.

Toto itaque morbi decursu paulò copiosiore, quàm in alijs febribus

alimeno, eoque euchymo, eupepto
& cardiaco vires confirmandæ sunt,
quicquid obganniant nonnulli.

Videndum tamen ne cibi copiosio-
ris sarcina, calor, qui iam languidus
est, opprimatur. Quod periculum de-
clinatur, si sæpè cibus offeratur, sed
semel modicus. & modus.

Sæpè quidem, vt morbi malignitas
temperetur, & naturæ vires erigan-
tur, reficiaturque spiritus, quorum
maxima fit in hoc affectu dissipatio.

Semel modicus, vt à calore langu-
diore facîle confici possit.

*D. Specialem deinceps victus rationem
minutius explana?*

C. Cibus esto ex carnibus assis aut
elixis, quibus ad condimentum acce-
dat omphacium, acetum, mali Medi-
ci aut punici, oxalidis, aut oxyacanthæ
succus, cui pauillum aquæ rosacæ,
aut aquæ cardiacæ adiiciatur. Acidis
enim hisce succis & destillatis cardia-
cis, cibi fastidium excutitur, assi em-
pyreuma temperatur, humoris feruor
obtunditur, putredo inhibetur, &
pestilens pernicies infringitur.

Sed melancholici & pituitosi, qui

Specia-
lior escu-
lentorum
descrip-
tio.

frigido succo referti sunt; & quicumque ventriculum languidiorem nacti sunt, citra sacchari & cinnamomi, aut pulveris cardiaci adiectionem, acidis minimè utantur, ne flatibus aut cruditatibus præcordia illis distendantur.

Viçtus mediocriter siccans vera Peste perculsis ex usu est; cùm nec siti, nec incendio interno vexantur.

Hæc quidem viçtus ratio convenit incipiente morbo, cùm valent vires, necdum deieçta est appetentia.

At cùm iam illæ elanguescunt, vrget cibi fastidium, vixque solidioribus assumitur, tum consumpta ex laudatis & optimè elixatis carnibus; gelatina, ex assis expressa; carnis aqua, aliæque eius generis substitui debent, quemadmodum & instaurans destillatum. Crebróque alimentum, sed exiguum semel offerendum, ut perpetuæ spirituum dissipationi occurratur.

D. Describe formulam consumpti in Pestilenti febre convenientis?

Quomodo in febre Pestilenti parari debeat Consumptum.

C. Capus & vitulinæ, atque etiam, si voles, veruecinæ carnis frustulum in aqua fontana coquuntur, dum conta-

bescant, cum 3. ij. scobis cornu ceruini nodulo comprehensæ. Adduntur sub finem oxalis, buglossum, borrago, pimpinella & calendula. Expressus liquor à pinguedine perpurgatus frigido loco reponitur. Dosis, tres, quatuor, quinque sexque vnciæ cum sextante omphacii, aut succi mali citrij.

D. Exhibe formulam Gelatinæ Pestiferæ lue correptis accommodata.

C. Capus & vitulinæ carnis frustum Gelatinæ
coquantur in aquis cardiacis dum contabescant, adiecto sub finem coctionis, vini albi quadrante : decoctum ab omni sorde & pinguedine perpurgatum cum triente sacchari colo sæpiùs traiicietur, adiectis ouorum albuminibus, in spumam longa agitatione versis, inferetur & cinnamomi 3. j. ß. cum croci & terræ sigillatæ momento item inter colandum, aceti & aqua rosar. tantillum, quò & palato magis arrideat, & putredini aduersetur magis, tempereturque reliquorum calor.

Glaciatum ius hoc modo paratum, singulari ope Pestilenti febre oppressis subuenit. Nam facilè coqui-

tur, & promptissimè collabentes naturæ vires instaurat, dissipatos spiritus resarcit, & Pestilentis veneni perniciem domat.

D. Expressi formulam persequere.

Expres-
sum.

C. Capus mediocriter assus torculari subiicitur, succusque exprimitur, qui languescenti pro cibo sit. Sed ante usum in paropside aliquantum feruescat, rosacea & mali citrij aut punici succo, aut omphacio adiecto.

D. Aquæ carnis extrahenda modum adde.

Aqua car-
nis.

C. Capus pelle spoliatus, & exenteratus minutissimè concidatur, ossibus abiectis. Carnis vitulinæ frustum similiter conciditur. Ampulla vitrea concluduntur: nodulus adijcitur, qui continet eboris, cornu cerui, terræ sigillatæ, boli Armenæ, ana ʒ. j. aquarum buglossi, borrag. cardui benedicti, morsus diaboli, scabiosæ & rosarum ana ʒ. j. aut ʒ. ij. ad summum, misceatur. Ampulla obsignata in duplici vase ponitur (balneum Mariæ vocant) in quo horis decem ferueat. Expressus liquor asservatur.

Vfus

Vfus tempore, quatuor, sex, octo ve cochlearia, cum omphacij aut mali citrii momento, fumantur ex interuallis, aut cum pauxillo fyrupi è limonibus.

D. Prescribe formulam destillati instaurantis.

C. ℞. decocti capi cum buglosso, borrag. oxalide, portulaca, pimpinella & endiua lb. iiij. aquarum stillat. cardui benedict. scabiosi. meliss. calendul. & rosarum, ana ℥. iiij. conseruæ flor. violar. bugloss. borrag. betonicae, coronariae, cichor. & rosarum ana ℥. ij. theriacæ & mithridat. ana ℥. j. β. scobis cornu ceruini & eboris ana ℥. β. radic. tunic. & tormentill. dictam. sem. cardui benedict. citrij mali & oxalid. ana ℥. ij.

Destilla-
tum in-
staurans.

Eliciatu aqua in duplici vase. Cui vsus tempore sacchari albi ℥. j. cinnam. ℥. β. succi mali citrij, aut syrapi de limon. ℥. β. adiciantur. Nonnulli pulueris auri ʒ. j. simul inferunt. Hoc destillatum instaurans singulare est aduersus omnem malignam febrem, quæ cum virium infirmitate coniuncta est, præsidium naturæ vires resi-

ciens, venenatamque perniciem ob-
terens.

Cum agrotans præ violentia mor-
bi, omne solidioris alimenti genus
respuet, liquida hæc alimenta cibi vi-
cem supplebunt.

*D. Ac de cibo quidem satis, ad potum
transeamus?*

Potulen-
torū de-
scriptio.

C. Potus esto vinum album, vel
giluum, odorum, benè defæcatum,
benèque maturum. Hoc enim lan-
guidioris naturæ vires, disiectosque
spiritus mirificè recreat atque repa-
rat, & optimum Pestilentis veneni
antidotum existit, simplici Peste per-
cussus nunquam denegandum; si nec
siti, nec ardore insigni fatigat: sed
diluatur pro consuetudine aqua fon-
tana, quæ cum rasura cornu cerui
ferbuerit, vel aqua cardui. Extra
pastus, si sitis premit, vino postha-
bito, vel hydro-saccharum, vel hy-
dro-meli studiosè paratum vsurpa-
bitur.

Quomo-
do in Pe-
stilenti
febre pa-
rari de-
beat hy-
dro-sac-
charum.

*D. Prescribe formulam hydro-sacchari
in Pestilenti febre conuenientis.*

C. ℞. aquæ fontanæ lb. iiij. saccha-
ri optimi ℥. vj. scobis cornu ceruini

℥. ij. ferueant aliquandiu igne remisso, in olla noua terrea vitro illita. Igne summotis adde aquarum buglossi, cardui & succisæ ana ℥. iiij. Colo omnia traiciantur, succi mali citrij ℥. ij. & cinnam. ℥. j. adiectis.

D. Exhibe formulam hydromelitis in Pestilenti huc accommodati?

C. ℥. aquæ fontanæ lb. iiij. mellis Hydromeli. optimi ℥. iiij. bulliant igne remisso in olla noua ad tertiæ partis consumptionem, atque accuratè despumentur. Igne summotis ubi refrixerint, quatuor aquarum cardiacarum ana lb. β. inferetur, vnà cum aceti & succi mali citrij, ana ℥. j. β. & cinnamomi ℥. j. colo transfusum hydromeli in vsum reponetur.

D. Cum maligna & occulta perniciēs vnà cum inspirato aëre intromissa, statim temperiem peruertat, spiritus & ichores corporis inficiat, dein crassiores humores corrumpat; nōne ut venenata aura excutienda, calida intemperiei emendanda, instaurandaque spirituum exhaustorum iactura protinùs enitendum, sic rescindenda humorum corruptela incumbendum, simul ac erumpunt in cute tubercula, quæ

certa sunt corruptela sanguinis argu-
menta?

Quando
sanguinis
missio &
purgatio
ex usu
sint.

C. Extracto alexipharmacis venco-
no, restituta temperie, recreatisque
spiritibus cardiaca victus ratione, de-
relicta humorum corruptela sangui-
nis missione & purgatione, procul
dubio emendanda est. Sed neutrum reme-
dium est usurpandum, nisi quinquies
saltem aut sexies hausto ad virus exi-
mendum Antidoto. Satius profecto
fuerit utrumque ad declinationem
vsque differre, & solis Antidotis &
euchymis alimentis initio, incremen-
to & vigore morbi pugnare. Nec
enim secunda vena, nec alius cathar-
tico ducenda, antequam recreatis vi-
ribus, venenata qualitas ex pulsu An-
tidotis deuicta iudicetur, ac tubercu-
la si inerint, vel discussa, vel ad suppu-
rationem deducta pure diffuant.
Quod vix ante septimum diem acci-
dit.

D. Sed cur præter aliorum Medicorum
consuetudinem, phlebotomiam & cathar-
sim Pestilentis febris initio prohibes?

Cur neu-
tra mor-
bi initio
decernē-
da.

C. Vtrumque remedium morb-
principio nedum inutile, sed noxiun

esse contendo, firmis rationibus fultus: vna, quòd morbi initio venenum in spiritibus duntaxat, nondum in humoribus consistat, vt vrina laudabilis nullam putredinis notam exhibens perspicuè indicat: altera, quòd Medicus eò ducere debeat, quòd natura vergit, per loca commoda. Itaque cum naturæ Pestis causam à se amoliri conantis motus intus, foras fiat dum è corporis centro ad peripheriam, vt potè è partibus principibus ad ignobiles, imbutos veneno atque inquinatos humores, vnàque cum iis venenum ipsum propellit: quorsum attinet statim curationis initio, sanguinis missione & catharticis motus in corpore ciere, naturæ contrarios, & salutarem eius impetum intercipere?

Si venenatam bubonum, carbunculorum & exanthematôn in febre Pestilenti erumpentium materiam natura intus foras abigit, quo se grauant pondere releuet, cur purgatione aut venæ sectione ea introrsum reuelletur? vtràque igitur morbi initio adhibita naturam ab officio abstrahit, venenatos prætereà humores cum pu-

ris & nondum contaminatis permittet, atque confundit. Vtiles insuper spiritus dissolvit, virésque prostermit, in quarum robore præcipuus curationis cardo versatur.

D. Quomodo Pestilentes tumores curandi sunt?

Quomodo
do cha-
racteristi-
ca Pesti-
lentiæ
sympto-
mata cu-
randa sint.

C. Ad carbunculos, bubonésque Pestilentes curandos, ante omnia extrahendum venenit, adhibitis cucurbitulis cum profundis scarificationibus scapelló, vel nouacula factis, aut medicamentis causticis tumori impositis; quale est, quod ex cantharidibus, calce viua, chalcitide, sale ammoniaco, cum fermento veteri & oleo nucum mixtis, constat. Aperto tumori superimponenda medicamenta sunt, quæ simul & suppurent & attrahant. Quale parabitur ex radicibus althææ, liliorum, iridis, tormentillæ, cæpis, ficubus, ammoniaco, bdellio, galbano, stercore columbino, fermento veteri, & axungia suilla.

Folia oxalidis inter cineres calidos cocta, addito butyro, item conueniunt.

Aperiunt & attrahunt virus simul

capa & folia rutæ, cum theriaca, lin-
teo inuoluta, & inter cineres calidos
cocta, & calido tumori superimpo-
sita.

Item scabiosa trita, vt & lysima-
chia.

Vlcus deinceps detergentibus me-
dicamentis expurgandum.

Expurgatam sarcoticis carne im-
plendum, ac epuloticis tandem cica-
trice regendum.

*D. Adhuc pura legitimaque Pestilentis
febris curationem tradidisti; notha, qua
Putrida implicita est, curatio superest, qua
methodo instituenda sit explana?*

C. Contrariæ curandi indicationes Qua me-
thodo cu-
randa Pe-
stilentis
febris no-
tha. concurrunt in Pestilenti febre notha;
quia & putris humor kenoticis vacua-
ri, & venenum alexiteriis profligari
postulat. Vtrâque maximè vrget, illa
caloris excessu & incendio; hæc occul-
ta malignitate, venenataque pernicie.
Vtrique igitur primo quoque tempo-
re occurrendum, sed alternis vicibus.

Ac summopere cauendum ne alte-
ri duntaxat intenti, alterius omninò
obliuiscamur: verùm vtriusque me-
mores, quoad licet vtrâque miscea-

608 . N. Ab. Frambesarij
mus, vt monet Galenus lib. 7. *Methodi
meth.*

Vena statim initio tundenda, dum vires adhuc constanti ne calor è luxuriantis sanguinis putredine genitus, viscera vrens, insitum breui vel suffocet vel dissipet.

Antidota deinceps manè & vesperi sumenda, quæ cordi labescenti opitulentur, quibus diebus nulla tentatur vacuatio.

Interponenda vicissim apozemata cardiacis permista, ad putridos humores præparandos, ac tandem cathartica alexiteriis temperata.

Victus ratio interim longè aliter atque in simplici febre Pestilenti discernenda.

D. Quo pacto in Pestilenti notha sit administranda phlebotomia clariùs explicata?

Quomodo hic ad-
ministranda phle-
botomia.

C. In febre Pestilenti putridæ implicita, quæ & in pulsu & in vrinis certas putredinis notas exhibet, vnde capitis dolor, vigilæ assiduæ, iactationes, sitis, lingua torrefacta, molestæ arteriarum pulsationes, ingens præcordiorum æstus, aliæque symptoma-

ta ab humorum feruore & putredine profecta, valdè infesta sunt; si venæ turgeant, sanguis mitti debet, plùs minùs; vt fert vasorum plenitudo, ætas, anni tempus, & symptomaton sæuitia. Sed ea cautione tamen, vires vt valeant, & morbi initio ducatur, idque multò quàm in aliis febribus parcius; è pede quidem, si bubo protuberat in inguine, aliàve parte infra lumbos sita; è brachio verò si in axillis, aliisve partibus quæ renes superant, idque semper ex eodem latere, vt rectitudinis fibrarum ratio habeatur. Si nec bubo, nec carbunculus inerit, basilica sinistra pertundetur potius quàm dextra: nisi autem ingens plenitudo insit, sanguis quoniam naturæ thesaurus & caloris natiui pabulum existit, vix vltra nouem uncias detrahendus est. Semper enim in peste, infra subsistere satius est, quàm vltra procedere, ne vires ad morbi perniciem edomandum necessariae fatiscant. Cùm inflammatio subest, copiosè quidem, sed partitè, ducendus, si casus postulat.

D. Quæ antidota his exhibenda?

Cc v

Quæ an-
tidota
sint vsur-
panda.

C. Eligendâ sunt antidota ægro-
tantis naturæ accommodata, quæ
blanda sudoris euocatione, venena-
tam auram è corde extrahunt.

*D. Quanam apozemata putridorum
humorum præparationi hîc conueniunt?*

Quæ apo-
zemata
hîc in-
terponē-
da.

C. Quæ citra insignem calefactio-
nem incidunt, attenuant & aperiunt,
hîc requiruntur, quia parabuntur ex
radicibus cichorii, graminis, oxalidis,
polypodii, tormentillæ; foliis bu-
glossi, borraginis, agrimonix, adianti,
scolopendrii, calendulæ, succisæ, ver-
benæ, pimpinellæ; seminibus anisi,
fœniculi, citrii & atractylidis; flori-
bus cordialibus, passulis damascenis,
in aquis stillatitiis cardui benedicti &
scabiosæ decoctis, in quibus syrupi de
limonibus & violatus dissoluantur.

*D. Cùm propinandi cathartici occasio
incidit, quòdnam hic eligendum?*

Quæ ca-
thartica
hic elige-
da.

C. Benignum esse debet, ac cardia-
co temperatum, ne quam perturba-
tionem in corpore concitet, idque
liquida, vel solida consistentia.

D. Eius formulam aliquot exëplis illustra.

C. ℞. aquar. stillat. cardui bene-
dicti & scabiosæ an. ℥. ij. in quibus

infunde per noctem rhabarb. elect.
 ʒ. j. β. cinnam. ʒ. j. in expressione
 dissolue catholici ʒ. β. syrupi rosar.
 pallid. & syrupi delimon. an. ʒ. vj.
 theriac. scobis cornu cerui, & mar-
 garit. el. an. ʒ. j. fiat potus, manè ex-
 hibendus. ℥. cassiæ recenter extract.
 ʒ. j. rháb. el. ʒ. j. mithridat. ʒ. β. fiat
 bolus, cum syrupo violato sumendus.

D. Quæ victus ratio hîc decernenda?

C. In pestilenti febre notha, quæ
 putredini implicita est, quia calor ex
 putredine genitus, interna vrens ve-
 hementer vrget; mediocriter refrige-
 rante victus lege restringui postulat,
 non tamen multum humectante, ne
 putredinis augeatur materia, sed pau-
 lulum ficcante potius, vel humore
 & siccitate temperata. Quicumque
 siti & incendio interno iactantur per
 febrem Pestilentem, elixis pullis &
 carnis vitulinæ & veruecinæ iusculis,
 & ovis sorbilibus vtantur. Sed elixa
 omnia commodè præparantur ex
 aqua fontana, cui adiecta sit tertia
 pars aquæ atractylidis. Sub finem
 coctionis inserantur radices dictami
 & tormentillæ, & nodulus qui cornu

Quæ vi-
 ctus ratio
 hîc de-
 cernenda.

ceruini & eboris scobem contineat, & folia succisæ, buglossi, borraginis, oxalidis, pimpinellæ, calendulæ, vua acida, lupulorum & asparagorum cauliculi, cum petroselini radice. Quippè diureticis veneni portio vnà cum Vrinis exigitur. Si hæc in manu non sunt, sorbitioni adijciatur omphacii, succi oxalidis, aut mali citrii, aut punici pauxillum. Quæ sic elixatæ carnes, ex iisq̃ue sorbitiones, in calidis & siccis naturis, assis præferentur. Satis enim alimenti corpori præstant, & humorum ardorem melius temperant, simulque calidam & siccam viscerum intemperiem emendant. Denique venenatam Pestilentis causæ vim obtundunt, ac putredinem arcent. Pro acetariis vsurpabuntur cappares, qui vim salis prorsus deposuerint, idque ex aceto rosato, vel ex eo quod cum floribus betonicæ altilis præparatur, malū citriū, arantiū, punicum. In febre Pestilenti putridæ implicita, in qua vrgent calor, sitis, dolor, præsertim si feruentissimus æstus est, vel natura ægrotantis biliosa, in totum vino interdicendum est. Si ta-

men necessitas interdum eo vti cogat, oligophorum eligatur, idque liberaliter diluatur. Pomaceum, si generosum sit, benèque maturum, tutò conceditur: at quod vel non satis defæcatum, vel nondum benè maturum, vel vetustate subacidum euasit, noxiū putandum est. Pyraceum & cereuisia minùs conueniunt. Pisana vulgaris multò præstantior.

D. Quomodo characteristicis Pestilentia symptomatibus opitulandum?

C. Dum remedia ad febrem Pestilentem, eiùsque causam radicitùs extirpandam adhibentur, bubo si protuberat, vel carbunculus, statim scalpello vel pyrotico aperiendus, ut virus exhalet, dein materia crassior relictà, ad suppurationem perducenda, ut veneni reliquiae cum pure effluant.

Quomodo Pestilentibus tuberculis opitulandum.



DISPUTATIO IV.

DE SYMPTOMATVM

Febrem comitantium curatione.

DOCTOR IV.

Symptoma-
mata Fe-
brem co-
mitantia,
quibus
propria
curatio
adhiben-
da, tripli-
ci genere
compre-
hensa.

LICET curatio non symptomatibus, sed morbo à quo ducunt originem debeat: nonnulla tamen tam graviter agros exercent, ut ad se Medici sollicitudinem convertant; quibus ita succurrendum est, ut interim non negligatur Febris, à qua procedunt. Quotuplicia sint aperi?

CANDIDATUS.

E' tribus symptomatum generibus; non pauca Febrem comitantia, ob sui vehementiam, curationem ad se trahunt.

D. Ea sigillatim recense.

Quæ pri-
mi gene-
ris sunt;

C. E' functionum læsionibus animalium; Paraphrosyne, Agrypnia, Sopor, Cephalalgia, Surditas, Gustus deprauatus, & Inquies: Vitalium; Syncope, Dyspnœa; & Tussis: Na-

turalium ; Deglutiendi difficultas, Anorexia, Boulimus, Sitis, Singultus, & Lumborum dolor, propriam curationem postulant. Exametria pariter excretorum, Hæmorrhagia, Sudor, Nausea, Vomitus & Alui fluxus; vt & retentorum, Alui adstrictio: E' corporis item qualitatibus immutatis, Rigor, Horror, Frigus, & Æstus, peculiarem therapiam exposcunt.

Quæ secundis;

Quæ tertijs.

DE PARAPHROSYNE.

D. Quam Delirio curationem adhibendam esse censet?

C. Οὐδενὸς συμπτώματος ἡ θεραπεία γίνεται πρῶτως, ἀλλ' αὐτὴ τῆς ἐργαζομένης αὐτὸ διαδίδουσι, Symptomatis nullius curatio primùm fit, sed perpetuò affectus symptoma ipsum facientis, auctore Galeno Com. 2. in 6. Epid. Ad sedandum igitur Delirium (quod παρουσία Græci vocant) diathesi eius effectrici detrahendæ diligenter incumbendum. In Paraphrosyne cerebrum non primariò, (vt in Phrenitide,) sed secundariò afficitur; interdum solo calore per continuitatem partium ad caput ascendente; sæpius verò vapore acri & feruido, qui

Qua ratione Delirii curatur.

Quibus ex causis susciuitur.

Quibus
signis di-
gnosca-
tur.

inordinatè spiritum animale exag-
tans, & cerebri temperiem oblædens,
actiones animales peruertit. Quin &
immodicæ vigiliæ, nimia cerebri ex-
siccatione, eius temperamentum vi-
tiantes, Delirium accersunt. Quod
præpostera ratiocinatione, & obuer-
satione visorum, quæ aut non sunt, aut
aliter subsistunt, manifestè se prodit.
Adde quòd æger importunè præter
consuetudinem obloquitur, ac inso-
lenter petulans, nullam in gestu mo-
destiam exhibet. Eius imminentis si-
gna sunt, profluuium alui biliosum
suppressum, & vrinæ quæ priùs valdè
tinctæ erant & flammæ, nunc sunt
aquosæ & tenues, quod contingit ra-
ptu bilis quæ vrinas tinxerat ad cere-
brum.

Quid
porten-
dat.

Παραπρεσβύον maiorem incutit ter-
rorem, quàm periculum iniicit, quia
nullo vitæ discrimine sæpiùs accidit;
& præterito morbo, aut accessionis
vigore, vt plurimùm, conquiescit; imò
cum humor feruidus à quo excitatur
defertur, profundus ferè sopor obre-
pit. Remediis tamen refrigerantibus
& repellentibus, tùm intro sumptis,

Quibus
auxiliis
sedetur.

tum extra admotis est anteuertenda. Nonnulli repellentium loco animalcula recens per tergum incisa & intestinis mundata capiti admovent, ut calore suo tepido cerebri feruorem contemperent, & vapores in cerebrum sublatos dissoluendo absumant. Profunt insuper frictiones artuum, multoque magis dolorificæ ligaturæ, quia vapores à capite auertunt. Alius remollientibus enematis, blandisque catharticis subducenda. Phlebotomia nequaquam administranda, quia morbi vigor adest, in quo nihil molendum: Cucurbitulæ tamen cum scarificatione ad reuulsionem, scapulis admo-ueri possunt. Conciliandus somnus; ut natura, somno & quiete roborata, humores & vapores, delirii causas, per sudores euacuet. Nutriendus æger alimentis refrigerantibus & humectantibus. Interdicendus vini usus. Assidentes imprimis caueant, ne irascendi occasionem ægro adferant, sed omnia illi cōcedant. Neque enim audiendi, qui eos duriter tractari imperant.

DE AGRYPNIA.

Cur
Agrypniæ
protinus
occurrere
aui.

D. Agrypnia febricitantibus valde infesta, cui promptè succurrendum est, quia vigiliæ si diutius perseuerent, spiritus exhauriunt, viresque prosternunt, quin etiam spasmodum & paraphrosynen accersunt, ut testatur Hippocrates, Aph. 18. l. 7. Quæ ratione peruigiliis opitulandum esse putas?

Quibus
subsidiis
conciliandus
somnus.

C. Si vigiliæ immodicæ fiant à calore febrili cerebrum calfaciente & exsiccante, id refrigerandum & humidificandum. Quod molimur tum extrinsecus admotis, tum assumptis auxiliis. Admouentur olea violarum, rosarum, nymphææ, papaueris: aqua lactucæ, solani, vmbilici veneris, vnguentum populeum, ex quibus fiunt litus, frontalia, & epithemata. Imperantur lotiones pedum, ex decocto lactucæ, salicis, vitis, solani, hyoscyami, capiti papaueris, florum nymphææ, violariæ, rosarum. Intrò sumuntur syrupus papauerinus, diacodium, aqua rosarum, lactucæ, ex quibus fiunt portiones hypnoticæ. Interdum vti cogimur narcoticis ad conciliandum somnum, ut opio, nepenthe; magna cau-

tione adhibita, ne lethargum inducant, & mentem offendant. Si vigilie à siti inexhausta, aut inquiete, aut dolore proueniant, hæc symptomata propriis remediis sunt compescenda.

DE SOPORE.

D. Satis de vigilijs, nunc de Somno. Quotuplex Somnus.
Quotuplex Somnus per febres accidit?

C. Triplex: Alius quippe naturalis est, qualis censetur, qui in declinatione accessionis, aut totius febris contingit, manifestè ægrum iuuans: alius non naturalis, qualis est qui paroxysmorum initiis contingit, quia teste Galeno in *Aph. 7. l. 2.* accessio-
Qui naturalis habetur.
 nem longiorem facit, humorem febris causam per initia foras effundi incipientem, intrò retrahens, saltem retinens; ac ægro grauitatem atque laborem eò tempore adfert, præ copia vaporum crassorum ab humore viscido, calore febrili succenso, effusorum; qui in caput elati, in frigidiorum humorem, motus & sensus organa replentem, conuertuntur: Alius
Qui præter naturam, Soporis nomen sortitus.
 omninò præter naturam existit, qui Sopor appellatur, à quo febricitantes excitari nequeunt; & in quem, si exci-

quomodo
contin-
gat, &
quando.

tentur, subinde recidunt; estque aliàs
lethargicus, aliàs Caroticus, aliàs
Comatosus. Hæc sæpè contingit, cum
nimio perè refrigeràtia & narcotica, ad
somnia conciliandù, deliria sedàda, &
dolorè capitis leniendum, inconsideratè
fuerunt extrinsecùs capiti admo-
ta, vel intrò sumpta. His enim cerebrũ
stupefcit, & animalis spiritus cõcrescit
& coagulatur, inde redditur ineptus
ad sensum & motũ edendũ. Licet idè
aliàs vi febris accidat vaporibus scili-
cet acribus qui deliriũ fecerāt, aliqua
ex parte in cerebro concretis & in
aquam conuersis. Nam cum feruet
humor, quicquid tenuius est, discuti-
tur, remanente crassamento, à quo
cerebrum deinde grauatur, vnde
reprimitur quidem delirium, sed gra-
uis & profundus sopor eius loco
exoritur. Quinetiam febres quædam
sunt soporiferæ natura sua, vt eæ in
quibus multa pituita viscida in visce-
ribus collecta est, quæ à febrili calore
fusa, cerebrum ingenti crassorum
vaporum copia replet; quales inter-
dum febres quotidianæ intermitten-
tes, aut tertianæ nothæ.

D. Sopore correpti profectò debent excitari, ne profundus somnus diuturnior calorem nativum tandem opprimat; quibus artibus eos excitabis?

C. Excitantur violentis corporis agitationibus; duris frictionibus; conuulsionibus pilorum capitis, menti, pubis; altis inclamationibus, enematis acribus ex decocto pulegij, origani, calaminti, maioranæ, in quo dissoluuntur hiera diacolo kynthidos, benedicta laxat. oleum rutaceum, sal gemmæ; vt iritetur natura torpēs, & reuellantur humores & vapores ad caput repentes. Ad eundem affectum pilulæ aureæ, cocceæ, & quæ colocynthidem recipiunt, in aqua vitæ aut in vino dissolutæ per os exhibentur; inungitur palatum mithridatio, sinapi & aliis id genus; Adhibentur ceruici cucurbitulæ, cute priùs leuiter per nouaculam aperta; Instillatur in oculos acetum, oimphacium, succus limonum; Inijcitur in nares pulvis ellebori, vt commoueatur cerebrum, & commotum calefiat, & contenta in eo pituita colliquetur; Assa fœtida insuper naribus subijcitur odoranda,

Quomodo Soporē obrutū sint excitandi.

vel galbanum admouetur: Capiti raso inspergitur pulvis Zingiberis, nucis moschatæ, pyrethri, vel euphorbij; Superadditur emplastrum ex pice nigra, terebinthina, ammoniaco, sulphure & pulvere sinapi in aqua vitæ macerato, subactis omnibus cum oleo nucis moschatæ, & ceræ sufficienti quantitate. Quod si affectus sit contumacior, applicatur capiti sinapism⁹, ex semine sinapi & ficubus confectus, ut è profundo capitis ad superficiem humor euocetur. Nonnulli à sinapismo ad medicamentum rubificans, progrediuntur; quod fit ex pulpa ficuum, semine sinapi & vrticæ, atque cantharidibus, ad emplastri formam.

DE CEPHALALGIA.

D. Capitis dolor symptoma est omnium ferè februm comes. Quibus ex causis excitetur aperi?

Quibus
ex causis
oriatur
capitis
dolor.

C. Dolor capitis, qui ratione febris accidit, à vaporibus sursum ad cerebrū per venas, arterias, & cæca quædā spiracula elatis fit. Prodeunt autem hi vapores ab humore (qui febrē facit) ebulliente, vel in prima, vel in secunda corporis regione. Interdum & ab ex-

crementis retentis in intestinis, ut ijs accidit febricitantibus, quibus alius adstricta est.

D. Quotuplex est ille dolor?

Quotuplex sit.
A quo humore fiat.

C. Quadruplex: Pungens quippè sentitur, vel distendens; aut grauens, vel pulsans.

Pungens fit à bile acri membranas cerebri exquisito sensu præditas feriente.

Pungens.

Distendens à vaporis aut humoris copia internas vel externas cerebri membranas diuellente.

Distendens.

Grauens ab humore pituitoso. Grauantem verò capitis dolorem somnus comitatur, ut distendentem & pungentem vigiliæ.

Grauens.

Pulsatius à solis vaporibus in arterias penetrantibus, eas magis, quàm pro naturali consuetudine dilatantibus, inducitur.

Pulsans.

In febribus autem intermittentibus, accessione sedata interdum post aliquot horas capitis dolor perseverat: quia scilicet vapor, aut humor eius causa, tardius & difficilius resoluitur & discutitur in capite, ob cranij densitatem, quàm ille qui per habitum

Cur finita febris intermittentium accessione, perseveret capitis dolor.

corporis effusus est, ob cutis raritatem. Si capitis dolor non urget vehementius, nec somnum impedit, nulla eget cura; quia sublata febre, statim evanescit. At vehementior curationem ad se trahit, cum vel vires frangit; vel Paraphrosynen, tractis ad caput humeribus, accersit.

D. Quibus remedijs sedatur?

Quibus
subsidijs
sedetur,

C. Compescitur Cephalalgia, tum ijs quæ vapores & humores ad cerebrum ascendentes deriuant, tum ijs quæ refrigerant & fluentem ad cerebrum humorem repellunt. Deriuatur & reuocatur humor & vapor, qui ad cerebrum ascendit, purgationibus blandis, clysteribus emollientibus, refrigerantibus & leuiter detergentibus, venæ primùm cephalicæ, dein earum, quæ sunt in temporibus sectione, cucurbitularum applicatione ceruici & scapulis; ligaturis extremarum partium, & blanda totius corporis infernè descendendo, frictione. Repellitur verò humor & vapor ad cerebrum ruens, ac cerebri ardor vnà corrigitur, refrigerantibus & repellentibus capiti admotis, quorum non aliud

aliud oxyrrhodino frequentius; id est
aceto, cui oleum rosatum mistum est;
cum quo etiam aqua rosarum misceri
solet, atque plantaginis, necnon &
betonicae. Quòd si oxyrrhodino non
subleuetur ille dolor, cataplasma è
mica panis albi, croco, pulvere beto-
nicae, & oleo rosato confectum, synci-
piti, fronti & temporibus applicatur.
Quòd si his nondum sedetur dolor,
adduntur vehementius refrigerantia,
vt oleum nymphaeae, papaueris, man-
dragorae, vnguentum populeum. In-
terdum extrema necessitas cogit nos
confugere ad narcotica, vt ad opium,
cuius \mathfrak{z} .j. dissoluitur in olei rosati \mathfrak{z} .j.
Interdum Philonij Rom. aut pilula-
rum è cynoglossò \mathfrak{z} . β . intrò sumitur.
Sed Nepenthe tutius exhibetur ad \mathfrak{z} .
 β . Satiùs tamen fuerit narcoticorum
loco, blandioribus hypnoticis intrò
sumptis dolorem capitis demulcere;
vt syrupis è papauere, è nymphaea,
diacodio, in aqua, vel decocto lactucae
dissolutis, hordeatis, & amygdalatis,
in quibus semen papaueris albi adje-
ctum sit, & similibus.

DE SURDITATE.

D. Surditas febricitanti non rarò superuenit. Eius causam ostende, ac subinde curationem persequere?

Surdita-
tis causa.

C. Surditatis causa in febribus continuis, vapor est à bilioso humore sursum in caput irrepens, qui animale spiritum impuriorem, & ad audiendum prorsus ineptum, reddit. Ex bile enim surditatem contingere testatur Hippocrates Aphor. 28. l. 4. Quibus biliosæ exeunt deiectiones, eæ superueniente surditate sistuntur; & quibus surditas adest, biliosorum deiectione

Curatio.

finitur. Ad subleuationem huius symptomatis, euacuandus biliosus humor in prima & secunda corporis regione contentus. Euacuatur autem per infusionem rhej, in aqua cichorij, aut foliorum Orientalium, in decocto refrigerate & humectante. Quòd si surditas à vaporib⁹ è copiosiori sanguine elatis contingat, vt simplici synocho accidit, phlebotomia è basilica dextrâ erit administranda.

Quibus
auxiliis
auriū do-
lor leniē-
dus sit.

D. Si aurium dolor comitetur, quibus subsidij demulcendus est?

C. Aurium dolor leniendus erit, per

sacculos cōparatos ex seminibus lini, fœniculi, radicibus althææ, liliorum, folij maluæ, bismaluæ, parietariæ, floribus chamæmeli, meliloti, anethi, præbullitis in lacte.

DE GUSTU DEPRAVATO.

D. Gustus sapè per febres ita depravatur, ut perperam de saporibus iudicet. Symptomatis huius causam & curationem expone?

C. Lingua, cui gustandi vis insidet, in febribus præsertim continuis, vitioso aliquo vapore, vel humore bilioso, vel pituitoso, aut alio corrupto imbuitur, cuius saporem æger à cibo & potu inductum esse putet. Ille autem corruptus humor, vel in solo linguæ corpore consistit, (non omninò tunc prostrata est appetētia;) vel etiam ventriculi tunicas occupat, (in appetentia tunc adest.) Si manente ciborum orexi, solus gustus offensus est, solius etiam linguæ & palati vitium est, quod frequenti lotione per aquam omphacio mistam, & deterfione per gargarismum ex decocto hordei, & melle rosato, cum tantillo aceti confectum, curatur. At si anorexia con-

Quomodo gustus depravatur.

Quibus remediis curetur,

iuncta est, ventriculus & in eo contenti humores accusandi, híque idonea purgatione, eáque repetita, sunt euacuandi.

D. Nihil æquè gustum labefaciat, atque lingua scabrities, nigrities & fissura. Cur per febres sic afficiatur lingua, & quomodo sit illi opitulandum, luculenter explana?

Quibus
ex causis
linguæ
asperitas,
nigredo
& fissuræ
contin-
gant.

C. Hæc symptomata fiunt à fuliginosis vaporibus è toto corpore in spongiosam linguæ carnem elatis, & in ea inhærentibus. Vt enim fuligo ex accensis lignis sursum elata, in externa camini superficie inhæret, ibique crassescit; sic etiam fuliginosi vapores ex ebullientibus extra vel intra venas humoribus excitati, in linguam & fauces sublati, vbi iam non habent quò vltius progrediantur, in spongiosa lingua cōsistunt, eamque nigrefaciunt, exsiccant, exasperant, & ob suam acrimoniam, eius continuitatem solvunt. Interdum etiam pituita è cerebro in os decumbens, aut è ventriculo sursum in os per œsophagum ascendens, vbi febrilis calor vi inrasatur & indurefcit, linguam, palatum, fauces, dentésque, lentore, veluti glu-

tine, obducit, & summam deglutendi difficultatem infert. Siccitas & asperitas linguæ, iis corriguntur quæ valdè humectant & leniunt, vt syrupo violato, iuiubino, cremore hordei, saccharo crySTALLINO, pennidiis, succo glycyrrhizæ in ore contentis, gargarismate ex succo semperuiui, vel decocto hordei, rad. althææ, fol. portulacæ, lactucæ, carnis cucurbitæ, seminis lini, & florum violarum. Quòd si cum siccitate & asperitate, fissuræ in lingua appareant, eæ curandæ sunt iis quæ humectando agglutinant, vt semine cydoniorum, gummi Arabico, sale prunellæ. Imprimis enim siccitas, unitatis solutæ causa, est emendanda, qua superata partes ad se inuicem diductæ ita laxantur, vt earum labra se attingant, tuncque leui glutine consolidentur.

quibus
remediis
curentur.

DE INQUIETE.

D. Quid Inquietis nomine designatur?

C. Iactatio totius corporis, nunc in hanc, nunc in illam partem.

Quid in-
quies.

D. Quibus ex causis Inquies oritur?

C. Inquies fit interdum ab inflammatione hepatis, aut lienis; quæ pro-

Quibus
ex causis
oritur.

priis dignoscitur visceris affecti signis: Interdum à bile porracea & eruginosa orificium ventriculi occupante, aut circum cor ebulliente: Interdum à multis vitiosis humoribus in hepate, liene & mesenterio congestis; qui per febrem excandescunt, diaphragma; & consecutione, pulmones & cor comprimunt. Vnde contingit oppressio suffocationis metum inferens. Tunc infimus venter distentus est, & attritus indolescit. Interdum acer & malignus humor in venis maioribus turgens, huc & illuc corpus inquietum ferri cogit. Interdum verò in habitum corporis, partesque nervosas effusus, eas sua acrimonia pungit & stimulat. Hinc diuexatus æger nullam decentem servat decubitus formam, quia præsentem perpetuò gravem atque molestantem experitur. Quo fit ut nunc in pedes, nunc in caput, nunc in latera lecti prouoluatur. Interdum fit à feruore & incendio febris. Ut enim frigus stupidos & immobiles, ita calor mobiles reddit ægros. Interdum à lassitudinis sensu, cuius ratione locum æger subinde mutat, quietem

frustrà quærens. Interdum extrema corporis imbecillitas huius symptomatica causa est: quia pars, supra quam iacet æger, statim fatigatur; nec amplius ferre corpus potens, ægrum ad locum in lecto mutandum impellit. Verùm hæc inquires lethalis esse solet, ut apparet in iamiam morituris, qui lectum subinde mutant. At inquietudo ab aliis causis orta curationem admittit.

D. Quam curationem institues febricitanti Inquiete conflictato?

C. Si ab inflammatione hepatis, aut lienis, oriatur Inquires, ad propriam visceris affecti curationem recurrendum est. Si à biliosis humoribus, porraceis & æruginosis, vel ventriculi orificium occupantibus, vel circumcorebullientibus, vel in primam aut secundam regionem turgētibus, educendi ij sunt; tùm vomitibus, si eò natura repat; tùm purgationibus blandis ex cassia, catholico, infusione rhei, & foliorum Orientalium, in decocto refrigerante: tùm clysteribus refrigerantibus, & blandè humorem morbosum ad intestina deriuantibus. Si à

Quæ ad
Inquietē
procu-
randam
adhiben-
da reme-
dia.

capitis æstu proficiscatur, caput rasum oxyrrhodino illinendum; Adhibenda fronti frontalia refrigerantia & humectantia, faciendus litus ex oleo papauerino, in quo tantillum opii solutum sit. Sin ab æstu cordis, hypochondriorum & lumborum, admouenda his locis epithemata refrigerantia. Quæcûmque autem fuerit Inquietis causa; æger quantum fieri poterit, se in vno lecti loco contineat; & quàm minimè poterit, deiiciat. Cùm verò nequit ampliùs durare, sese placidè commoueat. Nimia enim & frequens agitatio, magis calfacit, æstum auget, corpus fatigat, debilitat vires, & humores longè latèque spargens, difficiliorem illorum expulsionem reddit.

DE SYNCOP E.

Quid
Syncope.

D. Hactenus de functionum animalium noxis differuimus, nunc de vitalium lesionibus agendum. Syncope, qua præceps virium lapsus est, febricitanti superueniens, horrendum habetur symptoma, ad quod tota confestim curatio conuertitur, febre interim neglecta. Eius causas sigillatim recense, ut singulis proprium opponas remedium.

C. Syncope fit ab omnibus causis, ^{Eius cau-}
 quæ spiritus vitales alterant, labefa- ^{sz.}
 ctant, dissipant, quales sunt venenata
 pernicies cordi impressa, diuturnæ
 vigiliæ & inediæ, immodica quælibet
 euacuatio vel per hæmorrhagiam, vel
 per alui profluuium, vel per sudores:
 Acerbissimus dolor, à quolibet præter
 naturam affectu profectus: Abscessus
 quispiam intrò latens, siue in pulmo-
 nibus, siue in hepate, vel splene, alioue
 viscere, è quo teter vapor in cor irre-
 pens, vitales spiritus inficit. Quin &
 bilis æruginosa altiùs in os ventriculi
 eximio sensu præditum se insinuans,
 & lumbrici illud pungentes & velli-
 cantes, stomachicam Syncopen indu-
 cunt. Maligna causa cardiacis op- ^{Remedia,}
 pugnatur remedijs, vt aquis theria-
 calibus, & Alexiterijs Nectaribus.
 Prostratæ ab inedia & inanitione vi-
 res, Analeptics Ecchylomatis in-
 staurantur. Ad exolutos spiritus re-
 creandos & reficiendos, aqua vitæ
 artificio Chymico elaborata; & quæ
 Imperialis appellatur, ex cochleari
 datur, necnon & vinum tenue, odori-
 ferum: Exhibetur & panis assus vino

generoso maceratus cum saccharo & pauco cinnamomo: Adhibentur odoramenta ex rebus quibúsq; iucundis. Epithemata roborantia cordi admoventur. Ad diffusos per habitum spiritus intrò propellendos, aqua frigida faciei inspergitur. Ad cacoehymia, quæ cardiogmon infert, subduccendam; rheum, cassia, & alia id genus lenientia cathartica, decernuntur. Pharmaca pariter enecandis & eijciendis lumbricis pungëtibus idonea præscribuntur.

D. E. D. Y S P N O E A.

D. Dyspnœa in febre acuta, est malitiosa, ut prodidit Hippocrates Aph. 50. l. 4. Quibus ex causis oriatur, explica?

Quibus
ex causis
oriatur
Dyspnœa.

C. Spirandi difficultas in febribus continuis contingit, interdum à bile in præcordijs turgente, diaphragma pulmonésque comprimente; interdum à solo incendio in corde & pulmonibus concepto; interdum etiam moribundis, ab extrema imbecillitate facultatis animalis, quæ thoracis musculos mouet.

D. Quibus signis hanc Dyspnœa causam,

à superioribus internoscet?

C. In hac respiratio rara est & exigua, eaque frigida, inter respirandum narium pinnulae contrahuntur, adest summa virium debilitas: at in illis calida est & feruens exspiratio, vrget inquires, pulsus frequens & validus percipitur.

Quibus
signis
causae in-
ternoscun-
tur.

D. Quam curationem huic pernicioso Symptomati adhibebis?

C. Si Dyspnœa contingat à bile æstuante, remedijs refrigerantibus eius feruor contemperandus est, vt julepo rosato cum succo limonum parato; vel syrupo violato, in decocto radicum graminis, cichorij, asparagi, fol. lactucæ, portulacæ, agrimon. seminum frigid. maior. & minor. dissoluto. Concedendus est aqua frigida potus, si eam æger maximè expectat. Hordeū mundatū apprimè conuenit. Venæ basilicæ sectio imperanda, eaque repetenda bis, ter, quater, si opus sit. Purgatio etiam præscribenda, ex infusione rheï & fol. Orientaliū in decocto refrigerate, leniente & bilis acrimoniā obtundete. Cassia & catholicū conueniunt intrò sumpta tūm per os.

Quibus
remedijs
eius mo-
lienda cu-
ratio.

D d vj

17. 210. Framboejary
tum per aluum. Hepati epithemata
admouenda, ex aquis rosarum, plan-
taginis, cichorij, solani, aceto, pul-
uere elect. triontalon, & similibus.

D E T V S S I.

*D. Tussis febricitantibus valdè molesta
est. Quibus ex causis oriatur, quibûsque
remedijs, leniatur aperi?*

Quibus
ex causis
oriatur
Tussis.

C. Tussis, quæ febres intermitten-
tes præcedit, fit à vaporibus & fumis è
febrili materia initio paroxysmi com-
mota, ad pulmones elatis. Sed his à ca-
lore febrili resolutis cessat: Quæ verò
in accessionibus intermittantium per-
seuerat, vel in febribus continuis in-
festat, fit vel à pituita in cerebro con-
tenta calore febrili liquefacta, & in
pulmones illabente: quæ quidem
tussis humida est, vel à calida & sicca
organorum respirationi seruientium
intemperie, quæ adeò arida est, vt
nihil prorsus expuatur: vel ob refri-
gerationem capitis & thoracis acci-
dit, quando ingenti æstu vigente par-
tes ipsæ denudantur. Id symptoma
valdè noxium. Nam commoto cor-
pore febrem auget, adeoque dolorem,
vigilias, & alia febris symptomata

Nam æ-
gro non
infestat.

exaſperat. Sitim tamen lenit, modò non ſit vehemens, teſte Hippocrate *Aph. 54. l. 4.* Quibus in febribus tuſſes modicè irritantes adſunt, ij non admodum ſitiunt, quia (*inquit Galenus in com.*) ob motum tuſſi factum ex vicinis regionibus aliquis humor defluit, vnde quodammodo madefcunt loca, quæ ad aſperam arteriam pertinent, quibus madefactis ſitis minor euadit. Remedia autem Tuſſi conuenientia ſunt quæ ſputum promouent, Bechica propriè dicta. Sed vitanda quæ nimiooperè calfaciunt, eligenda verò quæ nihil aut minimùm curandæ febris nocent; verùm hanc, quoad fieri poteſt demulcent.

Quæ ad leniendâ Tuſſim adhibenda remedia.

DE DEGLUTIENDI

difficultate.

D. A vitalibus actionibus laſis, ad naturalium noxas tranſeamus. Difficultas deglutiendi febricitantes plerimque inſeſtat. Qua ex cauſa oriatur, & quibus ſubleuetur auxilijs exprome?

C. Deglutiendi difficultas accidit pharynge occupato, & œſophago coangultato, à fuliginofis vaporibus, aut à pituita è ventriculo aſcendente,

Vade oriatur deglutiendi difficultas.

Quæ in-
curabilis.

Quæ re-
media cu-
rationi
adhiben-
da.

aut è cerebro in fauces defluente, eaque febrili calore incrassata & concreta. Contingit & hoc symptoma aliàs ex bilioso sanguine, in musculos faucium & cervicis decumbente; aliàs ex vertebrarum cervicis distensione, à nervorum in circumiacentes partes insertorum siccitate excitata; aliàs ab extrema virium imbecillitate. Lethalis autem ea est difficultas deglutiendi, quæ à convulsione nervorum oritur, quòd à siccitate fiat: necnon & quæ à summa virium imbecillitate accidit. At verò quæ fuliginosis vaporibus incrassatis, lentisque humoribus pituitosis obduratis, fauces & œsophagi introitum occupantibus prodit, curatur incidentibus & detergentibus gargarismis. Si tumor cervicem occupans hoc symptoma excitet, adhibentur collo linimenta, vnguenta & cataplasmata remollientia, discutientia; & si nulla resolutionis spes videatur, suppurantia.

ANOREXIA.

D. Anorexia febres ferè semper comitari solet. Interdum illas antecedit, interdum illis solusis remanet per plures dies.

Eius causam & curationem perstringe.

C. Anorexiæ causa quandòque solus Anorexiæ
causa.
est febris feruor ventriculo commu-
nicatus; aliàs teter vapor in ventriculi
orificium (quod famis sedes est) vn-
delibet elatus; aliàs vitiosus humor Remedia:
ventriculi tunicas & orificium im-
buens. Si ab æstu ventriculi contin-
gat Anorexia, exhibeantur refrige-
rantia & acida, vt syrupi è limonibus
& è ribes. Aquæ potio concedatur,
modò nihil prohibeat. Si præterea vi-
tiosus humor, cibi fastidium pariat,
blanda catharsis decernatur. A qua-
cùnque verò causa procedat, offeran-
tur esculenta & potulenta ægro non
ingrata: quia paulò deterior, sed sua-
uior cibus & potus; meliori, sed insua-
uiori, præferendus, ex Hippocratis do-
ctrina, *Aph. 38. l. 2.* Nam quæ cum vo-
luptate assumit ventriculus, ea & va-
lidiùs amplectitur, & faciliùs coquit.
Per rara verò interualla cibus parca
manu detur. Frequentior enim & co-
piosior inappetentiam vel sanis indu-
cit. Condiatur, si tussis absit, ompha-
cio, aceto rosato, aut succo limonum.
Soluta febre, si deiecta remaneat ap-

petentia, æger modicè se exerceat, vtatur capparibus & oliuis. Si, ne his quidem redeat appetitus, vinum absynthites, aut catapotia ex hiera erunt ex usu; quibus bilis aut pituita ventriculi tunicis impacta, quæ appetitum tollit, abstergitur.

DE BOULIMO.

D. Boulimus sæpè diuturna febre laborantibus accidit, maximè pueris qui plurimum habent calidi innati, cuius ratione copioso indigent alimento. Quid est Boulimus?

Quid
Boulim?

C. Boulimus est fames præter naturam, quæ nisi statim sumpto alimento sedetur, animi deliquium adfert.

D. Quæ illius causa, & quæ huic curatio adhibenda sit, exprome?

Eius causa.

C. Causa illius in febribus, est partium corporis spiritalium, humoralium & solidarum magna dissipatio, ab immodico calore facta, & alimenti penuria, ob quam per vniuersum corpus inanitionem, maximus fit in ventriculi orificio suctionis sensus. Interdum hoc symptoma in febribus contingit à vermibus contentis in intestinis, qui alimentum sumptum sta-

tim absorbent: Interdum ab immodica aqua frigida potu, quæ refrigerato ventriculi orificio, famem inuehit. Vnde Hippocrates aquam voracem vocat. Frigus enim ab aqua orificio ventriculi inductum, eius tunicas cōstringit, & constringendo exprimit, vnde fames. Interdum & humor frigidus, acidus ac malignus, siue pituitosus, siue melancholicus orificio ventriculi & eius tunicis impactus, sua frigidityte & aciditate morsum functioni similem inducit. Sunt tamen qui negant Boulimum fieri à refrigeratione oris ventriculi: sed potiùs ab immodico eius & viscerum calore, à quo fit maxima substantiæ totius corporis iactura, cuius effluuii ratione, æger subinde alimentum assumere cogitur. Si oriatur à maxima totius corporis dissipatione à febrili incendio facta, refrigeratibus tùm sumptis, tùm admotis, id extinguatur. Alimentis liquidis potiùs quàm solidis æger alatur. Nec multus cibus affatim ingeratur, repentinæ mortis metu: sed modicum per breuia interualla exhibeatur, ne vis imbecilla pondere suf-

Quæ huic
curatio
adhibenda.

petentia, æger modicè se exerceat, utatur capparibus & oliuis. Si, ne his quidem redeat appetitus, vinum absynthites, aut catapotia ex hiera erunt ex usu; quibus bilis aut pituita ventriculi tunicis impacta, quæ appetitum tollit, abstergitur.

DE BOULIMO.

D. Boulimus sæpè diuturna febre laborantibus accidit, maximè pueris qui plurimum habent calidi innati, cuius ratione copioso indigent alimento. Quid est Boulimus?

Quid Boulimus?

C. Boulimus est fames præter naturam, quæ nisi statim sumpto alimento sedetur, animi deliquium adfert.

D. Quæ illius causa, & quæ huic curatio adhibenda sit, exprome?

Eius causa.

C. Causa illius in febribus, est partium corporis spiritalium, humoralium & solidarum magna dissipatio, ab immodico calore facta, & alimenti penuria, ob quam per vniuersum corpus inanitionem, maximus fit in ventriculi orificio suctionis sensus. Interdum hoc symptoma in febribus contingit à vermibus contentis in intestinis, qui alimentum sumptum sta-

tim absorbent: Interdum ab immodica aquæ frigida potu, quæ refrigerato ventriculi orificio, famem inuehit. Vnde Hippocrates aquam voracem vocat. Frigus enim ab aqua orificio ventriculi inductum, eius tunicas cōstringit, & constringendo exprimit, vnde fames. Interdum & humor frigidus, acidus ac malignus, siue pituitosus, siue melancholicus orificio ventriculi & eius tunicis impactus, sua frigidityte & aciditate morsum functioni similem inducit. Sunt tamen qui negant Boulimum fieri à refrigeratione oris ventriculi: sed potiùs ab immodico eius & viscerum calore, à quo fit maxima substantiæ totius corporis iactura, cuius effluuii ratione, æger subinde alimentum assumere cogitur. Si oriatur à maxima totius corporis dissipatione à febrili incendio facta, refrigeratibus tùm sumptis, tùm admotis, id extinguatur. Alimentis liquidis potiùs quàm solidis æger alatur. Nec multus cibus affatim ingeratur, repentinæ mortis metu: sed modicum per breuia interualla exhibeatur, ne vis imbecilla pondere sus-

Quæ huic
curatio
adhibenda.

focetur. Si lumbrici symptoma istud excitant, aduersantibus pharmacis excludentur. Si ab aquæ frigida potu, intemperies frigida in ventriculo contracta est, calfacientibus corrigatur, habita tamen ratione febris. Si ab humore frigido & acido ventriculi tunica impacta, euacuetur humor ille vomitoriis, si æger facilè vomat, vel blandis catharticis. Postea vinum enulatum, aut absynthites porrigatur, quod, licet appetentiam naturalem inuitet, famis tamen non naturalis causam coquit & absumit.

DE SITI.

D. Sitis ardentium febrium assidua comes est. Qua ex causa excitetur, & quomodo sedetur aperi?

Qua ex causa Sitis excitetur.

C. Sitis causa in febribus est caliditas & siccitas internæ ventriculi tunicae, febris incendio, vel à falsis & nitrosis humoribus contracta; aut citra ventriculi affectum, feruor pulmonis; à quo ob vicinitatem & fuliginem ascensum, os, palatum, & lingua valdè arescunt, nigrescunt, & scabritiem contrahunt. Interdum febricitantes siti nulla tentantur, vel

Cur febricitantes aliquando non infestentur.

quòd frigidus & aquosus humor à cerebro delabens, ventriculū proluit. Vnde Hippoc. *Aph.* 54. l. 4. protulit: Quibus siccae tussēs irritantes in febribus perseverant, ij non valdè sitiunt: vel quia nullus ardor ventriculū occupat, quòd feruida febris materia longè ab eò absit. Neque enim sitiunt febricitantes, nisi eorum ventriculus à calore febrili exsicceetur: vel quia mens ægrotat, vt in Phreneticis, qui licet valdè sitiant, sitim tamen non sentiunt. Interdum sitis nulla, cūm demortuus est ventriculi sensus, quod in febribus ardentibus exitium denuntiat. Sitim, quæ per febres vehementes exercet, aqua frigida in primis compescit: ideòque intrepidè porrigenda, obseruatis cautionibus. Quòd si ab ea metus est, corrigatur eius frigiditas & crassities, agitatione & transfusione crebra, immersa panis cibarij medulla. Quidam vt leuitatem aquæ concilient, eam igni coquunt, sed ea minùs refrigerat, quia igneam quandam vim concipit. Vt autem tutiùs & citra viscerum offensam propotum sumi possit, in ea integrum hor-

Quibus
auxiliis
sederat.

deum coquitur, dum crepuerit: additur & parum glycyrrhizæ sub cocti-
nis finem. Fit & julepus ex aqua fo-
ntana, aqua rosarum, succo citriorum
malorum & saccharo, qui vulgò Ale-
xandrinus vocatur. Syrupus etiam
violaceus cum aqua rosarum disso-
luitur, vt & syrupus limonum, qui
arceat putredinem, & bilis feruorem
retundit. Ad sitim fallendam non
nulli vtuntur cerasis acidulis, oxya-
cantha, prunis damascenis saccharo
conditis. Sed magis sedatur sitis fre-
quentibus oris collutionibus, acini
mali punici, pulpa citriorum & au-
rentiorum in tallecolas diuisa, & ma-
cerata in aqua rosarum, cum saccha-
ro. Porro in accessionum principij
ager ab omni potu prohibendus, ne
longior fiat accessio; in vigore potiù
concedendus, maximè in primis fe-
brium intermittentium accessionibus.
Nam vbi illæ diuturnæ euadunt, ni-
mio potu in longissimum tempus
producantur: quàm parcissimè
igitur in ijs bibendum, vt interim in-
situs calor in crudorum humorum
qui longitudinis febrium caus.

sunt, concoctionem incumbat.

DE SINGULTU.

D. Singultus non raro per febres accidit. Qua ex causa oriatur, & qua ratione curetur, exprime?

C. Singultus per febres aliàs à repletione, aliàs ab inanitione fit. Sæpè etiam à cæca quadam malignitate & perniciæ. A repletione, ut cum vitiosus humor mordax per venas in ventriculum effunditur, & in eius tunicas altius impingitur; ut accidit interdum in rigore & horrore febrium intermittentium, & in crisi continuarum. Ab inanitione, ut cum exsiccata ventriculi tunica ab ardore febris in se contrahuntur. Interdum etiã teter & malignus vapor, orificio vetriculi, & eius tunicis, altius insertus Singultu creat, ut contingit in febribus pestilentibus, aut aliter malignis. Superuenit etiam hoc symptoma cerebri & iecoris inflammationi, ventriculo per sympathiam affecto. Sæpè indefinenter vrget Singultus, quandoque per intervalla repetit. Si Singultus fiat ab acerbis & mordacibus humoribus, contentis in ventriculi tunicis, præscribatur eme-

quibus ex
causis
Singul-
tus oria-
tur.

Quibus
remediis
curetur,

ticum, si æger facillè vomat, aut blanda catharsis, vt ipsi reuellantur. Contemperantur etiam iis quæ acrimoniâ eorum obtundere possunt; vt iusculis, ptisana, emulsionibus seminum 4. frigid. maior. cortice spoliatorum, in mortario marmoreo tritorum; sensim affundendo decoctum hordei, vel lactucae aut portulacæ. Si ab inanitione, lethalis esse solet, vt cùm antegressæ sunt immodicæ vacuationes per hæmorrhagiam, alui profluvium, vomitus aut sudores. Iuuandus tamen æger iusculis, consummatis, expressionibus carniû, destillatis, restauratiuis & similibus. Si à venenata pernicië ventriculi orificio impacta, prætermisiss & vomitoriis & purgationibus, oppugnetur illa solis alexiteriis, vt aqua theriacali, & cardui benedicti. Præterea sacculis comparatis ex rad. cyperi, calami aromatic. foliis siccis menthæ, sampuci, absynthii, origani, calamenti, thymi, pulegii, melissæ, artemisissæ, seminibus anisi & feniculi, in aqua vel vino rubro bullitis, pro fotu regionis ventriculi. A fotu illinatur oleo saluiæ, rorismarini,

menthæ, addito mithridatio. Qualiscunque autem fuerit Singultus causa, si ille diutius perseveret, iuvat cucurbitula cū multa flamma regioni hepatis admota. Nam partes ventriculo superpositæ ita suspenduntur; & quādiu ventriculum minùs comprimunt, minus vrget Singultus: & ob id erecto corpore minùs, quàm supino, Singultus infestat.

DE LUMBORVM DOLORE.

D. Lumborum dolor grauis febricitantes valdè infestat. Quibus ex causis excitetur, & quibus auxilijs leniatur, explana?

C. Lumborum dolor grauis interdum fit ex venæ causæ distensione, quam vapores è sanguine calefacto geniti, vel humores qui febrem committunt, magnâ copiâ in venam cauam, maioremque lumborum arteriam illabente, efficiunt. Hæc enim vasa lumbis assidentia, ab ijs vaporibus vel humoribus distenta, lumbos comprimunt, vnde dolor maximus. Quòd si prædicti humores in ipsis vasis ebulliant, renum dolores inquiete maxima comitatos suscitabunt. Qui etiam interdum contingunt, cū multa

quibus ex
causis ex-
citetur
lumborū
dolor.

Quibus
remediis
sedetur.

pinguedo renes circumstans à febrili calore incalescit. Ad sedandum Lumborum dolorem, adhibetur oxyrhodium ex aqua rosarum, oleo rosato & aceto paratum; vel oleum papaveris aut nymphaeae in aceto lotum, vel populeum, aut ceratum Gal. refrigerans, cum succo semperuiui & camphora. Fit & epithema ex aqua plantaginis, rosarum, aceto rosato & camphora. Intro etiam sumuntur emulsionem seminum frigidorum major. amygdalata, hordeata; & Inijciuntur clysteres remollientes, refrigerantes & blandè purgantes.

DE HÆMORRHAGIA.

D. Explicatis febrium symptomatibus in actionum noxis, pergamus ad symptomata in excretorum & retentorum aetria.

Hæmorrhagia è naribus frequenter febricitantibus accidit. Quid in eius curatione animaduertendum?

Quid in
Hæmor-
rhagia
animadu-
verten-
dum.

C. Animaduertendum an symptomata vel critica sit Hæmorrhagia.

D. Quibus notis symptomata, à critica distinguitur?

C. Symptomata vi morbi superuenit

uenit, non critico die, nec antegressis
pepasmī signis. Critica, verò fit robore
naturæ critico die, prægressis coctio-
nis signis.

D. Quotplex est?

C. Duplex: una moderata, cum Quot-
plex sit.
natura sanguinis fluorem, cum opus
est, cohibet; altera immoderata, cum
eam sistere nequit.

*D. Nōne curatio eadem utrique
adhibenda?*

C. Nequaquàm. Quæ enim mode-
rata est, non reprimenda, sed sinenda.
Immodica verò quàm primùm sisten-
da est?

D. Quibus auxilijs sistitur?

C. Sistitur topicis adstringentibus Quibus
auxilijs
immodi-
ca Hæ-
morrha-
gia sista-
tur.
& refrigerantibus fronti admotis.
Admouetur frontale ex sanguine
draconis, bolo Armena, aceto, cum
oui albumine subactis: vel applicatur
fronti emplastrum ex mastiche, oleo
myrtillorum soluta. Insufflatur etiam
in narem pulvis boli Armenæ & san-
guinis draconis. Quin & penicillus
ex pilis leporis, aut linteo discerpto
paratus, vnguento desiccatiuo rubro
circumlitus, in narem, à qua fluit san-

E c

guis, inditur. Linteum in aceto frigidissimo maceratum, vtiliter tùm cervici, tùm testibus imponitur; & cùm mora incaluerit, renouatur. Cucurbitula hypochondrijs affigitur. Epithema refrigerans hepati admouetur. Arcta vincula extremis partibus iniunguntur. Spina & lumbi vnguento albo refrigerante Gal. & muccagine seminis psyllij in aqua portulacæ extracta, illinuntur. Necnon & corallum collo appenditur.

DE SVDORE.

D. Sudor febribus tam intermittentibus, quàm continuis, accidit. Declara quibus ex causis fiat, quibûsque signis bonus à malo internoscatur?

Quibus
ex causis
fiat Sudor.

C. Sudoris & vrinæ eadem est materia, nempe serosus humor; qui sanguinis erat vehiculum; vnde sudor si copiosior effundatur, vrina pauca redditur, & contrà. Efficiens causa est calor; non acer, qui siccandi facultate pollet, sed humidus per habitum diffusus, serosam materiã in vapores resolvens, qui ad superficiem corporis elati concresecunt, vnde sudor per cutem erumpit. Causa verò sine qua non, est cutis

raritas, & idonea hepatis & lienis constitutio, quibus in visceribus primam sudorem scaturiginem statuit Fernelius, hoc argumento ductus, quòd calido & humido iecore & liene præditi, quavis ex causa sudore diffuant: Iecoris verò & lienis sicca intemperie, obstructione & scirrho laborantes, nulla vi sudare queant. Notæ boni vel mali sudoris in febribus sumuntur, à die quo erumpunt, à loco unde prodeunt, ab eius qualitate, & ab effectis. Ex Hipp. enim dogmate: Sudores in acutis febribus, optimi sunt, si diebus criticis proueniant, antegressis pepasmi signis, & febrem prorsus auferant: boni etiam qui è toto corpore manant, morbumque tolerabiliorem reddunt. Qui nihil horum effecerint, mali sunt. Pessimi verò sunt frigidi, & qui tantum circa caput, faciem & ceruicem oriuntur. Isti enim mortem, vel morbi longitudinem portendunt.

Quibus
signis bonus
natus à malo
disce-
natur.

D. Quid Sudoribus erumpentibus, ad salutem agri procurandam, moliendum esse censes?

C. Sudores in febribus aliàs cohi-

Ec ij

652 N. Ab. Frambesarij
beri, aliàs excitari debent.

D. *Quando & quomodo sistendi, & proritandi sint, apertius explices velim.*

Quando
prouocā-
dus sudor,
& quo auxi-
lio.

C. Si in febrium continuarum crisi, aut in fine accessionis intermittentium, Sudores parcius erumpant, prouocandi sunt, non vestimentis, nec igneo calore, ne interim incendium exasperetur, sed attenuanti & sudorifica potione, qualis erit è vino albo, tenui, valdè aqua cardui benedicti diluto, & syrupo capilli veneris. Verùm in Sudoribus, modus quidam esse debet, vt & in omnibus reliquis euacuationibus; quæ si sint vberiores, metu nimiae virium exolutionis tutò sistuntur. Modum verò indicabit pulsus, qui cum incipit minui & languescere, immodicam esse arguit. Concidente ergo pulsu, Sudores arte supprimendi sunt. Ad sistendos sudores, illinuntur lumbi oleis rosato & mastichino in aceto lotis, vel cerato refrigerante Galeni, addita camphora. Adhibentur cordi & epithemata refrigerantia. Refrigeratur arte aër cubiculi. Dantur intrò adstringentia, quæ viscera corroborat. Necnon & hordeata, qui-

Quando
supprimendus,
& quibus
subidiis.

bus semina 4. frigida fuerint admixta.

D. Post sudores, quid agendum?

C. Repurgandum erit corpus. Post sudorem, quid moriendum.

Cum enim tenuior tantum portio putrescentium humorum euacuari possit per sudorem, etiam si febris eo abunde profuso conquiescat, nisi tamen sumatur medicamentum, quod crassiores humores subtrahat; vel recidiva expectanda est, vel humore è venis maioribus in habitum corporis translato, aut scabies, aut furunculi, aut abscessus plures; aut si in aluum spontè irruit, diarrhœa; aut si inter membranas abdominis effundatur, ventris atrocissimi dolores superueniunt, quos cōsequitur artuum paralytis.

DE NAVSEA ET VOMITU.

D. Nausea & vomitus febrem quandoque precedunt, eam sapius comitantur, præcipuè Pestilentem. Quare ex te symptomatis utriusque definitionem, causam, curandique rationem?

C. Nausea est irritus ventriculi conatus, quod sibi molestum est expellere nitentis. Vomitus verò est eorum quæ sunt in ventriculi capacitate sursum per os facta reiectio.

Quid Nausea?
Quid vomitus?

Vtriuf-
que cau-
sa.

Quibus
remedijs
molienda
curatio.

Vtriufque in febris causa est vitio-
sus humor quilibet, vel in ventriculi
capacitate innatans, vel in eiusdem
tunicis firmiter inhærens: aut pesti-
fera quædam qualitas orificio ventri-
culi impressa. Si fiat à vitiosis humo-
ribus, ij sunt accommodatis cathar-
ticis euacuandi, aut etiam vomitorijs,
si æger facilè vomat. Si frequentior
sit vomitio; ad eam supprimendam,
adhibetur litus ex oleis rosarum, ab-
synthij vel myrtillorum. Admouetur
emplastrum ex conserua rosarum,
carne cydoniorum, puluere mastiches,
absynthij, samplici, caryophylli, nu-
cis moschatae, corticis citrij sicci &
similibus. Applicatur vulgò crusta
panis tosta, in aceto vel vino generoso
macerata, puluere mastiches, nucis
moschatae & caryophylli. conspersa.
Si fiat ab aura pestilenti, hæc oppu-
gnanda est cardiacis, tum sumptis,
tum admotis, vt theriaca & mithri-
datio, aquis item theriacali, cardui
benedicti, scabiosæ, pimpinellæ, mor-
sus diaboli, & alijs id genus.

DE ALVI FLUXU.

*D. Alui fluor febricitantibus contingens,
quomodo curatur?*

C. Pro varietate causæ, varia postulat auxilia.

Quomodo
curetur
alui
fluxus.
Celiacus.

Celiacus quippè fluxus ab obstructione profectus, curatur aperiētibus, admixtis ad viscerum robur adstringentibus.

Lientericus, siue ob retentricis imbecillitatem, ab acida pituita; siue ob expultricis irritationem ab acri bile ortus, deterfo luxuriante humore, ac roborato ventriculo accommodatis pharmacis compescitur.

Lientericus.

Dysentericus, detracta cacochymia intestina rodente, biliosa rheo, aliisque similibus cholagogis; pituitosa phlegmagogis, melancholica melanogogis reprimitur.

Dysentericus.

Quemadmodum & diarrhœa intempestiua, à quolibet humore vitioso excitetur, sublata eius portione, propriâ catharsi, alacrior natura redditur ad reliqui concoctionem molliendam. Intempestiua autem est quæ febrium initio accidit. Tunc enim, cum cruda sint omnia, vacuationes omnes non naturæ vi, sed morbi potius impetu, & turgentis humoris acrimonia naturam stimulante, adeo

Quæ intempestiua
Diarrhœæ
curatione
adhibenda.

Quod te-
perius
alui
fluor, si
nendus, si
modera-
tus fue-
rit.

symptomaticè fiunt. Verùm diarrhœa
conuenienti tempore superueniens,
nèpè in fine cōtinuarū febriū, aut ac-
cessionū febriū intermittentiū, appri-
mè utilis est, si moderata fuerit. Itaque
si febricitatē occupet, alia vacuatione
opus non est, *auctore Galeno, l. ad Glau-
conem.* Vbi quippè omnem corporis
redundantiam vacauit, ipsa per se
sufficit. Timendum enim, si vena se-
cetur, ne vires fluxu jam quadamte-
nus labefactatæ in totum pereant; aut
si iam incitatus venter validioribus
medicamentis moueatur, ne ita pro-
ritetur natura, vt postea eius impetus
cohiberi nullo modo possit.

Quibus
auxiliis
sistendus
alui fluor
immodi-
tus.

At si alui profluuium immodicum
extiterit, pròtinus sistendum est, ad-
stringentibus enematis, vnguentis, aut
emplastris eiusdem facultatis extrà
adhibitis, stypticis intrò sumptis,
necnon & hypnoticis. Somnus enim
omnes euacuationes sedat, qualescū-
que fuerint, præter sudores, qui dor-
mientibus copiosiores erumpunt,
quàm vigilantibus.

DE ALVI ADSTRICTIONE.

D. Alui adstrictio febricitantibus fra-

quenter accidit. Quibus ex causis oriatur, & quibus auxiliis solvatur, ostende?

C. Alui adstrictio in febribus fit, vel ab obstructione meatus cholidi, semper ictero comitata, ad cuius curationem aperientia ex usu sunt: vel à calore immodico, à quo torrefiunt intestina, fæcèsque exsiccata: expulsionem magis resistunt. Tunc aluus solvitur, decocto prunorum dulcium & acidorum, clysteribus refrigerantibus, remollientibus, & blandè purgantibus, glandibus expultricem intestinorum vim proritantibus, purgationibus blandis è cassia recentè mundata, è diluto rhei, foliorumque Oriétaliū cōparatis, & aliis id genus.

DE RIGORE, HORRORE,

& Frigore.

D. Supersunt febrium symptomata in corporis qualitatibus immutatis consistentia, cuius generis sunt Rigor, Horror & Frigus. Quæ inter se discrepent, quibus ex causis oriantur, quibusque auxiliis subleventur, ostende?

C. Rigor, Horror & Frigus, sunt affectus sola magnitudine inter se differentes, ab iisdem causis procedentes,

quibus ex causis oriatur alui adstrictio.

Quibus subsidiis adstrictior aluus subducatur.

Rigor, Horror, & Frigus, quo differant, & quo conveniant.

E c v

Quibus
ex causis
orianetur.

iisdémque remediis mitigari postulant. In febribus intermittentibus non nisi initio accessionis infestant: sed Rigor in continuis febribus non nisi in declinatione totius morbi oritur, naturâ biliosum humorem intra venas maiores conclusum in capillares, & ex his intra carnem & cutem deponéte, quam exquisito sensu præditam cum acriter pungit & vellicat, sit molestissimus doloris sensus, & statim Rigor vehemens consequitur, nervosis partibus, ad id quod molestum est expellendum, se contrahentibus, & simul calore & spiritu influentibus, intrò in cor raptis.

Obiectio.

D. Contra. In doloribus humores ad partem affectam confluere solent. At per Rigorem externus corporis habitus dolore afficitur. Cur ergo spiritus & sanguis ad interiora refunditur?

Solutio.

C. Id ex dolorum discrimine contingit. Mediocris quippè dolor, humores ad se attrahit: sed magnus & repentinus, ad cor usque peruenit, quod dolens maximam sanguinis & spiritus partem ad se rcuocat.

D. Profer auxilia intermittentium fe-

*brium Rigori, Horrori, Frigori uesedando
conuenientia?*

C. Anteparoxysmum, si vires ferant, ager corpus vehementer ad sudorem usque exerceat : vel duabus, tribusve horis ante accessionem, lectum petat, ac pluribus vestimentis cooperiatur, calentibus linteis inuolutus. Quod si nec sic, quidem prohibeatur Rigor, Horror, vel Frigus, admoueantur plantis pedum lapides candentes vino extincti, aut lagenæ aqua calente plenæ, ut quàm citissimè fieri poterit, corpus incalescat. Sunt qui rigente corpore extremas partes oleo anethino, irino, rutaceo vel laurino perfri-
cant. Sed quia grauis est vnctionis vsus, satius erit lintea in aqua vitæ tepida macerare, & expressa extremitatibus applicare : vel hypochondriis & hypogastrio, vnde rigor procedit, adinouere sacculos ex radicibus enulæ campanæ, cyperi, calami aromatici, foliis methæ, saluæ, ruthæ, absynthii, pulegii, origani, calaminti ; seminibus anisi, fœniculi, cumini ; floribus chamæmeli, meliloti, & similibus in vino albo coctis comparatos, quibus non

Quibus
auxiliis
intermit-
tentium
februm
Rigor,
Horror
& Frigus
mitigen-
tur.

modò Horror discutitur, sed & viscerum obstructio soluitur.

D. Eademne remedia Rigori continuis febribus contingenti adhibenda?

Cur Rigor continuis febribus superueniens non sit cohibendus.

C. Nequaquam. Quamuis enim discruciet ægrum, si diè critico, antegressis pepasmi signis, contingat, non est cohibendus. Quia hunc sudor, aut vomitus, vel alui fluor biliosus, ac protinus ardentis febris solutio sequitur, teste Hippocrate, *Aph.* § 8. l. 4.

D E Æ S T U.

D. Rigori, Horrore, Frigoriue discusso succedit Æstus. Quid infestante Æstu moliendum?

Quomodo contemperandus Æstus.

C. Vbi febrilis calor quoquoersum accensus erit, semel atque iterum porrigenda ægrotanti ptisana, cui syrampus imprimis violatus, vel è limonibus, fuerit admixtus, ad ingentem feruorem contemperandum, ac inexhaustam sitim extinguendam; ac demùm capillaris, ad sudorem promouendum. Eodem tempore minuenda integumenta sunt, omniâque calorifica remouenda, ne maximo intus ardore concepto sæuior euadat accessio.

METHODVS







EXAMEN I.
BACCALAVREORVM,
AD MEDENDI
LICENTIAM
consequendam.

DECANVS.

*Baronis acutè febricitantis historiam
Baccalaureo proponit.*



OBILIS adolescens
habitu mediocriter
carnoso, tempera-
mento calido & hu-
mido, liberaliori vi-
ctu vsus, consueta
exercitatione ne-
glecta, mense Majo per plures dies in-
desinenter laboravit. Facies agrotan-
tis rubore perfusa videbatur, caput
dolebat, mente tamen constabat, sed
profundo somno premebatur, tensi-

ua lassitudo valdè molesta erat, lipothymia frequens, crebrior respiratio, pulsus fortis, velox & inæqualis, anorexia, sitis ingens, urinae crassæ, rubræ & turbidæ, deiectiones non ita procul à naturæ modo aberant, calor tactu mordax tangentis sensum acriter feriebat.

Ex his symptomatibus, morbi diagnosis & prognosim erue, ac subinde therapiam aggredere.

BACCALAVREVS.

*Ad penitiorem diagnosis enucleandam,
Qua sit affecta sedes indicat.*

Ex actionibus læsis cor per se, ac per consensum omnes corporis partes laborare cõstat. Capitis dolor, rubicunda facies, profundior somnus, partes animales: lipothymia frequens, crebrior respiratio, pulsus velox & inæqualis, partes vitales: anorexia, sitis & urina à naturali longè recedens, partes naturales præter naturam affici indicant.

Qua morbi species.

Morbi species: Febris erat, ut ex pulsu & calore præter naturam constat: eaque continua, quia assiduò fatigabat sine vlla remissione; non simplex, quidem, sed Synochus putris nuncupata, ut calor acer, & urinae crassæ, rubræ ac turbidæ testantur.

Qua efficiens morbi causa.

Causa morbi plethora est, à sanguinis vbertate profecta, cuius antecedentia signa sunt temperamentum calidum & humidum, ætas adolescens, vernum tempus, liberalior victus, ac consueta exercitatio neglecta: consequentia verò; faciei color supra consuetudinem rubicundus, distendens lassitudo spontanea, habitus *ευωπνος*, capitis dolor ob vaporum in cerebrum meantium copiam; somnus profundus, pulsus plenus ac respiratio crebrior. Synochus igitur à copia sanguinis in vasis maioribus putrescentis excitata est. Quòd enim putrida sit, ex eò constat, quòd calor acrius contactum feriat, quàm simplex Synochus; pulsusque non solum vehe-

664 *N. Ab. Frambesarij*
mens & frequens, verumetiam in
qualis percipiatur, ac vrina crassa,
rubra, & turbida conspiciatur.

*Qualis futurus sit morbus, è præ-
sentibus indicijis prænuntiat.*

Hic morbus quamvis è genere acu-
torum sit, quorum salus non debet
nisi dubia promitti, Hippocratis de-
creto; augurari tamen licet, quod sa-
lutaris erit, si Medico Antagonistæ,
Æger se strenuum præstiterit Synago-
nistem. Præsentia futura salutis signa
ducuntur à viribus validis, ab habitu
eufarco, ab ætate incrementa, à tem-
pore verno, à morbo naturæ, habitui,
ætati & tempori consentaneo, & à
principum functionum incolumitate;
vtpote à mentis constantia, à pulsu
forti, & à deiectionibus naturalibus.

*Curandi indicationes unde ducan-
tur, & quibus remediorum gene-
ribus curationis scopi com-
parentur, explicat.*

Curandi indicationes duæ sunt;

prima sumitur à causa morbi, altera ab ipso morbo. Vnde in Synochi curatione duplex proponitur scopus: primus in plethora febris causa demenda, alter in calore febrili alterando. Ad vtrumque pertingendum duo præstantissima traduntur à Galeno remedia; sanguinis missio, & aqua liberalior potio. Necessaria quippè *φλεβοτομία*, ad febris causam tollendam, internum incendium extinguendum, sanguinem ebullientem à putredine vindicandum, inuadentem putredinem arcendam. Liberalis *ψυχροπότης* magnoperè item commendatur à Galeno, quia largo frigida potu calor igneus extinguitur, ac solidæ partes adeò roborantur, vt inutiles humores per aluum, vel per urinas aut per sudores protinus excernant. Alijs etiam remedijs feruorem sanguinis temperantibus oppugnari debet Synochus, vt iulepis & apozematis refrigerantibus & humectantibus, epithematis hepatis regioni adhibitis, atque frontalibus fronti & temporibus admotis. Hæc mea est de propositi morbi dignotione, prænotatione & curatione.

DOCTOR II.

*Præsulis Hemicranij laborantis historiam
Baccalaureo proponit.*

ECclesiasticus vir, pietate & doctrina insignis, temperamento calidus & siccus, trigesimo ætatis anno; per intervalla, capitis dolore tentatur, dextram potissimum a partem occupante; & à cerebro ad oculi dextri radicem pertingente, integrum diem durans: ita interdum sæuiente, vt nec lucem, nec clamorem, nec odorem, nec vini potionem laborans ferre queat: quin & tactu sic exacerbatur, vt ne capillos inuerti sinat; adeoque contumax malum, vt aliquot abhinc annis perseueret, licet egrotans multa expertus sit remedia; vt cui vena sæpius secta, pluraque pharmaca exhibita.

Simul ac morbi diagnosim atque prognosim patefeceris, si qua curationis spes reliqua tibi videatur, quo pacto molienda sit, apri.

BACCALAVREVS.

*Ad Pathematis diagnosis expla-
nandam, Quae pars affecta sit,
demonstrat.*

CApitis dolor membranis inhæret
intravelextra craniū sitis. At qui
laborantē excruciat, non externus dū-
taxat, sed & internus videtur. Nam
& pericranium dolore affici constat,
quod manus contactum haud faciliē
ferat: necnon & crassam, tenuēque
meningem, quod ad oculi radicem
vsque, dolor pertingat. Cū verò
caput per consensum subditarum par-
tiū diutiùs laborauerit, procul dubiò
propriū inde affectum contraxit,
atque ex sympathia tandem idiopa-
thia emerfit.

Quis affectus.

Hemicrania Græcis dicitur hoc pa-
thema, quod in dimidia capitis parte
consistat. Morbus, quem Hemicrania
sequitur, non modò intemperies ca-

lida est, verum etiam solutio continui, dum partes affectæ discinduntur & mordentur.

Qua causa.

Causa est biliosorum, vaporumque acrim copia, qui in paroxysmo à calidiori iecore sursum repunt. Præterea capitis imbecillitas, à diuturnis meditationibus, ac flagrantibus literarum studijs contracta. Vnde id facile recipit, & ægrè repellit excrementa.

Exitus Prognosis persequitur.

Hic affectus cum iamdudum radices egerit, nec ullis hæctenus auxiliis cesserit, solutu quidem difficilis est; nequaquam tamen desperatus videtur, in hac præsertim florida ætate. Sed metus est, quamprimum subleuetur atrox ille capitis dolor, ne alium grauem affectum, ut epilepsiam, aut apoplexiam, vel paralysem accersat.

Quocirca illius curationi diligenter incumbendum.

Medendi methodum aggreditur.

Medendi scopus duplex, vnus therapeuticus, in præsenti exacerbatione sedanda consistens, alter prophylacticus in futuro paroxysmo prohibendo, sublata symptomatis causa.

Ad præsentis doloris acerbitatem mitigandam, statim clyster acriusculus est iniiciendus, leuésque cucurbitulæ, frictiones & ligaturæ infernis partibus adhibendæ, ad turgentem materiam à capite auertendam. Mox roborantia anodyna parti dolenti ad-mouenda, quale est medicamentum ex oleo rosato, aceto, semine papaueris, & hederæ corymbis comparatum. In eundem finem verbenaca viridis & sicca in oleo rosato & aceto cocta conueniet. Si sæuissimus vrgeat dolor, pulueris opiæ torrefacti ℥.j. misceatur cum lactis ℥.vj. quibus imbutum linteolum tepidè loco affecto applicetur, deinde ad discutiendam materiam in capite derelictam, pars oleo irino, aut sampucino, aut rutaceo, inungatur.

Abstineat æger à cibo, ab accessio-
nis principio ad declinationē vsque,
quo tempore iusculum pulli, buglos-
so, borragine, lactuca, portulaca &
oxalide alteratum, aut hordei cremo-
rem, aut panatellam sumat, ptisanam-
que propinet, si siti prematur.

Hæc in paroxysmo facienda. Ad
præcautionem verò, morbificus hu-
mor à capite & reliquo corpore re-
uellendus & euacuandus, pars affecta
roboranda, hepar aliâque viscera cõ-
temperanda. Ad aluum clementer
subducendam, paranda erit catapo-
tiorum massa, ex aloë in aquæ cicho-
rii sæpius lota, rhabarbari, scammonii
& colocynthidis ecchylomate, cum
tartari cremore, ex cuius ʒ. j. duæ fin-
gantur pilulæ bractæolis auri cooper-
tæ, per horam ante cibum singulis
hebdomadis, hyeme & autumnno de-
glutiendæ. Aliis anni temporibus sy-
rupus catharticus ex decocto hepati-
co & cephalico, ac cholagogis &
phlegmagogis cõparatus erit ex usu,
singulis saltem mensibus. Sudores ali-
quando prouocentur, decocto cardui
benedicti in aqua hordei facto. In epn;

te Vere sanguis iterum mittatur è cephalica dextra. Vena item frontis aperiatur. Pyroticum occipitio inuratur. Matutinis horis sternutamenta moueat per radiculam elebori nigri in dextram narem immissam. Errhinis & masticatoriis cerebrum expurgatur.

Ad capitis robur Paulus cataplasma conficit ex radicibus cucumeris agrestis & absynthio in hydræleo coctis, donec liquecant, quod parti dolenti apponit, abrasis prius capillis. Nonnulli Cornelij Celsi consilio, caput aqua frigida perfundunt. Ad iecur calidius temperandum, aqua Spadensis, vel Puguenfis, vel Forgenfis, aut Chenensis apprimè utilis est.

Idonea interim victus ratio instituat, cibus sit euchymus & refrigerans, vinum oligophorum abundè dilutum.

Abstineat à piperatis, salis & acris edulij. Vitet inedia, iram & alios vehementes animi impetus, Solis ardorem, ac Lunæ splendorem, corpusque mediocriter exerceat.

DOCTOR III.

Matrona paralyfi & catarrho conflictata historiam Baccalaureo proponit.

Matrona sexagenaria à quatuor annis brachij, crurisque sinistri motu priuatur; tenet insuper ad thoracem destillatione conflictatur, quæ spirandi difficultatem adfert. Varia remedium genera & purgantia & alterantia hæcenus præscripta sunt, sed irrita fuerunt omnia.

Præsentium diagnosi, ac futurorum prognosi accuratè perpensa, si sit adhuc aliquis curationi locus, quæ ratione tentanda sit, explora.

BACCALAVREVS.

Præsentium pathematôn diagnosis pandit.

Dvplex præter naturam affectus Ægrotantem exercet, Paralyfis dimidij corporis, quæ aliàs Hemiplegia dicitur, & Catarrhus in thoracem.

Ac

Ac proinde duplices affectæ partes, artus, atque pulmones. Illos quippè ex motus læsione, hos ex spirandi difficultate laborare constat; non quidem per se, sed per consensum. Ob cerebri frigidam, humidamque intemperiem. Vnde pituita tenuis ad pulmones transmissa dyspnœam parit: ad spinam verò Paralyfim, à qua brachij, crurisque motus impeditur.

Nec enim credibile est Paralyfim à pituita crassa nervos obstruente, ut nonnulli censent, creatam esse, sed ea potius attenuata atque liquefacta nervos madefaciente.

A diagnosi ad Prognosim transit.

Utrumque malum cum inueteratum iam sit, & valdè contumax, in hac prouecta ætate radicitus euelli nequit.

Sed summopere enitendum, ne in dies augeatur, neque Apoplexiam vel Asthma immedicabile tandem inducat.

Therapiam demum tentat.

Ad tentandam utriusque Pathema-

tis curationem, multi proponuntur scopi, materia peccans præparata à tota corpore euacuanda, peculiariter à cerebro & pulmone educenda, quæ nervis impaſta eſt, diſcutienda, exal- faciendi & corroborandi nervi. Ad hæc omnia præſtanda exquisita in pri- mis victus ratio inſtituenda. Ad ſu- peruacanei humoris præparationem, oxymel ſimplex & ſcylliticum ſingu- lis matutinis ad tria cochlearia per aliquot dies datum, profuturum eſt. Ad euacuationem totius corporis, bo- lus ex caſſiæ recenter extractæ ℥.j. za- lapi ſubtiliter puluerati ℥.j. & cre- mori tartari ℥.j. conſtans, exhibeatur manè, duabus horis ante iuſculum.

Duas deinceps, très-ve pilulas ex hiera ſemel in hebdomade, vnâ horâ ante cœnam deglutiat. Ad aluum cle- menter ſubducendam, in frequenti uſu habeat pomum elleboratum, hoc modo paratum: ℥. radicum ellebori nigri in vmbra ſiccatis ℥.j. inſigantur in pomum charta madida inuolutum, ſenſim coquatur tota nocte ſub cine- ribus, manè adiſciantur radices, mun- detur pomum, & cum ſaccharo come-

dat per tres horas ante cibum. Ad peculiarē capitis & pulmonum expurgationem, pulvis Nicotianæ sicca, parua quantitate, ter vel quater per nares manē attrahatur: vel fumus eius excipiat, ad pituitam è capite & pulmonibus educendam. Ad obstructos pulmones expediendos, frequenter syruporum bechicorum, & apozematum pectoralium vſu procuretur anacatharsis. Ad dissipandam materiam in neruis contentam, decoctum hidroticum è radice Chynæ, sarza parilla, imò & ligno sancto confectum, maximè conueniet. Vt & oleum succini albi arte Chymica paratum, ad guttas aliquot cum aqua præoniæ exhibitum; ac ceruici & spinæ extrinsecus adhibitum. Spina insuper & artus, oleo terebinthinæ, ceræ, costino, laurino, aut vulpino illinantur. Verno tempore, si defluxio in pulmones aliquantis per substitit, ad thermas Plumberias mittatur, nullum his balneis præsentius ad Paralyſim remedium reperiet. Interea pyroticum occipitio inurendum. Cucurbitulæ per interualla vertici capitis, prope spi-

nam , brachiis & cruribus admoueri possunt. Sed de missione sanguinis ne cogitandum quidem , cuius euacuatione corpus magis refrigeratur.

DOCTOR IV.

Virginis Cachectica historiam Baccalaureo proponit.

FOrmosa virgo , vigesimum annum agens, naturâ benè temperata, sed iamdiu intemperanter viuens, ac vitiosa salubribus alimenta præferens, non (vt antea) viuido colore florens, sed pallido squalida conspicitur; nec eius corpus (vt olim) pròptum & alacre , sed graue atque iners animaduertitur, menses antehac profusi, nunc parciùs fluunt, lenta tenetur febricula, respiratio læditur, appetentia deiicitur, spontanea lassitudo sentitur, hypochondriû sinistrû tensû ac subdarû deprehenditur.

Hac generosa virginis symptomata tibi significo, quibus Affectus speciem, sedem, ac causam dignoscas, eiusque euentum præsagias, vt curationem demùm instituas.

BACCALAVREVS.

Opertam morbi diagnosim recludit.

Affectus generosæ Virginis, Icterus albus à quibusdam appellatur. Cachexia est pituitosa, quam venarum mesaraicarum obstructio peperit, ex sanguine crasso, qui singulis mensibus non satis superque, ut consueuerat, per vterum expurgatus, ad lienem recurrit. Ideò ipsum primò affectum esse, hypochondrii sinistri tensio & durities indicant: cui cōsentit non modò ventriculus, euchymos inde cibos fastidiens; sed etiam iecur, frigidam intemperiem contrahens, quia calor innatus obruitur.

Vnde color pallidus ex albo mixtus in facie apparet. Adest nihileminus febricula, quia ob impeditam trāspirationem, humor licet frigidus putredinem concipit. Respirandi difficultas accidit, quia muscoli thoracis ex sanguinis copia pigri sunt.

Vnde respiratio quidem frequentior ob vsum, sed minor, quoniam ar-

Etatur interna thoracis capacitas. Tensiva lassitudo sentitur, in qua & corpus & artus omnes ægrius præ pondere mouentur; quia turgentes præ copia sanguinis venæ maiores, se in minores exonerant; vnde musculofas carnes impleri, distendique contingit.

Causa mali procathartica, fuit improba victus ratio, ex crassis viscidisque alimentis: antecedens verò plenitudo sanguinis sæculenti emphraxim potissimum in liene facientis, & vaporum hystericorum angustia.

Euentum prædicit.

Cachexia hæc pituitosa, quâ virginis nitor squalet, viuidique coloris flos perit, leucophlegmatiam minatur. Ac licet corporea moles plenior videatur, non minus tamen periculum diathesis eiusmodi portendit, quàm Atrophia, in qua extenuatum corpus sensim contabescit: quia in vtrâque corporis, viriûmq; robur elanguescit; in hoc quod nulla prorsus, in illa quod vitiosa sit nutritio.

Curationem instituit.

Curationis scopi sunt lienis, iecoris, totiúsque mesenterii obstructions soluere, ac vna eadémque opera menses parciore prouocare. Sed quia obstructions fiunt ob plenitudinem, crassitiem & lentorem humorum, plenitudo in primis démenda, dein ad ea, quæ aperiunt, attenuant & incidunt, veniendum, vt docet *Gal. 8. Meth.* Eductis igitur crassioribus è prima corporis regione excrementis, bolo ex cassiæ recenter extractæ ℥. j. cum hieræ picæ ℥. j. mittendus erit sanguis pro viribus è basilica sinistra; & instante menstruorum tempore, è saphena sinistra. Euacuato corpore, ad ea transeundum erit quæ aperiendi vim habent, inter quæ oxymel simplex commendatur; quod fortius fiet, si in decocto radicum cichorij & filicis, foliorúmque calaminthæ, pulegij, thymi & hyssopi exhibeatur. Alternis vicibus purgandus humor superuacaneus, diluto ℥. j. rhabbarbari, ℥. ij. agari-ci, ℥. ss. salis tartari, cum decocto ℥. ij.

Ff iiij

fol. Oriental. addita syrupi rosarum pallidarum $\mathfrak{z}.$ j. Quin & vomitus quandóque prouocandus, data Ferneliani emetici $\mathfrak{z}.$ j. cum iure pulli.

Ad attenuandos insuper, incidentóque humores crassos & lentos, & aperiendas simul obstructions, decoctum corticis radicum capparis & tamaricis, foliorúmque scolopendrij & agrimonix, in quo trochisci de capparibus dissoluantur per aliquot dies exhibendum. Spadensiu deinceps aquarum vsus, 20. dierum spatio, valdè profuturus est, ad viscerum soluédas emphraxes, pristinámque temperiem restituendam. Extrinsecus adhibendus erit fotsus circa hypochondrium sinistrum, ex vino, aceto & oleo capparum. Parádúmque hoc linimétum: \mathcal{L} . olei de capparibus $\mathfrak{z}.$ j. medullæ crurum vituli, pinguedinis anseris, ammoniaci aceto dissoluti an. $\mathfrak{z}.$ ij. aceti $\mathfrak{z}.$ j. cere q. s. fiat linimentum; quo, post fottum, inungatur lienis regio. Agrotans interim, quæ nimio perè hæctenus genio indulsit, salubrem victus rationem diligenter obseruet, ex cibis euchymis & eupeptis, crassáque & corru-

ptibilia edulia aspernetur: pro potu, vino moderatè vtatur, aut hydromelite dilutissimo; immodicum & intempestium aquæ, vt & crudorum fructuum vsum fugiat. Quòd si malum præfatis non cedat auxiliis, accuratâ etiam viuendi lege obseruatâ, ad vsum chalybis pergendum erit: quod præstantissimum est omnium remedium, ad apericendas omnes viscerum obstructions, si rectè administretur.

D. Nouissimi huiusce remedii qualitatem, quantitatem, vtendi modum & tempus, ex te audire cupio.

B. Chalybs nihil aliud est, quàm ferrum expurgatum, cuius puluis, ad vomitum ciendum, & viscerum infarctus expediendos efficacissimus experientia comperitur, quia mordacitatem quandam habet. Quibusdam hac vi præditus videtur, propter sulphur & mercurium, quorum particeps admodum ferrum est, cùm sit metallum valdè impurum.

Ob eam participationem, chalybis puluerem abstergendî, repurgandi & obstructos meatus aperiendi facultatem

te dotatum censent. Sed si priuetur suo sulphure & mercurio per multiplicem ignis admotionem, & ablu- tionem, (qua ratione fit Crocus Mar- tis;) tunc adstringendi vim habere cō- tendunt. Idcirco solam ferri limatu- ram, nulla vstione & ablutione altera- tam exhibent, eamque Croco Martis efficaciorē, tutiorē & conuenien- tiorem fœdis virginum coloribus de- lendis asserunt.

Alij non nisi præparatum præscri- bunt chalybem, qui tum Croci Mar- tis nomē sortitur: partim à ferro, quod Marti tribuitur; partim à colore, qui crocum ementitur.

Duæ præ cæteris vſitatæ Croci Martis præparationes extant: vna Pharmacopœis familiaris, qui scobem chalybis semel atque iterum, vel etiā pluries in crucibulo vrunt, & toties abluunt, partim in aceto, partim in aqua rosacea, aut aqua cichorij, vel oxalidis; nonnunquam in vino, vel aqua vitæ, aut alio liquore idoneo; postea exsiccant, efficiuntque pulue- rem subruſsum, & ponderosum, quem præparatum chalybem nuncupant.

Altera Chymiatris peculiaris, qui puluerem ipsum ex se grauissimum arte sua volatilem efficiunt. Primum quidem limaturam chalybis, aut ferri assumunt; in igne reuerberij diem vnum aut alterum adurant; deinde vbi amouerint, in aquam coniiciunt; quod supernatat assumunt, & seruant: tum abiecta aqua, quod in fundo remansit, denuò ad ignem reuerberatorium iniiciunt, aduruntque vt prius, & postea in aquam demittunt, vt supra; cui, quod supernatat, seruât. Et si quid eius fundum petierit, rursus cremant, donec aquæ demissum non subsidat, sed in ipsius superficie maneat, quod tandem colligendum, siccandum, & seruandum pro Croco Martis optimo.

Aliquando etiam sulphure præparatur, in hunc modum:

Lamina chalybis vel ferri in fornace ardente primum ignescit, deinde apponitur sulphur, quod ipsum liquat in guttas, quæ deorsum in vas subditum cadunt; postea mundatur à sulphure, ac tunditur in puluerem. Sic præparatus chalybs maiorem vim

E. f. vj.

habet penetrandi.

Rasura chalybis quandoque in puluerem tenuissimum redigitur, ad iecoris oppilationes: nonnunquam datur non comminuta, aut vehementer trita, vbi obstructions sunt in primis vijs, aut in liene.

Pulvis chalybis sæpè cum alijs pulveribus aperientibus & cardiacis pro iudicio Medici præscriptis mistus exhibetur, hoc modo:

℞. scōbis chalybis præparatæ ℥. β. specierum diarrhodôn Abbatis, & aromatic. rosati, ana ℥. ij. seminis anisi & cinnamomi ana ℥. j. sacchari rosat. ℥. iiij. fiat omnium pulvis subtilissimus. Capiat cochlear vnum, quotidie mane, per tres horas ante cibum, vel dissoluatur in vino generoso. Interdum solidi aut mollis electuarij forma datur, hoc modo:

℞. limaturæ chalybis præparatæ ℥. β. cinnamomi ℥. j. sacchari in aqua rosarum soluti ℥. iiij. fiant tabellæ pondere ℥. ij. Capiat quotidie manè vnam.

℞. rasuræ chalybis cum vino præparatæ ℥. β. specierû diarrhodôn Ab-

batis. ʒ. ij. conseruæ rosar. & buglossi.
ana ʒ. ij. misce, fiat Opiata, qua vta-
tur singulis matutinis, ad magnitu-
dinem castaneæ, per tres horas ante
cibum.

Aliquando chalybis scobi, ad aluum
pariter subducendam, cathartica ad-
duntur: plerumque splenica, hysterica,
aliæve partibus affectis conuenientia
permiscuntur; ex quibus bolus, vel
catapotia fiunt, hoc modo:

℞. præscriptæ confectionis è cha-
lybe ʒ. iiij. pulu. rhabarb. & zalapi.
ana. ʒ. ss. misce, fiat bolus.

℞. limaturæ chalybis præparatæ
ʒ. ss. extracti chelidoniij ʒ. ij. myrrhæ,
croci, cinnamomi, an. ʒ. ss. castorij.
℥. j. cum syrupo de artemis. fiat massa,
ex cuius ℥. j. formentur tres pilulæ,
singulis matutinis deglutiendæ.

Sumpta chalybis scobe, exerceat
corpus per horam saltem.

Exercitium siquidem deducit me-
dicamentum & distribuit in venas.

Post exercitium ingrediatur lectū,
ac sudet, si fieri potest.

Huius medicamenti vsus per 15.
aut 20. dies continuandus.

Si menstrua tamen erumpant , super-
sedendum.

Attenuans interim victus ratio de-
cernenda.

Tempestivus rasuræ chalybis usus
est, vbi præparati fuerint humores, &
corpus satis vacuatum.



EXAMEN II.

BACCALAVREORVM,
AD IMPETRANDAM
MEDENDI

Licentiam.

DECANVS.

RECENTEM DE ABSCESSV
*in Mesenterio historiam postridie
Baccalaureo recenset.*



ENEROSVS iuuenis,
temperamento ca-
lido & humido, ha-
bitu gracili, citra
Hydropis suspicio-
nem, duro quodam
ventris tumore, non

ita pridem tentatus est, qui non nisi
pressu dolorem inferebat, sed sua mole
intestina premens atque coarctans,
alui deiectionem remorabatur; nec

rubor, nec calor præter naturam extrinsecus conspiciebatur, grauitatis sensus duntaxat altè percipiebatur: febris admodum leuis & lenta, sine siti, sine grauibz symptomatis comitabatur, nec omnino ægrum prosterrens, nec quotidianas functiones interpellans. Principio sanies quædam rubra, ac tandem pus album magna copia defluxit ab aluo, non permistum alui fæcibus, sed seorsum & syncerum. *Perdocte Baccalauree, ex hac symptomatum recensione, morbi diagnosis & prognosim deprome, quæque curatio tibi videatur idonea protinùs expone?*

BACCALAVREVS

Morbi diagnosis patetfacit.

TVmor præter naturam qui ingenuum iuuenem exercuit, exquisita Phlegmone erat in mesenterio genita sanguine è venis mesaraicis, ruptis aut exesís in hanc partem effuso, qui tandem suppurans Abscessum fecit ad postrema intestina vergentem. Quo rupto pus per venam proximam

in recti aut coli intestini capacitatem influxit. Nec enim musculus abdominis insisteret Phlegmone, quoniam epigastrium rubore, calore, dolore etiam citra pressum fuisset affectum; quod pars ea sensu prædita sit. Nec adipis copiâ venter prominebat, quia reliquus corporis habitus obæsiore extitisset. Sed non aliunde syncerum pus, quam ab affecto mesenterio dimanare potuit. Neque enim ab inflâmatâ intestinis, neque à vetriculo potest sine vehementi dolore prodire. Ex iecoris verò aut ex lienis inflâmtione, febris vehementior affligit, omnia symptomata fiunt grauissima. Neque tam syncera sanies seorsum ob longiorem viæ tractum exit. Renes etiam affecti non illac, sed per vrinas repurgantur. Itaque vnum mesenterium reliquum est in abdominis capacitâ. quod inflammatione in abscessum degenerata corripî potuerit. Neque id quidem mirum, cum doctissimus Fernelius, cholerae, melancholice, diarrhoeae, dysenteriae, cachexiae, atrophiae, languoris, lentarum errantiumque febrium, latentium denique.

morborem causas in mesenterio animaduertisse profiteatur: quia tãta sepẽ superuacuum est humorum colluuiẽ, vt destinatis à natura receptaculis tota excipi haud possit. Ac tum non parua superfluentis portio in vicinas quoque sedes illabitur, maximẽ in pancreas & in mesenterium, quæ totius corporis veluti sentina sunt. Quibus ergo assidua ingluuie magnus fit vtriũsque bilis & pituitæ prouentus, eas tempestiuẽ non expurgatas natura valens ac robusta plerũque in pancreas & in mesenterium ignobiles sedes deponit, idque ferẽ è iecore, & è liene per eos venæ portæ ramos, qui non in intestina, sed in ipsum mesenterium & pancreas desinunt, & obliterantur.

Prognosis auguratur.

Quod ad prognosim attinet, haud arduum ab initio præfagire salutarem fore morbum, quia inflammatio sine manifesto dolore erat, solũque grauitatis sensum habebat, nisi cùm vehementiũs premebatur; nec febris

acuta, sævis stipata symptomatis. Non me terret historia Beniuenij, *cap. 32. de abditis morborum causis*, iuuenem quendam, nomine Iulianum, diris alui torminibus diu vexatum, tandem ex abscessu mesenterij mortuum enarrantis, in quo materia multa nigrior, foetensque reperta est, encausto sutorio similis. Atra quippè bilis eò confluens huiusmodi abscessum effecerat. Nec me latet hunc affectum quandòque *πληγόνιον* esse. Dodonæus enim quandam nouit inflammatione mesenterij in abscessum conuersa tentatam, quæ singulis diebus per anum, bis, terve purulenta admodum foetida, syncera, nullisque excrementis permixta, quatuor annorum spatio redidit.

Curationem suscipit.

Ad durum mesenterij tumorem sine inflammatione curandum, frequens purgatio conuenit, sub potionis, apozematis ac syrupi formâ, in quibus folia Orientalia, rheum & agaricum infundantur. Clysteres etiam

remolliētes & detergentes iniiciendi.
Fotibus insuper, oleis, cataplasma-
tis malacticis, balneis aquæ tepidæ, vt
& enematis ex decocto omasorum,
capitis veruecis & vituli, sæpè repetitis
remolliendus est ille tumor. At cùm
phlegmone eam partem occupat,
præter præfata remedia, secanda basi-
lica dextra, bis, tēr, quater, si opus sit.
Quòd si resolui nequeat, cataplasma-
tis suppurantibus pus promouendum.
Cùm autem rupto abscessu per anum
vacuatur, iuuanda natura est clysmis
tergentibus & putredinem inhiben-
tibus, ex decocto hordei integri, agri-
monia, absynthij, centaurij minoris,
terebinthina, melle rosato. Sed his
adiungenda sunt cardiaca, vt muniā-
tur partes nobiles. Nam facilè tetris
vaporibus inde sublatis offenduntur.
Aquæ præterea Spadanæ aut Puganæ
ad eluendas mesenterii illuuias appri-
mè conferunt.

DOCTOR II.

DE CRVENTA VOMITIONE

*& deiectione historiam refert**Baccalaureo.*

SPECTATISSIMO cuidam viro, plethorico, floridæ ætatis, in otio desidi, opiparis epulis victitanti, vomitio simul & deiectio sanguinis cōcreti & picis instar nigri repentē contigit. Conquerebatur antea de ventriculi dolore & hypochondrii sinistri tensione. *D. Baccalauree, Symptomatis huiusce causam exponas, euentum predicas, & summa curationis capita perstringas vèlim.*

BACCALAVREVS

Suam de proposito affectu sententiam ostendit.

Sanguis ater & grumofus, qui egregio viro per superiora & inferiora erupit, à splene per eas venas, quas ha-

bet cū ventriculo communes, fluxiffi videtur. Meam opinionem confirmat tensionis sensus in hypochondrio sinistro, cum dolore ventriculi. Sanguis quippè melancholicus sub præcordijs fluctuans, cū ob lienis obstructionem, ab eo recipi non possit, hinc inde in ramos venæ portæ re- meat; sicque venas quæ ad ventriculum & intestina feruntur repleuit, ut earum tunicæ præter modum distentæ fuerint reseratae. Vnde superfluous sanguis exiliens, tenuior quidem in ventriculum effusus, vomitu rejicitur; crassior verò intestina de lapsus per aluum detruditur. Hic affectus hæ- materia dysenteria impropriè vocatur: Splenici fluxus nomen magis illi quadraret. Iis plerumque accidit, quibus aliquod membrum abscissum, aut neglecta exercitatio est. Quòd ad prognosim attinet, metus est, ne æger concretum sanguinem vomendo, repente suffocetur. Periculum insuper ne profusiori hæmorrhagia perseuerante, in hydropem incurrat: nève sanguis in ventre coagulatus alia inuehat symptomata longè perniciosius.

ſima, quocirca curationi diligenter incumbendum. Ad demendam plethoram adminiſtranda protinus phlebotomia. Ampla dein cucurbitula ſupra ſplenem aut medium ventrem apponenda. Immoderatus ſanguinis fluxus ſumptis & admotis medicamentis quamprimùm ſiſtendus, quia vires mirum in modum deijcit. Iulepus ex ſuccini ꝯ. j. ſyrupi acetoſi ꝯ. j. & aquæ portulacæ ꝯ. iiij. paratus, ex uſu erit. Fotus ex æquis partibus aceti & aquæ portulacæ, circa hypochondrium ſiniſtrum cum ſpongia adhibendus. Farina hordei in oxycrato cocta ſupra lienis regionem applicanda. Poſt fotum injiciendus clyſter ex decocto hordei & roſarum, cum melle roſato. Utendum ſyrupo acetoſo, cum aqua chalybeata & pauco aceto, ad impediendam ſanguinis in ventre coagulationem. Sanguinis fluxu utcūque ſedato, pergendum eſt ad ſplenis obſtructionem expediendam. Sed id præſtandum medicamentis aperientibus minimè calidis, ne ſua caliditate venas recludant, fluxumque accerſant. Quale erit apozema pro

pluribus dosibus paratum, ex decocto
 radicum cichorii, rubiæ maioris &
 tamarisci, herbarum capillarium,
 borraginis & portulacæ, seminum
 frigidorum maiorum, florum cor-
 dialium & genistæ, in aceto &
 aqua absynthij Rom. facto: cuius
 colatura saccharo sit condita, ac san-
 talo albo & cinnamomo aromatisa-
 ta. Post usum apozematis, catharti-
 ca potio bis in hebdomade decer-
 nenda, ex polypodij querni ℥. j. se-
 minis carthami ℥. ℞. folior. Orien-
 tal. ℥. iij. & epithymiz. j. decoctis
 in iure galli antiqui, passulis & cap-
 paribus facti, in cuius colatura
 mannæ ℥. j. cum syrupo rosar. pallid.
 ℥. ℞. fuerit dissoluta. A purgatione
 opiata conficienda erit, ex confer-
 ua florum cichorii & tamarisci, cap-
 paribus in aceto conditis & puluer.
 diarrhodon, cum syrupo acetoso, ho-
 ris matutinis ad quantitatem auellane
 exhibenda. Interim victus ratio te-
 nuis & refrigerans instituenda.

DOCTOR

DOCTOR III.

DE DYSENTERIA

Hepatica, ab intemperie calida, historiam Baccalaureo recitat.

STRENVVS Mñes annum trigessimum quintum agens, temperamento calido & sicco, æstate superiori, à piperatis eduliis, quæ in deliciis illi erant, ac vini meracioris liberaliori potu, Tertianæ febre longè acutissima tentatus est, quæ in continuâ lentam tandem degeneravit, ictero comitatum: cuius confectaria fuit cruenta deiectio loturæ carniū recens matatarum similis, ad hunc usque diem perseverans. Celerior etiamnum pulsus, vrina flauo colore saturata, oris amaritudo, prostrata appetentia, sitis vehemens, frequens vomitus, virulentus & æruginosus. *Perdoctæ Baccalauræ, tuæ partes sunt, affectus speciem, causam & sedem demonstrare, eventum præsagire, accuratorem persequi, si quæ speranda est. Sed paucis id præsta verbis.*

Gg

BACCALAVREVS.

Summe Affectus diagnosi, prognosi, & therapia, iudicium promulgat.

Hic affectus Dysenteria hepatica dicitur, licet improprie, quia non à læsis intestinis, sed per illæsa intestina ab hepatis acriora fit. Debilitatis autem hepatis causa, est intemperies calida, ægrotantis ætati, complexioni, tempori, ac victui, morboque præcedenti consentanea, quam color faciei flauus, celerior pulsus, vrina flaua, deiecta appetentia, sitis inexhausta & vomitus biliosus manifestè produnt. Calor quippè præter naturam humidum primigenium, caloris nativi (qui omnium est functionum opifex) pabulum absument, spiritus cò perfusos exoluit, proinde vires prosternit. Itaque nihil mirum si hepar imbecillius à calida intemperie reddatur.

Quod ad prognosim attinet, hic morbus longè periculosissimus est. Grauis quippe metus ingruit, ne biliosa sanies (cuius magnum intempe-

riescalida prouentum facit) per substantiam iecoris effusa, nec opportuno tempore expurgata putret; ipsúmque parenchyma (cuius est proprium munus hæmatosis) labefactet, & tandem corrumpat: & ita corpus atrophía, & tabe conficiat. Quamobrem, vt imminēs exitium auertatur, aggredienda quamprimùm curatio. Ad quam moliendam decernenda quæ refrigerando & corroborando, biliosam illuuiem expurgant, & iecoris obstructionem soluant. In eum scopum parandus syrupus solennis, quo singulis hebdomadis vtatur, ex lb. j. decoctionis radicum cichorii, oxalid. oxylapath. folior. agrimon. hepaticæ, plantag. semin. frigid. maior. florum cordial. rosar, & passular. cum pari quantitate sacchari rosati, cui infusio ℥. iij. rhabarbar. el. & ℥. ij. cinnam. santal. citrin. rasur. ebor. & corn. cerui fuerit admixta. Exhibeantur ℥. ij. pro dosi, in aqua cichorii & agrimon. dissolutæ. Frequens etiam cassiæ vsus, profuturus est, modò eius humiditas puluere rhabarbari emendetur. Aliis diebus quibus non pur-

gabitur, capiat tabellam vnam electarii trionfantalôn, cum rhabarbaro triplicato: vel electarii ex rasura eboris, cornu cerui, corallo rubro, margaritis, terra sigillata, & saccharo in aqua agrimonie dissoluto, parati. Adhibeatur hypochondrio. dextro fatus ex absynthio, agrimonia & rosis rubris in oxycrato coctis: & litus ex cerato fantalino in oleo cydoniorum dissoluto, vel ex succis absynthii, & agrimonie, in aceto & oleo rosato coctis, addito mastiches momento. Ager interim alimentis vescatur euchymis & eupéptis. Abstineat à falsis & piperatis, à fructibus horariis, & iis qui facile corrumpuntur & putrescunt. Vinum, etsi morbo occasionem dedit, vsurpandum tamen est, sed aqua agrimonie aut cichorij dilutum. In iusculis incoquantur, ad iecoris robur tuendum, bilem per vrinas educendam, & calidam intemperiem emendandam, agrimonia, pimpinella, cerefolium, cichorium, oxalis, oxylapathum, buglossum & borrago. Si quæ sit curationis spes, his mihi videtur tentanda remediis: non venæ sectio.

ne, quæ in tanta virium imbecillitate mihi suspecta est; nisi fortè parca manu sanguis detrahatur, utpote ad ζ . ij. vel iij. non vacuationis, sed reuulsio- nis & ventilationis ergo.

DOCTOR IV.

*DE FLUXU HEPATICO,
ab intemperie frigida, historiam
Baccalaureo enarrat.*

MONACHVS quidam sexagenarius, pituitosus, carniuor, somnolentus, crudorum fructuum esui, & in ingressu lecti intempestino frigida potui assuetus, ingruente Hyeme fluxu sanguinis aquosi, loturæ carni-um recens maceratarum haud absimili, correptus est. Color faciei pallidus, pulsus tardus, vrina alba, alræs tenuis, aliàs crassa, ingens appetentia, nulla sitis. D. Baccalauree, tuum est ex hac symptomatum exegeſi, diagnosi, prognosi, ac therapiam morbi reducere.

Gg iij

BACCALAVREVS

*De proposito morbo suam affert
opinionem.*

CRuenta alui proluues, qua religiosus vir iamdiu laborat, non est vera dysenteria, ab intestinorum exulceratione profecta; quia sine torminibus fit. Sed fluxus est crudi sanguinis, ortus ab hepatis imbecillitate, quam frigida contraxit intemperies, diagnosticis pituitosæ (cuius est soboles) cacochymię signis cōspicua; cū antecedentibus, vt ægro-
tantis complexionē, ætate, viuendi consuetudine, & anni tempore; tum consequentibus, vt pallido faciei colore, pulsu tardo, vrina alba, & alijs symptomatis. At non ab attractricis, sed alteratricis facultatis debilitate oritur. Cū enim facultas attractrix imbecillior est, non attrahitur chylus è ventriculo & intestinis in hepar, sed in aluum descendit. Hepate verò attrahente, sed non alterante chylum, simile quid loturæ carniū, aut sanguini, quem aqua diluerit, excernitur; quia frigidiorē hepate alteratrix

infirmā est. Itaque crudior adhuc sanguis, nec coctione crassitiem adeptus elabitur, vnde per intervalla excretus loturam carniū repræsentat. Quodd ad Prognosim attinet, morbus profectò chronicus est, nec periculi prorsus expers. Minatur enim hydropem, nisi quāprimū illi occurratur. Quocirca curationi diligenter incumbendum. Ad quam methodo instituentdam, pituita in corpore luxuriāns, primū præparanda, dein purganda, & quolibet modo iecoris obstructio liberanda, frigida demum intemperies corrigenda, imbecilliórque facultas roborāda. Ad propositos curandi scopos consequendos, præscribendum imprimis apozema, pro pluribus dosibus, ex decocto radicū enulæ campanæ, cichorij, aliarūque aperientium, folior. agrimon. absynth. hepaticæ, chamædryos & capillarium omnium, semin. anis. fœnicul. florum anthos & stœchad. ac passul. in quo syrupus de s. rad. & syrupus è cichor. dissoluantur. Cathartica deinde potio imperanda, ex rheo, agaric. & foliis Orientalibus, in

præfato decocto hepatico separatim
infusis, quorum colaturæ syrupus
rosar. siccarum adijciatur. Tum
opiata concinnanda, ex conferuis flo-
rum cichorij, betonic. rosarum, sym-
phyti maior. carne cydon. & myra-
bolan. conditis, aromatico rosato,
corallo rubro, rasura ebôris & corn.
cerui, cum syrupo de absynthio, qua
vtatur æger manè & vesperi ad crassi-
tiem auellanae. Extrinsecus etiam ad-
hibendus fœtus ex radice enulae cam-
panae, cyperi, calami aromatic. folior.
absynth. agrimon. puleg. organ. se-
min. anis. & fœnic. floribus chamae-
mel. melilot. & rosis rubris, in aqua
& vino rubro decoctis. Et litus ex
oleo rosato, absynthino, cerato san-
talino, mastiche, & tantillo ceræ.
Victus interim nec tenuior, nec ple-
nior, ex euchymis alimentis, & con-
coctu facilibus, decernatur. Vino ru-
bro aqua chalybeata diluto vtatur.
A frigida potu, ab acetarijs & à
fructibus horarijs abstineat.

*DECRETVM MEDICÆ
Facultatis à Decano
pronuntiatum.*

PERDOCTE Baccalauree, tuis
sagacissimis responsis satis-
fecisti nobis. Ego Medicæ fa-
cultatis authoritate fretus, im-
petratâ medendi licentiâ, coro-
nam tuis meritis dignam tibi
dabo.

IN CLARISSIMI VIRI
D. N. AB. FRAMBESARII,
OPERA MEDICA, CVM
Gallico, tum Latino idiomate,
denuò edita.

HEXASTICHON.

GALLIS HIPPOCRATES quòd
FRAMBESARIUS audit,
Hoc habet ex illo quò iuuat auxilio:
Dum tamen ille suâ, ast hic linguâ
pollet vtrâque,
Hôc certè maior creditur HIP-
POCRATE:
Scilicet ille suis tantùm sua scripserat
olim,
Hic scribítque suis, scribit & hic
aliis.

GVIDO PATINVS, *Bellouacns,*
Doctór Medicus Parisiensis.

Eucharistica hæc Anagrammata

D. FRAMBESARIO,

CELEBERRIMO DOCTORI
ac Professori, Regiôque
Medico,

Georgius Baugnonius Viridunens Medicus.

D D.

**NICOLAUS ABRAHAMVS
FRAMBESARIVS.**

**NOBIS SACRA FIAS MVSARVM
LAUREA.**

Abdita Musarū penetrat labor improb^{us}, illū
Expetis, vt fias laurea sacra mihi.

**AN LABOR HIC, SIT FAMA AVREA
SVRSVM?**

Inuigilasse iuvat Musis, labor aureus esse
Dicitur, an manet hunc aurea fama polis?

Gg vj

EMENDANDA.

P Ag. 57. l. 25. & p. 65. l. 12. *lege colore pro calore.* p. 95. l. 15. *vora pro verò.* p. 101. l. 21. *prolectantes pro prolectantes.* p. 133. l. 18. *respirationem.* p. 158. l. 26. *tubercula pro tabernacula.* p. 187. l. 19. *alterna pro altera.* p. 190. l. 18. *sed pro seu.* p. 205. l. 1. *lege sanguis pro sanguinis.* p. 207. l. 27. *in margine melancholicæ pro pituitosæ.* p. 209. l. 11. *pro τὸν.* l. 11. *λίπνι pro λίπνι.* p. 213. l. 24. *sanguis pro sanguinis.* p. 219. l. 4. *per effluxum, aut κατ'.* p. 243. l. 18. *prostitant pro pruritant.* p. 249. l. 20. *τιτέλιδος.* p. 254. *in margine Myurus pro Myrrhus.* p. 255. l. 6. *vsum pro vsuum.* l. 19. *aliæ externæ, aliæ internæ.* p. 256. l. 7. *at pro ac.* p. 259. l. 11. *cacochymia.* l. 19. *contenti pro contenta.* p. 260. l. 1. *magnis pro magis.* p. 271. l. 15. *corpore pro coopore.* p. 281. l. 26. *singularem pro singularum.* p. 291. l. 14. *item pro idem.* p. 301. l. 10. *calor pro color.* l. 15. *turbida fueris.* p. 363. l. 2. *conseruationem pro conuersationem.* p. 364. l. 6. *vnuerfim, an sensim ac.* p. 366. l. 3. *Causa duplex statuitur.* p. 368. l. 10. *τιντίς pro πρῶτης.* p. 377. l. 19. *ætatibus.* p. 383. l. 18. *tutius pro totius.* p. 384. l. 9. *octauo ac nono.* l. 15. *clystere vel balano.* l. 18. *in ventriculo, aut in vicinis partibus exuperet.* p. 408. l. 15. *demendæ pro demenda.* p. 416. l. 14. *aerîa pro aëreo.* p. 425. l. 8. *affuerit pro affueri.* p. 438. l. 10. *calefactas pro calectas.* p. 440. l. 26. *dele in.* p. 452. l. 16. *lege Hæ pro Has.* l. 27. *est pro &* p. 454. l. 11. *refrigerans pro re-*

frigeratis. p. 493. l. 8. retunditur *pro* retundit.
 p. 496. l. 23. aut bis in hebdomade purgatio
 repetenda. p. 505. l. 2. corpus *pro* corporis. p.
 516. l. 1. & 517. l. 9. interpellet *pro* interpolet.
 p. 517. l. 27. crassescit vel pigrior. p. 525. l. 6.
 morbifico *pro* mortifico. p. 534. l. 25. *αἰσθη*
σις. p. 541. l. 28. altius *pro* alius. p. 552. *in*
marginē dele catapotia. p. 560. l. 12. recte *pro*
 recto. p. 570. l. 21. Quotidianæ *pro* Quartanæ.
 p. 579. l. 8. discernitur *pro* decernitur. p. 595.
 l. 28. Galenus *pro* Galenum. p. 597. l. 1. ali-
 mento *pro* alimeno. p. 599. l. 22. aquæ *pro*
 aqua. p. 600. l. 16. conciditur *pro* concidatur.
 l. 25. miscentur *pro* misceantur. p. 602. l. 15.
 percussis *pro* percussus. l. 16. sitis, nec ardor
 insignis. p. 610. l. 9. qualia *pro* quia. p. 620. l. 3.
 Hic *pro* Hæc. p. 627. l. 3. foliis *pro* folii. l. 16.
 putat *pro* putet. p. 641. l. 1. immodico *pro* im-
 modica. p. 668. l. 18. metus est nisi. p. 670. l.
 25. aqua *pro* aquæ.



DISPUTATIONVM

MEDICARVM IN

Frambesarianis Scholis ha-
bitarum Index.

DISPUTATIO I. pag. 1.

DE Medicinæ definitione, & par-
titione, de quæ rebus naturali-
bus, in quarum contemplatione
φυσιολογία occupatur.

Disputatio I I. 172

De rebus non naturalibus, in quarum
legitimo vsu ὑγιανὴ consistit.

Disputatio I I I. 195

De rebus præter naturam, in quarum
cognitione παθολογία versatur.

Disputatio vltima. 353

De curandi methodo, quæ διεγερτικὴ
Græcis dicitur.

QVÆSTIONVM MEDICARVM
in Frambesarianis Scholis
agitatarum Series.

Disputationis 1. Quæstiones. pag. 1.

Quid Medicina. Definitur ex fine à Galeno dupliciter: ex effectis ab Hippocrate: ex subiectis ab Herophilo. Prima Galeni definitio oppugnatur. Defenditur. Altera item cōuellitur. Discutitur. Hippocratica Medicinæ definitio exagitur. Soluitur. Herophileæ Medicinæ definitio disceptatur. Propugnatur. Obiect. Responsio. Quot sint Medicinæ partes. Proposita Medicinæ partitio oppugnatur. Defenditur. Quæ ad consummatam Medicinæ cognitionē requirantur. Quæ & quot sint res naturales. Physiologiæ definitio & dichotomia.

De Elementis.

24.

Quid elementum. Obiectio. Solutio. Quo differant elementa à principijs. Quot sint elementa: Quo-

modo ex quatuor elementis corpus humanum sit constitutum. Quod corpus nostrum non ex pura elementorum materia, sed etiam ex qualitatibus eorum constet. Quæ sint elementorum qualitates. Quid mixtio. Quo modo fiat.

De Principiis vitæ.

31.

Vitæ Principia quæ & quot sint. Quid calidum innatum. Quid humidum primigenium.

De temperamentis.

32.

Quid temperamentum. Quotuplicia temperamenta. Quid temperamentum mixti. An sine elementorum mixtione fieri possit. Quot qualésque sint temperamentorum differentiæ. Quid temperamentum *εὐκρατὸν*. Quotuplex sit. Quid temperamentum ad pondus. Quid temperamentum ad iustitiam. Quid temperamenta intemperata, simplicia, composita. Obiectio. Solutio. Quotuplex temperamentum viuentis. Vt temperamentum viuentis, à mixti temperamento discrepet; Cum eo tamen conspiret, ad animæ functiones obeundas.

De partibus.

38.

Quid pars latè sumpta, propriè dicta. Partium prima diuifio. Quæ continentes partes. Earum diuifio. Quæ fimilares partes. Earum diuifio. Quæ & quot partes fpermatice. Obiectio. Solutio. Quæ partes fanguineæ. Quæ partes difsimilares. Cui organice dictæ. Organicarum partium diuifio. Quæ partes animales, vitales & naturales dicantur. Quæ princeps. Quæ fubminiftrantes. Princeps organum functionum animalium. Quotuplicia organa illi fubminiftrantia. Quæ organa facultatem animale deferentia. Quæ propria fingulorum fenfuum organa. Quæ motus voluntarij organa. Princeps organum functionũ vitalium. Quotuplicia organa illi fubminiftrantia. Quæ refpirationis organa, deducantia, excipientia, mouentia. Quæ pulfus organa. Princeps organũ functionũ naturalium. Quotuplicia organa illi fubferuientia. Quæ nutritioni famulentur. Organa inferuientia alimento præparando, expurgando, distribuendo. Generationi organa, cõmunia, propria. Venarũ genera 2. Vetuftũ, Nouum.

A quo inuentum. Quando & quomodo. Vt à reliquis valis Mesaraicis distinctū. Cur lactearum venarū nomen adeptum sit. Cur tandiu lacteæ venæ latuerint. Obiectio. Solutio. Cur moriente animali Lacteæ venæ euanescent. Lactearum venarum origo. Cur iecori tribuatur. Cur Pancreatis. Cur ab intestinis potius ducatur. Cur Lactes adeò tenues & pusillæ sint in hepate. Cur tantum Chyli suppeditent iecori, quantum sanguinis toti corpori nutriendo requiritur. Cur numerosæ sint ac parvæ: non paucae & amplæ. Quî per tam exiguas Lactes chylus sanguine crassior permanat. Cur chylus quem Lactes sugunt, non inquinetur à bile, quæ ad intestina de- truditur.

De Humoribus.

53.

Transitus à partibus continentibus ad contentas. Quæ & quot sint. Quot triplices humores. quid humor primigenius. quid humores alimentarij. quid excrementitij. qui & quot sint primarij humores. quid sanguis generaliter, & propriè dictus. Eius temperatura; consistentia; calor,

sapor, vsus. quibus dominatur, & quando. quid bilis alimentaria. Eius natura, temperamentum, color, sapor, vsus. quid bilis excrementitia, quibus bilis dominatur, & quando. quid melancholia alimentaria. Eius natura, temperamentum, color, sapor, vsus. quid melancholia excrementitia. quæ ætate dominatur, & quando. quid pituita alimentaria. Eius natura, temperamentum, color, sapor, vsus. quid pituita excrementitia. quæ ætate pituita dominatur, & quando. qui & quot sint secundarij humores. quomodo humores præter naturam euadant. quomodo humores naturales sint causæ sanitatis: ac humores præter naturam causæ morbifæ. quomodo sanguis à naturæ modo desciscat. quomodo bilis præter naturam euadat. quomodo intra venas bilis pallida, vitellina & atra fiat: extra venas verò porracea, æruginosa & cærulea. quomodo melancholia præter naturam euadat. quomodo pituita præter naturam euadat, cum in venis, tum extra venas. quid pituita acida. quomodo fiat falsa. quæ pituita

aquosa, mucosa, vitrea, gypsea?

De spiritibus.

65

Cur spiritus impellentium nomine designentur. quid & quotuplex sit spiritus, qui insitus, qui influens, quotuplex sit, qui animalis, qui vitalis, qui naturalis.

De Facultatibus.

69

Quid anima. Quid anima humana. Quid facultas. Cur sic appellata. Cur actionum causa ad temperiem referatur. Cur anima non sit temperies. Unde facultas dimanet. Quotuplex sit facultas. Obiectio. Solutio. Quæ & quotuplex sit facultas animalis. Quæ & quotuplex sit Princeps facultas. Quæ sit imaginatrix. Quæ ratiocinatrix. Quæ memoratrix. Principum facultatum sedes. Arabum opinio improbatur. Arabum ratio altera. Responsio. Obiectio. Solutio. Obiectio altera. Responsio. Quæ sit facultas sentiens. Quid & quotuplex sit sensus. Quid sensus interior. Quot sint sensus exteriores. Quid visus. Quid auditus. Quid odoratus. Quid gustus. Quid tactus. Quæ sit facultas mouens. Quæ sit facultas vitalis. Quid vita.

Quid mors. Quomodo facultas respirandi, & pulsfica, sint vitalis ministræ. Cur facultas irascibilis & concupiscibilis, ad vitalem sint referendæ. Obiectio. Responsio. Quæ & quotuplex sit facultas naturalis. Quæ sit facultas alatrix. Quæ facultates altricis sint ministræ. Quæ sit facultas attractrix, quæ retentrix, quæ concoctrix, quæ expultrix, quæ sit facultas auctrix, quæ generatrix, quæ immutatrix, quæ formatrix. Trium facultatum consensus. Ordo procreationis: dignitatis: necessitatis.

De Actionibus.

84

Quid & quotuplex sit actio. Intellectualium & sensibilibus actionum discrimen. Actionum voluntariarum & naturalium differentia. Quotuplices sint actiones voluntariæ. Quæ omnino liberæ sint. Quæ affectibus corporis subditæ: Functionum vitalium distinctio. An respiratio animalis sit, vel naturalis actio. An pulsus sit animalis vel naturalis motus, quotuplices actiones naturales. Quid nutritio. Quomodo fiant quæ nutritionis ministræ. Quomodo fiat attractio, re-

tentio & expulsio. Quomodo fiat
concoctio, quotuplex sit. Quid auctio.
Quid generatio. Quomodo fiat.
Quando principatum obtineat.

De administratione Anatomica. 91

Transitus à synthesi ad analysin
Humani corporis. Quomodo admini-
stretur Anatome in scholis. Cur à
ventris sectione primordium capia-
tur. Epigastrium. Regio epigastrica.
Omphalica. Hypogastrica.

De ventris Anatome. 93

Quomodo epigastrium secari soleat
in scholis. Continentium ventris par-
tium diuisio. Duriores abdominis
partes. Propriæ. Communes. Osiliū.
Os pubis. Ischion. Os sacrum. Coc-
cyx. Lumborum vertebræ. Molliores
abdominis partes. Communes, Epi-
dermis, Cutis, Panniculus carnosus.
Propriæ, Musculi epigastrii. Perito-
næum. Obiectio. Responsio. Muscu-
lorum epigastrii origo, & insertio.
Partes contentæ, Epiploon; Intestina;
Mesenterium; Pancreas; Venticu-
lus; Hepar; Vena porta; Vena
caua ascendens; Descendens, Ky-
stis felle; Lien; Renes; Vreteres.

Vesica; Testes; Vterus.

De thoracis Anatome. 102

Transitus à partibus naturalibus ad vitales. Continentium thoracis partium diuifio. Duriore thoracis partes. Clauiculæ 2. Dorsi vertebræ 12. Sternum 7. ossibus constans. Cartilago Xyphoides. Costæ 12. Molliores thoracis partes. Musculi thoracis communes. Proprii. Mammæ. Motus thoracis necessitas. Musculi thoracem inspirando dilatantes. Subclavius. Serratus maior. Serratus superior. Serratus inferior. Intercostales externi. Musculi thoracem expirando contrahentes. Sacrolumbus. Triangularis. Intercostales interni. Thoracis apertio. Diaphragma. Pleura. Mediastinum. Pulmones. Pericardium. Cor. Cordis ventriculi. Cordis vasa. Valuulæ. Auriculæ. Distributio arteriæ magnæ, ascendentis, descendentis.

De capitis Anatome. 108

Transitus ad partes animales. Caput capillatum. Facies. Collum. Synciput, Occiput, Tempora. Continentium capitis partium diuifio.

Duriores capitis partes. Caluariæ ossa. Propria 5. Syncipitis 2. Occipitis 1. Temporum 2. Communia 3. Os coronale. Sphenoides. Ethmoides. Sutura cranij. Molliores capitis partes. Communes. Cutis capillata. Panniculus carnosus. Propriæ, Pericranion, Meninges, crassa, tenuis. Partes contentæ. Apertio cranij. Duplex cranij lamina. Diploë. Cerebrum. Cerebellum. Exterior cerebri superficies. Callosum corpus. Priores cerebri ventriculi. Plexus choroïdes. Priorum ventriculorum ductus. Tertius ventriculus. Fornix. Infundibulum. Conarium. Nates. Testes. Quartus ventriculus. Epiphyses vermiformes. Medulla spinalis. Quâ similis ac dissimilis cerebro. Quomodo sit in duas portiones diuisa. Nervi. Molliores, quorum paria septem. Duriores, quorum paria triginta.

De Faciei Anatome.

117

Transitus à capite pilis tecto, ad Faciem. Faciei diuisio. Pars superior, inferior. Maxilla superior, inferior. Dentes. Maxillæ superioris ossa. 11. Oculi vtriûsque. 3. Palati. 2. Nasi. 3. Maxillæ

Maxillæ inferioris ossa 2. De faciei musculis. Frontis musculi 2. palpebræ musculi 3. Aperiens 1. Claudentes 2. Maior, minor. Oculorum musculi 6. Recti 4. Attollens, deprimens, adducens, abducens. Obliqui 2. Narium musculi. Dilatatores. Constrictores. Labiorum musculi 8. Labrum superius attollentes 2. Deprimentes 2. Labrum inferius attollentes 2. Deprimentes 2. Maxillæ inferioris musculi 10. Crotaphitæ 2. pterygoidei 2. Buccinatores 2. Digastrici 2. Masseteres 2. Linguae musculi 10. Sursum mouentes 2. Deorsum 2. Antrorsum 2. Retrorsum 2. Dextrorsum 1. Sinistrorsum 1. Os hyoïdes. Hyoïdis musculi 8. Sursum mouentes 2. Deorsum 2. Antrorsum 2. Retrorsum 2.

De Nervis per faciem expansis. 125

Nervorum cerebralium paria. Nervorum propagines. Nervorum foramina.

De partibus totum cuiusque sensus organum constituentibus. 127

Partes oculum visus organum constituentes. Partes aurem auditus organum constituentes. partes nasum ol-

Hh

factus organum constituentes. Partes
linguam gustus organum constituen-
tes.

De Colli Anatome. 130

Transitus ad anatomicam Colli
demonstrationem. Partium Colli di-
uissio. Duriore ceruicis partes. Pro-
priae. Communes. Molliores colli
partes. Propriae: Colli musculi 8. Fle-
xores 4. Longi 2. Scaleri 2. Extensio-
res 4. Transuersarii 2. Spinati 2. Co-
munes Colli partes. Capitis musculi
14. Flexores 2. Mastoidei. Extensores
8. Magni 4. Splenii 2. Complexi 2.
Parui 4. Circumagentes. Obliqui 4.
Anticae Colli partes, ad thoracem
vergentes. Larynx quid. Laryngis
usus. Compositio. Musculorum nu-
merus. Musculi laryngis communes
4. Bronchii 2. Hyothyroidei 2. Pro-
prij 10. utrinque 5. 1. Cricothyroideus
anticus. 2. Cricothyroideus lateralis.
3. Cricoarytenoideus. 4. Thyroaryta-
noideus. 5. Arytenoideus. Epiglottis.
Eius usus. Gargareon. Glandulae. As-
pera arteria. Pharynx quid. Pharyn-
gis musculi 8. Sphenopharyngei 2.
Cephalopharyngei 2. Stylopharyn-

gei 2. Oesopharyngei 2. Oesophagus
quid. Eius situs. Substantia. Vena iu-
gularis. Externa. Interna. Muscula.
Cervicalis. Arteriæ. Carotis. muscula.
Cervicalis. Nervi Recurrentes.

De Manus Anatome.

142

Transitus à corporis trunco ad ar-
tus. manus diuisio. Ossa totius manus.
Omoplatæ. Acromion. Coracoïdes.
Brachium. Cubitus. Radius. Carpus.
metacarpium. Digiti. Ossa sesamoï-
dea.

*De musculis totam manum mouenti-
bus.*

146

Musculi omoplatæ. 4. Trapezius.
Leuator. Rhomboïdes. Serratus mi-
nor. musculi brachium mouentes sur-
sum 2. Deltoïdes. Supraspinatus.
Deorsum 2. Latissimus. Rotundus
maior. Antrosum 1. Pectoralis. Re-
trosum 3. Infraspinatus. Rotundus
minor. Subscapularis. Cubiti flexo-
res 2. Biceps. Brachialis. Extensores
2. Longus. Brevis. Radii pronatores.
2. Spinatores 2. Carpi flexores 2. Ex-
tensores 2. Palmaris. musculi digitorum
flexores 2. Sublimis. Profundus. Ex-
tensores. Adductores. Abductores.

Hh ij

Musculi Pollicis. Flexores 2. Extenso-
res 2. Adductores 3. Abductores 3.

*De nervis per totam manum expan-
sis.* 153

Nervorum Brachii par. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

*De Venis & Arterijs totam manum
rigantibus.* 155

Venæ Brachii 2. Basilica. profunda.
Subcutanea. mediana. Cephalica. Sal-
uatella. Arteria Brachij.

De Pedis Anatome. 157

Transitus à confectione manus ad
Pedis confectionem. pedis diuisio.
Cruris distinctio.

*De ossibus ad totius Pedis articulatio-
nem pertinentibus.* 158

Oss femoris. Superior pars. Caput.
Trochanteres 2. Ossa cruris. Tibia.
malleolus internus. Perone. malleolus
externus. Rotula genu. Tarsi ossa.
Astragalus. Calcaneum. Scaphoïdes.
Cuboïdes. Sphenoïdea. Pedij ossa.
Digitorum ossa. Ossa Sesamoïdea.

De musculis crus totum moventibus. 161

Musculi femoris. Flexores 2. $\frac{1}{2}$ oss. Iliac-
us. Tenfores 3. Adducentes, Abdu-
centes & Circumagentes 9. Triceps.
Quadrigemini 6. Obturatores 2. Ex-

ternus, Internus. Musculi tibiæ. Flexores 4. Semineruosus. Gracilis. Externus. Biceps. Extensores 4. Rectus. Vasti 2. Externus. Internus. Femoralis, aliàs Cruræus. Adductores 2. Longus. Popliteus. Abductor vnicus. Membranofus. Musculi Pedis flexores 2. Tibiæus. Peroneus. Extensores 4. Gemelli 2. Soleus. Plantaris. Musculi digitorum flexores 2. Magnus. Minor. Extensor duplex: Magnus, Minor. Adductores 4. Lumbrici. Abductores 8. Interosſei. Musculi Pollicis. Flexor. Extensor. Adductor. Abductor.

De nervis per femur, tibiam & pedem productis.

167

Pedis totius nervi. 1. 2. 3. 4.

De venis arterijsque uniuersum pedem rigantibus.

168

Transitus ad venas & arterias. Rami Cruralis diuifio. Saphena. Ischias minor. Muscula. Poplitea. Suralis. Ischias maior. Arteria Cruralis.

Disputationis II. Quæſtiones.

172

Quæ & quot ſint res non naturales.

H h _ iij

An singulæ ad corporis tutelam necessariæ, quibus constet sanitatis tuendæ methodus.

De aëre Ambiente.

174

Qualis aër ad bonam valetudinem tuendam eligendus. Conueniens eius quantitas. Vtendi modus & tempus.

De Cibo & Potu.

175.

Qualis cibus ad sanitatem conferuandam eligendus. Quantum cibi assumendum. Cibandi modus & tempus. Qualis potus ad bonā valetudinem conferat. Idonea potionis quantitas. Bibendi modus & tempus.

De Somno & Vigilia.

182

Qualis somnus ad corporis incolumitatem esse debeat. quantisper dormiendum. quæ sit conueniens in somno forma decubitus. quod aptius somni tempus. quæ vigiliæ salubres & insalubres.

De Exercitatione & Quiete.

185.

Qualis exercitatio esse debeat. quantisper exercitium sit subeundum. Exercitationis modus & tempus. quando quies est necessaria. quæ salubris & quæ insalubris.

Questionum. 727

De Excrementis. 188

Quænam excrementa salubria. An
retentorū excrementorum euacuatio
arte molienda. Euacuationis quātitas.
Euacuationis modus & tempus.

De animi Pathematis. 191

Animi pathemata quæ & quot sint,
quæ salubria & quæ insalubria. Cur
exitialis mœror vehemens. Recens
historia nobilis iuuenis præ mœrore
vehementi & repentino mortui. Ti-
mor. Ira. Verecundia.

Disputationis III. Questiones. 195

Quæ & quot sint res præter natu-
ram, quæ distinguantur.

De Morbis. 196

Quid morbus. Obiectio 1. Solutio.
Obiectio 2. Responsio. Obiectio 3.
Responsio. Quotuplex sit morbus.
Qui morbus similis. Quotuplex sit
temperies. Qui & quotuplex sit mor-
bus organicus. Qui conformationis
morbis. Qui magnitudinis. Qui nu-
meri. Qui morbus in situ. Qui & quo-
tuplex sit morbus communis. Quid
tumor præter naturam. Quotuplex
abscessus significatio. Recens historia

Hh. iij

abscessus multiplicis in cerebro reperti. Quotuplex tumor præter naturam. Quid phlegmone. Quid erysipelas. Quid œdema. Quid scirrhus. Quid vulnus. Quid vlcus. Quid fractura. Quid luxatio.

De causis morbificis. 203

Quid & quotuplex sit causa morbifica. quæ & quotuplex causa interna. quæ & quotuplex causa antecedens. quid & quotuplex plethora. quæ plethora ad vires. quæ ad vasa. quæ differant plethora ad vasa, & ad vires. Notæ plenitudinis antecedentes & consequentes. quid & quotuplex cacochymia. Signa cacochymiae biliosæ antecedentia & consequentia. Signa cacochymiae melancholicæ antecedentia & consequentia. Signa cacochymiae pituitosæ antecedentia, & consequentia. quæ causa continens. Obiectio 1. Solutio. Obiectio 2. Responsio. quæ & quotuplex sit causa externa.

De symptomatis. 212

Quid symptoma generaliter sumptum: propriè dictum. Cur epigenema appellatum. Vnde sympto-

matis nomen deductum. Summa
Symptomatum genera. quotuplex
actionum læsarum differentia. quot
modis actio lædatur. Noxæ functio-
num animalium, principum, sensi-
lium & motricum. Noxæ functionum
vitalium & naturalium. Cur actio-
num lesionem, excretorum & retento-
rum ametria sequatur. Quid & quo-
tuplex excrementorum ametria. Quid
intelligitur substantiæ, quantitatis, &
qualitatis vitio. Cur retentorum, ne-
dum excretorum, ametria dicatur.
Quæ ad retentorum ametriam sym-
ptomata pertineant. Cur sensibiles
corporis affectus, excrementorum
ametriam sequantur. Quotuplicia
sint symptomata in sensibilibus cor-
poris affectibus. Qui sint visibiles cor-
poris affectus. Qui audibiles. Qui odo-
rabiles. Qui gustabiles. Qui tãgibiles.

De signis.

221

Quid signum, quotuplicia signa,
quotuplicia insalubria, quæ diagno-
stica, quæ anamnistica, quotuplicia
diagnostica, quæ ad prognosim neces-
saria. Cur pathognomonica inter
prognostica recenscantur, quid epige-

H h v

nomina, quid epiphænomena, quid sit
 crisis, quid crisis dictio denotet: quæ
 crisis perfectè bona, quæ imperfectè
 bona: quæ perfectè mala, quæ imper-
 fectè mala. Criticorum signorum di-
 uisio, quotuplicia sint antecedentia cri-
 sis signa. Signa tēpus & diē crisis indi-
 cantia. Signa quæ iam instantē crīsim
 indicāt. signa quæ crisis speciē prenū-
 tiāt. Vt vniuersalia petātur ex morbi,
 motu, ex affecta parte, ex ægrotātis æ-
 tate. Signa futuræ hæmorrhagiæ. Sin-
 gulorū signorū causæ. Sudoris critici
 signa. Signorū causæ. Signa diarrhœæ
 instantis. Signa imminentis vomitus.
 Signa perirrhæ. Signa crisis per abs-
 cessum futuræ. Signa crīsim comi-
 tantia. Signa laudabilis excretionis.
 Signa legitimi abscessus. Signa crīsim
 consequentia. Vt sumantur ex qua-
 litate corporis, ex actionibus & ex-
 crementis. Dierum criticorum diffe-
 rentiæ. Dies critici Principes, qui &
 quot sint. quæ dierum criticorum cau-
 sa sit materialis, efficiens, vniuersalis,
 particularis. Cur vigesimus dies sit
 potius eriticus, quàm vigesimus pri-
 mus. Cur vigesimus primus aliquan-

do criticus. Dies indices, qui & quot sint. Dies intercalares, qui & quot sint. Curreliqui dies vacui appellantur. Cur Medicinales dicti.

De Pulsibus.

245

Cur Author Candidatum de arte Sphygmica sit interrogaturus. Quid Pulsus. Quid diastole. Quid systole. Absolutæ Pulsuum differentia. 1. à mouente, vnde Pulsus vehemens, imbecill⁹, moderatus. 2. à morbili, vnde Pulsus durus, mollis, mediocris. 3. à Spatio, in quo fit motus, vnde Pulsus magnus, parvus, mediocris. 4. à tempore motus, à quo Pulsus velox, tardus, moderatus. 5. à tempore quietis, à quo Pulsus frequens, rarus, mediocris. Vt simplices Pulsus sæpius coniuncti percipiantur. Comparatæ Pulsuum differentia. A proportionē, vnde Pulsus *ισορρυθμος*, *ἰσόρρυθμος* Ab æqualitate, vnde Pulsus æqualis, inæqualis. Ab ordine, vnde Pulsus ordinatus, inordinatus. Quid Rhythmus. Vnde nomen deducitur. Quotuplex Rhythmus. Quid proprius Rhythmus. Quotuplex inæqualitas, in vna pulsatione & vna parte arteriæ. Pulsus dif-

Hh vj

sonus. Impar citatus. Caprizans. Dicrotus. In diuersis arteriæ partibus. Ratione situs, Pulsus vibratus, cōuulsiuus:ratione motus, Pulsus serratus. Vndosus. Vermiculans. Formicans. Interruptus. Inæqualitas in pluribus pulsationibus magnitudine imparibus. Pulsus æqualiter inæquales. Myxus, Deficiens, Reciprocus. Pulsus inæqualiter inæquales. Intermit-tens. Coincicens. Continentes Pulsuum causæ. Alteratrices Pulsuum causæ. Causæ quæ Pulsum vehemen-tem & languidum efficiunt. Causæ Pulsus duri & mollis. Causæ Pulsus magni & parui. Velocis & crebri. Tardi & rari. Causæ Pulsus æqualis & inæqualis. Rhythmi consoni & dissoni causa. Pulsus imparis citati causa. Pulsus caprizantis causa. Pulsus dicroti causæ. Inæqualitatis in diuer-sis arteriæ partibus causæ. Vibrati Pulsus causæ. Causæ Pulsus Conuulsiui, Tremuli, Palpitantis. Causæ Pul-sus Serrati, Vndosi, Vermicularis, For-micantis. Causæ inæqualitatis Syste-maticæ. Causa Pulsus Myuri: Inter-mittentis: Deficientis: Reciproci: In-

tercidentis: Continua inæqualitatis.
 Quæ morbi signa ducantur à Pulsu.
 Quid vehemens & debilis pulsus si-
 gnificent. Quid Pulsus durus & mol-
 lis: Quid magnus, Paruus: Quid celer,
 tardus: Quid frequens, rarus. Quid
 æqualitas in Pulsibus significet: Quid
 inæqualitas singularis portendat.
 Quid inæqualitas Rhythmi. Quid
 Pulsus impar citatus. Quid sin-
 gularis intermittens designet. Quid
 Pulsus caprizans & dicrotus. Quid
 Pulsus vibratus & Connulsivus. Quid
 Tremulus & Palpitans. Quid Serra-
 tus. Quid Undosus. Quid Vermicu-
 lans. Quid Formicans. Quid inæqua-
 litas Systematica portendat. Quid
 Myurus designet. Quid Intermittens
 Systematicus portendat. Quid Inter-
 cidens Pulsus significet. Quid ordo
 indicet in Pulsibus.

De Respiratione.

287

Quid Respiratio. Respirationis dif-
 ferentiæ. Quid significet. Respiratio
 mediocris. Quid vehemens, debilis.
 Quid magna, parua. Quid velox, tar-
 da. Quid crebra. Frequens & magna.
 Frequens & parua. Rara. Rara & ma-

gna. Rara & parua. Quid equalis, inequalis. Quid significet eupnea. Dyspnea. Orthopnea. An quis Respiratione priuatus viuere possit. Defectus respirationis causę.

De actionibus animalibus & naturalibus. 292.

Cur actiones animales & naturales, nedum vitales, sint expendendę. Cur principes animę functiones. 1. considerandę, an integrę, vel lęsę sint, Ratiocinatio, Imaginatio, memoria. 2. Sensus interior, vt sōnus & vigilia, & exteriores, visus, auditus, gustus, odoratus. 3. Motus. Cur animaduertendum. 1. qualis sit appetentia. 2. an Cōctio integra sit vel lęsa. 3. an Alius benę vel malę suo munere fungatur.

De Urinis.

295.

Transitus ab actionibus ad excreta. Quid Urina. Quos partium affectus urina demonstret. Quorum partium characterem impressum & inuistam notam urina referat. Vroscopię fundamenta. Quę in urinis consideranda. Vnde sumantur urinarum differentię, essentielles, accidentales. 300. Causę urinarum: tenuis: crassę: nę-

diocris: Clarę, turbatę, turbidę, confusę. Cur alias turbetur, alias non turbetur vrina. Causę copiosioris & parrioris vrinę. Causę colorum qui in vrinis apparent: Causę vrinarum albarū, nigrarum, rubrę, viridis, liuidę, pallidę, citrinę, flauę, subflauę, rufę, subrufę, fętidę. Quid paryphistamenon homogeneon. Cur Paryphistamena homogenea loco discrepent. An sit eadem sedimenti materia in sanis atque egris. Causa hypostaseos Farinaceę, Squamosę, Furfuraceę. Causa vrinę cruentę & purulentę. Quę distinguatur pus à semine, & à pituita. Causa atenosę & mucosę vrinę. Vnde prodeant filamenta per mediam vrinam volitantia. Quid corona. In qua vrina appareat. Quo colore prędita. Causa spumę & bullarum. Causa pinguedinis in vrinę superficie innatantis.

De signis morborum, quę sumuntur ab vrinis.

312

Quę vrina morbos certò denuntiat. Quę propriam vrinę significationem peruertāt. Quid indicet vrina tenuis: crassa, me diocris. Quid clara: turbata:

turbida: confusa. Vrina multa: pauca. Vrina alba: nigra: alba & tenuis: alba & crassa. Rubra & tenuis. Rubra & crassa. Viridis, liuida, pallida, citrina, rufa, flaua, subflaua. Quid vrina graueolens significet. Quid hypostasis indicet. Hypostasis optima quæ. Quid arguat hypostasis flaua, rubra, nigra, viridis, violacea. Diuisa, inæqualis. Quid enæorema & nubes indicent. Optima vrina quæ. Vt mutetur temperamento, sexu, ætate, victus ratione, anni tempore. Quid *κρυσώδεια* sedimenta significant. Quid *παραώδεια*. Quid *πυρρώδεια*. Quid cruenta & purulenta vrina. Quid arenosa & mucosa. Quid filamenta albis capillis similia significant. Quid corona significet. Quid spuma & bullæ significant. Quid pinguedo vrinis innatans significet. Vrina quando colligenda. Quali matula sit reponenda. Vt custodienda sit à Sole, frigore, vento. Vt turbata declaranda. Quo loco inspicienda.

Qua ratione Medicis & equariis exercitatio subeunda.

327

Antequàm de Vrina sententia fera-

tur, quæ Medicum secum reputasse oportet. Quid respondere oporteat, albâ & tenui vrinâ propositâ. Quid albâ & crassâ. Quid aureâ & tenui. Aurea & crassa, & cōfusa. Quid rubra, tenui, & cōfusa. Quid aliis coloribus prædita. Si bullans Vrina proponatur.

De Deiectionibus.

333

Cur Deiectiones spectentur. Quæ in Deiectionibus considerata. Differentiæ Deiectionum sumptæ à substantia, à quantitate, à colore, ab odore, à permistis. Causæ Deiectionis liquida: Dura. Mollis. Multa: Paucæ. Frequentis: Rara. Colorata. Alba: Nigra: Flaua: Rubra: Viridis: Fœtida. Optima Deiectio quæ. Quæ præter naturam. Quid indicat Deiectio liquida: Dura: Copiosior: Pocior: Frequentior: Rarior: Alba: Nigra: Rubra: Cruenta: Viridis: Versicolor: Putida: Purulenta: Chylosa: Mucosa: Spumosa: Pinguis. Vermes quid portendant.

De Sudoribus.

340

Quid Sudor. Sudoris materia. Quæ in Sudore considerata. Differentiæ

Sudoris sumptæ à substantia, à quantitate, à qualitàte. Causæ Sudoris tenuis : crassi : Lenti : Friabilis. Multi : Pauci. Calidi : Frigidi. Rufi : Rubri : Viridis : pulcis : Salsi, & Amari : Fœtidi : Vniuersalis : Particularis. Critici : Symptomatici. Sudor optimus qui. Pessimus qui. Qui bonus. Qui malus. Particularis Sudor, vt affectæ partis index.

De Particularibus excrementis. 345

Cur Sputa & cerebri excrementa, ad morbi diagnofin & prognofin expédenda. Vt à sputis morbi causa dignofcatur. Optima sputa quæ. Quæ lethalia. Quæ morbi breuitatem prænuntient. Quæ longitudinem portentant. Quid expectorationis defectus indicet. Quid excrementa è naribus prodeuntia fignificent.

De fignis à corporis habitu defumptis. 348

Quid in ægri facie confiderandum. Quæ facies optima. Quæ peffima. Quid fignificet facies extenuata : turgida. Supra modum rubicunda. Flaua. Nigricans. Albicans. Character mutatus. Quæ facies admodum naturali contraria. Cur Medicus linguam in-

trospiciat. Quid alienus lingvæ color indicet. Quid sapor. Quid siccitas & asperitas. Quæ hypochondria optima. Quæ pessima. Quid mollia, æqualia & anodyna significant. Quid dura, tensa, renitentia, & dolorifica. Quid crassa & extenuata.

*Disputationis IV. Quæstiones.**De Indicationibus.*

353

Quibus constituatur curandi methodus. quid indicatio. quotuplices indicationes. Cur indicatio à viribus prima perhibeatur, quid indicant Vires, quid indicant affectus præter naturam, quotuplex indicatio ab affectibus præter naturam, Cur indicatio à causa morbifica præmittatur. Cur indicatio à morbo statuatur, cum sublata continente causa protinus solvatur. Cur indicatio à symptomaticis ultima. Obiectio. Solutio. quotuplex indicatio à causa morbi, quotuplex indicatio à morbo, quæ in composito morbo præmittenda indicatio, quid coindicatio. Vnde sumantur co-

indicationes, quid contra-indicatio.

De remediis. 358.

Quid remedium, quæ in remediorum usu animaduertenda, quale remedium esse debet. Obiectio. Solutio. Ut remedij quantitas definienda ex ægrotantis natura; ut morbi magnitudine. Ut limitatiùs definiatur remedij quantitas, partium indicationibus. Ut remedij quantitas immutanda, ratione conformationis, situs, præstantiæ & sensus. Cur morbus pari contrario profligandus, & quo modo. quî semel ac vniuersim pari contrario morbus eximendus, quî lentè ac paulatim, quibus modis lentè curatio fiat, quo morbi tempore remedia ex usu sint.

De viſturatione. 366.

Quot remediorum genera, quid diæta, qualis victus ratio instituenda; quæ victus quantitas præscribenda, quis viuendi modus, quando victus tempestiuus.

De venæ ſeſtione. 370

Cur Chirurgiæ nomine phlebotomia intelligatur. Phlebotomiæ vsus quod duplex, quî differant vacuatio, reuul-

fio, deriuatio. Quæ secunda vena, ad plenitudinis vacuationē, ad reuulsionē ad deriuationē. Quæ sanguinis quātitas demenda. Vnde morbi magnitudo æstimāda. Vnde vires æstimandæ. Quī lāguidas vires ab oppressis dignoscere liceat. Animaduersiones in sanguine mittendo. Cur in sanguine mittendo obseruetur temperamentum, habitus, ætas, regio, anni tempus, cœli status, spontanea vacuatio, cōsuetudo. Quomodo mittēdus sanguis. Quo anni tēpore administrāda phlebotomia. Quo morbi tēpore. Quo die, & quā horā, quo prægnationis tēpore mulieri grauidæ secunda vena. Quæ ante venæ sectionē præparatio afferēda. An perpetuū venę sectioni præmittēda præparatio. *De Medicamento.* 385

Quid medicamentum, quotuplicia medicamēta, quæ euacuantia. Qualia cacochymix cathartica conueniant. Quæ alterantia. Qualia morbo sint adhibenda. Quā valida esse medicamēta debeant vt medicamenti quātitas definienda sit. Cur ad pharmaci quantitatem decernendam, spectandus corporis, humoris at-

que cœli status. Quomodo molien-
da purgatio. Per quæ loca. Quando
purgandum sit. Quod anni tempus
purgationi aptius. Quod morbi tēpus
purgationi accommodatius. Cur per-
fecta concoctio ad purgandum non
semper expectanda. Quod die, quaque
horâ purgandum. Quo prægnationis
tempore purgatio grauidæ muliebri
decernenda. Quando purgationi su-
perfedendum. Quæ purgationi præ-
paratio præmittenda. An perpetuò
purgationi præmittenda præparatio.
Quando alterantia ex usu sint.

Corollarium Pharmaceuticum. 401

Quibus modis in nos agant medi-
camenta. Alliotica; Cathartica. Ve-
terum Medicinæ Procerum de pur-
gandi modo sententia. Noua Merin-
doli opinio à veterum Archiatrôn
dogmate dissentanea. Merindoli
opinio refutatur à Candidato 1. Ar-
gumentum. 2. 3. 4. Cur Catharticum
humorem attrahit, non ab humore
attrahitur. Obiectio. Responsio. Quod
accuratè sint præparanda medica-
menta. Quotuplex eorum præparan-
dorum methodus. Quòd Pharma-

ceutica methodus, tam Analytica, quàm Synthetica, scitu necessaria sit Medico. Cur Chymica remedia nobilibus aptiora sint. Cur accusentur ab Aduersarijs 1. Argumentum Aduersariorum. Quòd remedia Chymica integrorum respectu, non inutilia sint. Cur analysi quàm synthesi præstet præparari remedia. Quòd remedia Chymicè preparata vires suas non amittant. Quòd partes à toto auulsæ suas retineant vires. Quòd si infusa & cocta suas retinent virtutes, multò magis Chymica. Quòd non subiecti respectu Chymica remedia inefficacia sint. Quòd peritus Artifex Chymicus non sit causa deprauati remedij. Quòd facultates remediorum Chymicorum validiores sint, quàm integrorum. 2. Argumentum Aduersariorum. Quòd Chymica remedia non sint periculosa. Quòd calida, quantumvis acria, intrò quoque accipi possint. Quòd facultates viles, licet increscant, periculosum remedium nequaquam reddant. Quòd alio fine misceantur ab arte remedia, alio à natura. 3. Argumentum Aduersariorum. Quòd

Chymica remedia non sint corrup-
tioni obnoxia. Quòd Chymica re-
media non sint, quàm oporteat, ca-
riora. Compositionis medicamentorum
necessitas. Prima componendo-
rum medicamentorum causa. 2. 3. 4.
Quâ methodo sint componenda me-
dicamenta.

DISPUTATIONVM



DISPUTATIONVM

MEDICARVM

IN EXAMINE PRACTICO
habitarum Index.

DISPUTATIO I. pag. 431

DE recta febrium Ephemerarum,
Hæcticarum, Synochôn, &
Continuarum curandarum ra-
tione.

Disputatio II. 499

De Intermittentium febrium cura-
tione.

Disputatio III. 575

De Pestilentium febrium cura-
tione.

Disputatio IV. 614

De Symptomatum febres comitan-
tium curatione.

QVÆSTIONVM MEDICARVM
IN EXAMINE PRACTICO
agitatarum series.

Disputationis prima Quæstiones. 431

Quid febris. Febris definitio oppugnatur. Defenditur. Responsio exagitur. Confirmatur. Obiectio. Responsio. Altera obiectio. Responsio. Noua obiectio. Solutio. Subiectum febris quid. Obiectio. Solutio. Galenica febrium diuissio, ex subiecto desumpta. Obiectio. Responsio. Ferneliana febrium diuissio, ex caloris præter naturam differentiis deprompta. Quibus notis dignoscatur febris Ephemera. Putrida. Hæctica. 442

Quotuplex Ephemera febris, quæ vera Ephemera. Cur veræ Ephemeræ curandæ indicatio simplex. quomodo causa externa contrario propellenda. quæ spuria Ephemera. Cur nothæ Ephemeræ curandæ indicatio duplex. Transitus ab Ephemerâ ad Hæcticam. Hæctica quæ curabilis, quæ curatu difficilior, quæ prorsus incurabilis.

Observationes in cura Hecticę febris animaduertendę, qua methodo Hectica febris curanda. Victus ratio Hecticis instituenda. Controuersia proponitur. Soluitur. Destillati restauratiui formula. Clysteris nutrientis formula. Cur lac Hecticis alimentum sit conuenientissimum. quod lactis genus eligendum. Notę lactis optimi & laudabilis. Cautiones in lactis vsu adhibendę, quantitas lactis, ciúsque bibendi modus ac tempus. An lacte hausto dormiendum vel decambulandum. Recta lactis bibendi ratio summatim expri. *Alnea Hecticis conuenientia.*

Quid à balneo moliendum. Epithemata quę, & vbi adhibenda. quomodo alui fluxor Hecticę superueniens, sit compescendus.

460

Quotuplex Synochus, quid Synochus simplex, quid putrida, quibus signis Synochus putris ab imputri dignoscatur. A qua causa utrąque excitetur, qui Synocho obnoxij, quotuplex curationis scopus. Maxima Synochi remedia. Cur in Synocho mittendus sanguis, qua quantitate, quomo-

do & quando. Cur aqua in Syncho liberaliter exhibenda. Obiectio. Responsio, quando frigide potus in Syncho ex usu est. Cautiones in frigida potu adhibende. Alia Synchi remedia. Emulsionis formula. Videtur ratio Syncho laboranti conueniens. Quomodo terminetur Synchus imputris. Putris, quid post crisin moliendum. Synchus purpureis maculis comitata, quibus praesidiis oppugnanda. Cardiacorum formulæ. Maculæ boni ominis. Maculæ mali ominis. 460

Quo differat continua febris à Syncho. Februm putridarum continuarum distinctio, quæ continua frequentior, quæ rarior, qui febris continuæ obnoxij. Sub qua febris specie Causus contineatur, quot curationis scopi, quibus remediis ad curationis scopos perueniatur, quo morbi tempore secanda vena. Cur in principio administranda phlebotomia, non in vigore febris continuæ, quoties vena secari poterit, quo die, & quâ horâ euacuatio molienda. An sanguinis missio purgationi, vel purgatio sanguinis missioni præmittenda, quæ

purgatio decernenda in principio, in declinatione. Cur morbi initio clementiora cathartica ex usu sint. Cur vehementiora initio noceant, quomodo peracuta febris curanda sit, quomodo acuta febris curanda, quibus medicamentis continua febris ex decidentia sit curanda, qualis victus continua febre laboranti sit instituentus, quis victus peracutè febricitanti conveniat, quod acutè febricitantis nutriendi tempus.

471

Quo discrepat symptomatica febris à continua primaria, quotuplex febris symptomatica. Symptomatica acuta, quì symptomatica acuta à primaria internoscatur. Cur febris fomiti sit adhibenda curatio. Symptomatica lenta, quotuplex sit, quæ febris lenta mitior. Signa febris lentæ mitioris. Cur febris lenta sit chronica. Cur fomes è vestigio querendus. In qua parte consistat, quì dignoscatur an morbi fomes sit in iecore. An fomes sit in liene. Ut lenta febris in acutam interdum degeneret, quæ febris lenta gravior, quibus notis distinguatur. Febris lentæ distinctio, quomodo curanda

febris lenta, quę per se oritur. quomodo febris lenta acutę succedat, quomodo curanda febris lenta quę alteri succedit, quis victus lentę febris à iecoris obstructione conueniat, quis lentę febris à lienis obstructione, quę curatio lentę febris à squalore & siccitate adhibenda, quę lenta febris in prauo corporis habitu curanda sit, quę remedia conueniant lentę febris qua melancholici hypochondriaci tentantur: quę curatio febris lentę, è pulmonum corruptela. 498

Disputationis II. Quęstiones. 499

Quę febris intermittens à continua secernatur. Veterum opinio de febris intermittentis materia, & eius situ. Veterum opinio conuellitur à Fernelio. quę intermittentium febrium materia statuatur à Fernelio. quę illi⁹ sedes. Frigus, horror & rigor, quo pacto corpus afficiant. Vnde ortus sui causam ducant. qua ratione inter se differant. Cur putris humor plerumque frigus solum, nonnumquam horrorem aut rigorem inducat. Cur fe-

bris plerúmque leuior : quandóque grauior. Sudorum prima scaturigo. Mercurialis obiectio 1. in Fernelium. Responsio. 2. Obiectio. Responsio. 3. Obiectio. Solutio. Intermittentium febrium differentia. quæ stati circuitus causa sit. quid humorû motus efficiat. qua ratione recurrat ordine paroxysmus. Cur paroxysmi anticipentur. Cur cunctentur. Cur longi. Cur breues. quæ febres longiores fore prænuntiant. quæ breuiores, quâ & quando intermittentium febrium permutatio fiat. Cur intermittentium febrium cura sit magni momenti. quotuplex illarum crisis. quomodo singulæ accessiones soluuntur. quomodo febres intermittentes perfectè iudicantur.

499

Quotuplex sit Tertianæ curandæ indicatio, quæ à febre sumitur, quæ à causa, quæ à symptomatis, quid ad primæ accessionis curationem requiratur. Cur in paroxysmo prohibeatur cibis. Obiectio. Responsio, quid post diem accessionis faciendum, quid in secundæ accessionis cura moliendum. quid in intermissione, quæ tertiæ de-

beatur accessioni curatio, quæ inter-
missioni: quæ quartæ periodi curatio,
quæ quintæ accessionis, & intermis-
sionis habenda cura, quæ remedia
sextæ accessionis, atque intermissionis
die præscribenda, quid septimæ acces-
sionis die agendum, quid postridie.
Transitus Tertianæ legitimæ ad spu-
riam, quæ inter se distinguantur, quæ
remedia ad Tertianam notham pro-
fligandam deligenda, quid in cura
Tertianæ nothæ diligenter animad-
vertendum, quibus signis dignoscatur,
an melancholia cum bile sit tertianæ
diurnæ causa, quibus remediis in-
stituenda curatio, quomodo præpare-
tur elleborus, quibus signis dignosca-
tur, an pituita cum bile sit diurnæ
febris causa, qua methodo molienda
curatio, qua ratione curanda febris
tertiana, quæ à prava viscerum affe-
ctione fouetur, quid tertianas produ-
cit, quomodo tertiana duplex curan-
da. Cur simplici duplex, & duplici
simplex tertiana succedat. Vulgaria
remedia ad tertianarum curationem
carpis adhibita.

A quo humore quartana intermit-

tens oriatur, quotuplex sit, quo pacto exquisita quartana discernatur à notha. Cur exquisitæ ac spuritiæ curatio diuersa, quæ in exquisita quartana victus ratio conueniat. Cur præparantia insuper ac purgantia requirantur medicamenta. Medicamenta interna humorem morbificum præparantia. Syrupi. Oxymeli. Apozemata. Vina medicata. Catapotia. Opiatæ. Externa remedia. Fetus. Litus. Emplastrum, quæ purgantia hîc conueniant, quando ex usu sint, quando secunda vena. Cur hæmorrhoidôn prouocatio suspecta, quibus emeticis vtendum, quando usurpanda sint. Peculiaria remedia ad contumaciam humoris coercendam. Topica ad horrorem discutendum. Remedia ad quartanæ nothæ curationem adhibenda. Victus conueniens. Medicamenta interna humorem morbificum præparantia. Iulepus. Apozema. Purgatio. Venæ sectio. Vomitus. Externa remedia. Fetus. Litus. Balneum. Cur quartana notha breuior, quàm exquisita. quartana salutaris, quâ terminetur. quid crisis nomine hîc intelligatur. quæ

quartanarum crises. Cur quartana hæmorrhagiâ non solvantur. quartana letalis. 746

Quotuplex febris. quotidie intermittens, quæ propriè quotidiana dicatur, quem victum exigat, quo pacto eius perficiatur curatio, quæ remedia ad robur ventriculi adhibenda. Interna. Externa. Transitus à Typicis febribus, ad erraticas. Erraticarum febrium causa, quos maximè corripiât, quæ remedia hîc conueniant. Cur citissimè adhibenda sint, quale balneum hîc ex usu sit, quomodo erratica plurium dierum contingat, quibus remediis curetur. 569

Disputationis III. Questiones. 575

Febrium genera ab Hippocrate tradita, *lib. de Flatibus*. Transitus à febribus sporadicis ad pestilentem, quâ distinguatur ab aliis. Pestilentis febris causæ. Pestilentium febrium differentia, quibus notis distinguatur. Pestilens febris simplex. Pestilens putridæ coniuncta. Salutaria febris pestilentis signa. Lethalia signa, quot curationis.

scopi. Ordo indicationum curandi rationem constituentium. Vnde sumitur indicatio. 1. 2. 3. Quibus medicamentis pestifera lues expellatur. Obiectio. Responsio. Simplicia Alexipharmaca pesti propellendæ dicata. 1. Antidotum aduersus pestem. 2. 3. 4. 5. Tempestiuus antidoti vsus. Obiectio. Responsio. quòd reliqua duo curatio- nis capita vna victus ratione obtineân- tur, quo pacto sit instituēda, ad vtrúm- que finem consequendum. Obiectio. Responsio. Cibandi tempus, & mo- dus. Specialior esculentorum descri- ptio, quomodo in febre pestilenti pa- rari debeat consumptum. Gelatina. Expressum. Aqua carnis. Destillatum instaurans. Potulentorum descriptio. quomodo in pestilenti febre parari debeat hydrosaccharum. Hydromeli. quando sanguinis missio & purgatio ex vsu sint. Cur neutra morbi initio decernenda, quomodo characteristica pestilentiz symptomata curanda sint, qua methodo curanda pestilens fe- bris notha, quomodo hîc administrā- da phlebotomia, quæ apozemata hîc interponenda, quæ cathartica hîc eli-

genda, quæ victus ratio hîc decernenda, quomodo pestilentibus tuberculis opitulandum.

Disputationis IV. Quaestiones. 614

De Paraphrosyne. Qua ratione curatur. Quibus ex causis suscitetur. Quibus signis dignoscatur. Quid portendat. Quibus auxilijs sedetur.

De Agrypnia. Cur Agrypnia protinus occurrendum. Quibus subsidijs conciliandus somnus.

De Sopore. Quotuplex somnus. Qui naturalis habetur. Qui non naturalis. Qui præter naturam, Soporis nomen fortitus. Quomodo contingat & quando. Quomodo Sopore obruti, sint excitandi.

De Cephalalgia. Quib⁹ ex causis oriatur capitis dolor. Quotuplex sit. A quo humore fiat. Pungens. Distendens. Grauens. Pulsans. Cur finita febrium intermittentium accessione, perseueret capitis dolor. Quibus subsidijs sedetur.

De Surditate. Quæ Surditatis causa. Quæ curatio adhibenda. Quibus au-

xilij aurium dolor leniendus sit.

De gustu depravato. Quomodo gustus depravetur. Quibus remedijs curetur. Quibus ex causis linguæ asperitas, nigredo & fissuræ contingant. Quibus remedijs curentur.

De Inquiete. Quid Inquies. Quibus ex causis oriatur. Quæ ad quietem procurandam adhibenda remedia.

De Syncope. Quid Syncope. Quibus ex causis fiat. Quæ remedia.

De Dyspnæa. Quibus ex causis oriatur. Quibus signis causæ internoscantur. Quibus remedijs eius molienda curatio.

De Tussi. Quibus ex causis oriatur. Quam ægro noxam inferat. Quæ ad leniendam tussim adhibenda remedia.

De deglutiendi difficultate. Vnde oriatur deglutiendi difficultas. Quæ incurabilis. Quæ remedia curationi adhibenda.

De Anorexia. Quæ eius causa. Quæ remedia.

De Boulimo. Quid Boulimus. Quæ eius causa. Quæ huic curatio adhibenda.

De Siti. Quia ex causa sitis excitetur. Cur febricitantes aliquando non infestet. Quibus auxilijs sedetur.

De Singultu. Quibus ex causis oriatur. Quibus remedijs curetur.

De Lumborum dolore. Quibus ex causis excitetur. Quibus remedijs sedetur.

De Hemorrhagia. Quid in Hemorrhagia animaduertendum. Quotuplex sit. Quibus auxilijs immodica sistatur.

De Sudore. Quibus ex causis fiat Sudor. Quibus signis bonus à malo discernatur. Quando prouocandus, & quo auxilio. Quando suppressendus & quibus subsidijs. post sudorem quid moliendum.

De Nausea & Vomitu. Quid Nausea. Quid vomitio. Quæ vtriûsque causa sit. Quibus remedijs molienda curatio.

De alui Fluxu. Quomodo curetur alui fluxus. Cæliacus. Lientericus. Dysentericus. Quæ intempestiux Diarrhææ curatio adhibenda. Quòd tempestius alui fluor sinendus, si moderatus fuerit. Quibus auxilijs sistendus
alui

alui fluor immodicus.

De alui adstrictione. Quibus ex causis oriatur. Quibus subsidijs adstrictior aluus subducatur.

De Rigore, Horrore, Frigore. Quo differant, & quo conueniant. Quibus ex causis oriantur. Quibus auxilijs intermittentium febrium Rigor, Horror & Frigus mitigentur. Cur Rigor continuis febribus superueniens, non sit cohibendus.

De Aëstû. Quomodo contemperandus Aëstus.

614

IN PRIORE BACCALAVREORYM
EXAMINE.

Egrotantium curandorum historia 4.
Baccalaureo Medendi licentiâ persequenti
ab Examinatoribus proponuntur. 94

- I. Baronis acutè febricitantis. 661
- II. Præsulis Hemicraniâ laborantis. 666
- III. Matronæ iamdiu Hemiplegiâ & dyspnœâ tentatæ. 672
- IV. Virginis cachecticæ. 676

IN POSTERIORE
BACCALAVREORVM
EXAMINE.

DECANVS recentem de Abscessu
in Mesenterio historiam postri-
die Baccalaureo recenset.

Baccalaureus morbi diagnosim pate-
facit, Prognosim auguratur, Cura-
tionem suscipit.

Doctor II. De cruenta vomitione &
deiectione historiam refert Bacca-
laureo.

Baccalaureus suam de proposito affe-
ctu sententiam ostendit.

Doctor III. De dysenteria hepatica,
ab intemperie calida, historiam
Baccalaureo recitat.

Baccalaureus suum de affectus dia-
gnosi, prognosi & therapia iudi-
cium promulgat.

Doctor IV. de fluxu hepatico ab in-
temperie frigida, historiam Bacca-
laureo enarrat.

Baccalaureus de proposito morbo
suam affert opinionem.

Indicis Scholarum Medicarum.
FINIS.

A V T H O R
ad Lectorem.

ANtequam uniuersa opera mea Latina, in unū corpus aggregata maiori forma ederētur, LECTOR, Scholas Medicas nouissimè locupletatas, à Philiatris iam dudum expectatas, minori forma separatim excudendas esse putauī, quò facilius à Candidatis ubique circumferri possint. Si hoc opusculum grato animo exceptum fuisse percepero, dabo operā ut magnum opus, quod Gymnasium Apollinare nominauī, in lucem subinde prodeat. Ut singula quæ in eo docentur intelligas, opera pretium me facturum esse duxi, si sequentem Elenchum subijcerem.

GYMNASII APOLLINARIS
Elenchus.

Sub fausto LVDOVICI IVSTI Christianissimi Galliarum Regis auspicio, tandem imposui Gymnasio Apollinari coronidem, cuius iam pridem fundamenta HENRICO MAGNO regnante iacta fuere. Non aliorum more, in definito loco situm extat, sed ad mortalium omnium salutem, ubique terrarum indefinenter ambulaturum est, ut cunctis nationibus eo frui liceat. Septem

classes complectitur. Quid in singulis agatur, aperiam paucis.

In prima Classe : **PHILOSOPHIA NATURALIS**, quæ præbet ad Medicinam aditum, præuia prælegitur, ac sophismatis haud intricata, historico genere breviter & luculenter explanatur, ad Principatum Hominis per omnes Mundi creaturas demonstrandum.

In secunda Classe **REGIMEN SALVRE** cuilibet ad tuendam Sanitatem perutile præscribitur. Ad regendam valetudinem, rectus armorum naturalium usus, necessarius perhibetur. Sex eorum genera enumerantur, aër, cibus & porus, motus & quies, somnus & vigilia, excrementa, animi pathemata. Ut singula sint idonea qualitate, decenti quantitate, modo convenienti, & opportuno tempore usurpanda; atque insuper cuique temperamento, sexui, ætati, regioni, anni tempori, cælique constitutioni accommodanda, expromitur.

In tertia Classe, **METHODVS MEDENDI** Catholicis legibus cõstituta, ac singularibus exemplis illustrata traditur. Medicæ leges in tres distinguuntur ordines. Collocantur primò **Diagnosticæ**, quibus affectus species, causa, sedesque internoscuntur: secundò, **Prognosticæ**, quibus morbi euentus præfigitur: tertiò, **Therapeuticæ**, quæ in curatione agenda iubent, prohibentque contraria. Singulæ leges subnexis consultationibus in praxin traducuntur. Communis autem Medendi ratio imprimis proditur, deinde propria singulis affectibus internarum corporis

partium, triplici ordine, primo animalium, secundo vitalium, tertio naturalium digesta, morborum tandem articularium accessione locupletata.

In quarta Classe, CHIRURGIA succinctis sancita canonibus, amplissimis explicatur scholiis, quibus recta Chirurgis via sternitur, ad externa corporis vitia propellenda.

In quinta Classe PHARMACIA docetur, in duas partes distributa: Parasceuaſticam, quæ generales & speciales, principes & ministrâtes, primarias & secundarias materiæ medicamentariæ præparationes accuratè delineat; ac Prostacticam, quæ simplicium & compositorum, tam internorum, quàm externorum medicamentorum in Officinis apparandorum formas graphicè repræsentat.

In sexta Classe LIBERALES ARTES, quibus conciliantur Gratia ad Apollineam Lauream cōsequendā necessariæ, non minùs perspicua quàm eōpēdiaria methodo describuntur.

Ad Gymnasij coronidem SCHOLAE MEDICAE, demùm conditæ, in quibus Physiæ Medicinæ alumni, Humanitatis artibus instructi, ad Apollinarem Lauream impetrandā examinantur. De Medicinæ definitione, subiecto, fine & partitione interrogantur, omnes Medicinæ partes exagitantur, de rebus naturalibus, non naturalibus, & præter naturam, ad perfectam Medicinæ notitiam adipiscendam necessariis, disputatur. De generalibus theorematibus in praxin traducendis deinceps agitur, in singulis Februm speciebus, ac symptomatibus curandis. Hæc classium Gymnasij Apollinaris, ac rerum in singulis tractandarum, series.

PAr grace & Prinilege du Roy, il est permis au sieur de la Framboisiere, Docteur en Medecine, & l'un des Conseillers & Medecins ordinaires de sa Maiesté, de faire imprimer toutes ses œuvres, ou partie d'icelles, par tel Libraire ou Imprimeur qu'il voudra choisir, durant le terme de dix ans; Avec défences à tous autres de quelque qualité ou condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vèdre ny debiter lesdites œuvres, ou partie d'icelles, durant ledit temps, si ce n'est du cōsentement dudit sieur de la Framboisiere, ou de celuy qui aura charge de luy, comme plus amplement est déclaré en l'original des lettres données à Reims, le 11. Juin 1632. & signées,


Par le Roy en son Conseil,


ROYSEAU.

Et ledit sieur de la Framboisiere a permis à Jean Iost, marchand Libraire à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, *Schola Medica, multò. quàm antehac, ampliores, ac locupletiores,* pendant ledit temps de dix ans; suivant l'accord fait entr'eux, le 20. Nouembre, 1635.

Achevé d'imprimer le 22. Nouembre, 1635.

A01 1460760














B. 98:

xxx
A. 25